

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### A propos de ce livre

Ceci est une copie numérique d'un ouvrage conservé depuis des générations dans les rayonnages d'une bibliothèque avant d'être numérisé avec précaution par Google dans le cadre d'un projet visant à permettre aux internautes de découvrir l'ensemble du patrimoine littéraire mondial en ligne.

Ce livre étant relativement ancien, il n'est plus protégé par la loi sur les droits d'auteur et appartient à présent au domaine public. L'expression "appartenir au domaine public" signifie que le livre en question n'a jamais été soumis aux droits d'auteur ou que ses droits légaux sont arrivés à expiration. Les conditions requises pour qu'un livre tombe dans le domaine public peuvent varier d'un pays à l'autre. Les livres libres de droit sont autant de liens avec le passé. Ils sont les témoins de la richesse de notre histoire, de notre patrimoine culturel et de la connaissance humaine et sont trop souvent difficilement accessibles au public.

Les notes de bas de page et autres annotations en marge du texte présentes dans le volume original sont reprises dans ce fichier, comme un souvenir du long chemin parcouru par l'ouvrage depuis la maison d'édition en passant par la bibliothèque pour finalement se retrouver entre vos mains.

#### Consignes d'utilisation


Google est fier de travailler en partenariat avec des bibliothèques à la numérisation des ouvrages appartenant au domaine public et de les rendre ainsi accessibles à tous. Ces livres sont en effet la propriété de tous et de toutes et nous sommes tout simplement les gardiens de ce patrimoine. Il s'agit toutefois d'un projet coûteux. Par conséquent et en vue de poursuivre la diffusion de ces ressources inépuisables, nous avons pris les dispositions nécessaires afin de prévenir les éventuels abus auxquels pourraient se livrer des sites marchands tiers, notamment en instaurant des contraintes techniques relatives aux requêtes automatisées.

Nous vous demandons également de:

- + Ne pas utiliser les fichiers à des fins commerciales Nous avons conçu le programme Google Recherche de Livres à l'usage des particuliers. Nous vous demandons donc d'utiliser uniquement ces fichiers à des fins personnelles. Ils ne sauraient en effet être employés dans un quelconque but commercial.
- + Ne pas procéder à des requêtes automatisées N'envoyez aucune requête automatisée quelle qu'elle soit au système Google. Si vous effectuez des recherches concernant les logiciels de traduction, la reconnaissance optique de caractères ou tout autre domaine nécessitant de disposer d'importantes quantités de texte, n'hésitez pas à nous contacter. Nous encourageons pour la réalisation de ce type de travaux l'utilisation des ouvrages et documents appartenant au domaine public et serions heureux de vous être utile.
- + *Ne pas supprimer l'attribution* Le filigrane Google contenu dans chaque fichier est indispensable pour informer les internautes de notre projet et leur permettre d'accéder à davantage de documents par l'intermédiaire du Programme Google Recherche de Livres. Ne le supprimez en aucun cas.
- + Rester dans la légalité Quelle que soit l'utilisation que vous comptez faire des fichiers, n'oubliez pas qu'il est de votre responsabilité de veiller à respecter la loi. Si un ouvrage appartient au domaine public américain, n'en déduisez pas pour autant qu'il en va de même dans les autres pays. La durée légale des droits d'auteur d'un livre varie d'un pays à l'autre. Nous ne sommes donc pas en mesure de répertorier les ouvrages dont l'utilisation est autorisée et ceux dont elle ne l'est pas. Ne croyez pas que le simple fait d'afficher un livre sur Google Recherche de Livres signifie que celui-ci peut être utilisé de quelque façon que ce soit dans le monde entier. La condamnation à laquelle vous vous exposeriez en cas de violation des droits d'auteur peut être sévère.

#### À propos du service Google Recherche de Livres

En favorisant la recherche et l'accès à un nombre croissant de livres disponibles dans de nombreuses langues, dont le français, Google souhaite contribuer à promouvoir la diversité culturelle grâce à Google Recherche de Livres. En effet, le Programme Google Recherche de Livres permet aux internautes de découvrir le patrimoine littéraire mondial, tout en aidant les auteurs et les éditeurs à élargir leur public. Vous pouvez effectuer des recherches en ligne dans le texte intégral de cet ouvrage à l'adresse <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







# NO UVEAUX MÉ MOIRES. em. DE L'ACADÉMIE DE DIJON,

POUR LA PARTIE DES SCIENCES ET ARTS:

PREMIER SÉMESTRE 1783.



DIJON;

Chez CAUSSE, Imprimeur-Libraire de l'Académie des Sciences, Place saint Etienne.

M. DCC. LXXXIV.

Avec Approbation & Privilége du Roi.



## NOUVEAUX MÉMOIRES

DE L'ACADÉMIE DE DIJON,
POUR LA PARTIE DES SCIENCES ET ARTS.

PREMIER SÉMESTRE 1783.







### MÉMOIRES

ÞΕ

L'ACADÉMIE DE DIJON,

ANNÉE 1783.

PREMIER SÉMESTRE.

### ESSAI

SUR quelques phénomenes des dissolutions & précipitations des résines dans l'espritde-vin.

### PAR M. TARTELIN.



ES réfines sont des substances inflammables très-répandues dans le regne végétal : indissolubles dans l'eau, elles se dissolvent dans l'esprit-

de-vin, dans l'éther, dans les alkalis, & sont

marin 17871

formées par l'évaporation de la partie la plus fluide des huiles qui prennent ainsi une formé concrete.

Mais comme il existe dans les végétaux tleux espèces d'huile, il y a aussi deux espèces principales de réfine; les unes sont seulement solubles dans l'éther, elles ne se dissolvent point dans l'esprit-de-vin, & paroissent être le résidu des huiles grasses : elles n'ont point ou n'ont que très-peu d'odeur. Les autres, qui le plus communément ont un principe volatil odorant, se dissolvent dans l'esprit-devin, & sont le résidu des huiles essentielles; (1) & comme la nature paroît avoir attaché à ces huiles beaucoup de propriétés relatives à la santé, les résines de cette derniere espèce se trouvent en assez grand nombre dans nos Pharmacies. La médecine ne s'est point bornée à les employer telles qu'on les retire des végétaux, soit par incisions sur les plantes, foit par dissolution à l'aide d'un menstrue spiritueux. La complication des maladies a fait tenter de les combiner, afin de trouver dans les résultats de ces combinaisons, des remedes plus appropriés aux différentes circonstances; mais il n'est presque pas possible de s'assurer de l'efficacité de ces remedes, lorsque pour les faire on emploie les teintures de ces substances.

Un phénomene de la plupart de ces mêlan-

<sup>(1)</sup> M. Macquer, Dictionnaire de Chymie, art. résine.



### DE DIJON, 1783.

ges, que tout le monde a été dans le cas d'observer, est la cause de cette impossibilité, & m'a déterminé à tenter les expériences dont

je vais rendre compte.

Ce phénomene est la précipitation qui se fait le plus souvent lorsqu'on mêle deux teintures réfineuses, toutes deux saturées, & d'une limpidité qui constate la perfection de la dissolution. Il est probable qu'il n'a lieu qu'à raison des différentes affinités de ces résines avec l'esprit-de-vin, mais en dépend-il réellement? ce précipité est-il formé d'une seule résine, ou toutes deux concourent-elles à sa formation? Ce sont des questions dont il m'a paru que la solution étoit intéressante, & j'ai ofé l'entreprendre.

J'ai cru que pour y parvenir, il falloit commencer par m'assurer du degré d'assinité que les différentes substances résineuses ont avec l'esprit-de-vin, & que ces degrés d'affinité une fois connus, je pourrois, par le mêlange de différentes teintures, & par l'examen des précipités qui se feroient dans ces mêlanges, parvenir à résoudre les problèmes dont j'ai

fait mention.

Les premieres expériences que j'ai faites ont donc eu pour objet de faire connoître l'affinité des différentes résines avec l'espritde-vin, & les autres, de distinguer quelle est la réfine qui compose le précipité qui se fait lors du mêlange de deux teintures réfineuses.

Je crus d'abord que pour m'éclairer sur les degrés d'affinité des réfines avec l'esprit-de-



vin, je n'aurois qu'à verser sur des quantités déterminées de ces substances, une quantité donnée d'esprit-de-vin, & qu'en comparant ce qui seroit resté insoluble dans chaque expérience, je pourrois estimer l'affinité des résines par leur dissérente dissolubilité; mais je ne tardai pas à sentir que ces procédés pourroient m'induire en erreur, vû que toutes les réfines du commerce sont altérées par différentes substances terreuses, ligneuses, même gommeuses, & j'ai pris un parti plus sûr, incapable de me tromper.

J'ai versé de l'esprit-de-vin sur différentes réfines, jusqu'à ce qu'il eût dissous tout ce qu'il pouvoit; j'ai fait ensuite évaporer deux onces de ces teintures jusqu'à exficcation; j'ai estimé leur affinité avec l'esprit-de-vin, par la quantité qui en avoit été dissoute, & & que j'ai retrouvée dans mes capíules.

Vingt-cinq résines ont été soumises à cette épreuve, & mes opérations m'ont présenté des résultats qui prouvent que la plupart d'entr'elles ont, avec l'esprit-de-vin, des affinités différentes; mais qu'il en est dont ces affinités ont le même degré d'intensité.

Je vais les présenter sur la Table suivante dans un ordre relatif à ces degrés, & je rapprocherai celles dont l'affinité est égale. Le réfidu de leur évaporation est évalué en

grains.

### DI DIJON, 1783.

### TABLE

Des quantités de résines dissoutes par l'esprit-devin, & obtenues par l'évaporation de leure ceintures.

Nom des teintures.	Produit de
	l'évaporation.
Teintures d'aloès,	. 288 grains.
de réfine de gayac,	. 168
de benjoin en larme,	. 154
en sortes,	. 148
d'assa-fœtida?	
de ſandarach <b>⟨ · ·</b>	144
de réfine de jalap, .	. 142
de baume en coque,	
de gomme-gutte, .	
de réfine de scammon	
de baume de tolu, de fang de dragon, de myrrhe,	)
de gomme élémi,	. 02
de gomme ammoniac	• 92 • 84
de galbanum,	- 78
d'oliban,	. 76
de fagapenum, .	74
de bdellium,	74
d'euphorbe,	. 72
de fuccin,	. 60
d'opoponax,	_
de la tacamaque,	. 48
de bitume de Judée , de charbon de terre	
as Amdison Re 19116	" <b>"</b>



On voit par les détails de cette Table, que l'aloès est de toutes les résines que j'ai éprouvées, celle qui a le plus d'affinité avec l'esprit-de-vin, & le bitume celle qui en a le moins. Il y auroit eu de la pré cipitation à en conclure que dans le mêlange de ces dissérentes teintures, le précipité, lor squ'il auroit lieu, devoit se faire aux dépens de celle qui avoit le moins d'affinité avec l'esprit-de-vin; en esset ce menstrue étant saturé dans l'une & dans l'autre des teintures, ne paroissoit pas de-voir abandonner une des deux substances qu'il tenoit en dissolution. L'expérience seule pouvoit m'éclairer sur cet objet, & voici quels en ont été les résultats.

Je fis plusieurs mêlanges de ces teintures, & je trouvai que toutes celles des substances résineuses, dont l'affinité avec l'esprit-de-vin étoit égale, ne donnoient aucun précipité lorsqu'on les mêloit; que le mêlange donnoit un précipité d'autant plus abondant, qu'il y avoit plus de différence entre la dissolubilité de ces substances; qu'ainsi le phénomene de la précipitation étoit réellement conséquent aux différens degrés d'affinité des résines avec l'esprit-de-vin.

Il me restoit à reconnoître si ces précipités étoient composés d'une seule des résines dissoutes, ou de toutes les deux. Le résultat de mes expériences ne m'autorise pas à prononcer affirmativement sur cet objet intéressant. Je me propose de les réitérer, de les

### DE DIJON, 1783.

nultiplier de maniere à pouvoir faire cesser toute indécision: mais en attendant je vais rendre compte de ce que j'ai observé. J'ai mêlangé des teintures de résines odorantes & de réfines inodores de dissolubilités dissérentes, & qui devoient, suivant mes premieres expériences, me donner un précipité. J'ai examiné ensuite ce précipité, il avoit conservé de l'odeur; mais après un temps plus ou moins long, l'odeur s'est dissipée, & la quantité du précipité a été foiblement diminuée. Ce résultat me paroît prouver que les deux résines avoient contribué à former ce précipité, & dès-lors qu'il n'est pas l'effet de la différence de leur affinité: mais quelle est donc la cause de ce phénomene? C'est un nouveau problème que j'ai cherché à résoudre par l'expérience suivante.

J'ai mêlé de la teinture d'aloès, substance très-soluble, dans l'esprit-de-vin, & de celle d'assa-sœtida qui l'est moins. J'ai fait évaporer ce mêlange, & ayant versé sur le résidu la même quantité d'esprit-de-vin qui avoit tenu ces résines en dissolutions. J'ai observé que ce menstrue a resusé d'en dissoudre une partie, & qu'il en a pris environ quatre grains de

moins par once.

Cette différence pourroit engager à supposer que les résines en se combinant, sorment un composé qui devient moins dissoluble, & qu'ainsi les précipités sont l'esset de ce changement de dissolubilité. Cependant j'ai cru



### A CADÉ MIE

reconnoître, dans cette expérience, que l'assafœtida, moins dissoluble que l'aloès, faisoit la plus grande partie de la portion non disfoute; & cette remarque m'engage à suspendre encore mon jugement, & à attendre, avant de le hasarder, que d'autres expériences aient diffipé toutes mes incertitudes. Je souhaite même que celles-ci puissent déterminer quelqu'un à en tenter de pareilles : mais je crois devoir, pour leur épargner quelques tentatives illusoires, les engager à n'employer que des teintures absolument saturées; car alors l'esprit-de-vin qui seroit surabondant, redisfoudroit les précipités à mesure qu'ils se formeroient; & si je leur fais faire cette observation, c'est que ce défaut d'attention m'a induit en erreur dans mes premieres tentatives.

Quoique je n'aie pas eu tout le succès que j'espérois de mes expériences, il m'a semblé utile de les communiquer à l'Académie; parce que, 1°. elles prouvent que l'esprit-devina dissérens degrés d'affinité avec dissérentes résines : 2°. que ces dissérences, ou celles qui résultent de la combinaison de deux résines, occasionnant des précipités, les remedes qui résultent du mêlange de deux teintures, ne peuvent être exactement appréciés que par la connoissance de la substance qui formera la plus grande partie du précipité.

Par exemple, si en mêlant la teinture de myrrhe, qui est peu purgative, à celle d'aloès

qui l'est beaucoup, on a un précipité, & fa la myrrhe fait la principale portion de ce précipité, il est évident que la vertu purgative de la teinture qui aura éprouvé cette précipitation, sera proportionnellement plus forte que si le précipité étoit composé de parties égales des deux réfines, & que cette teinture le seroit beaucoup moins, si l'aloès étoit la substance qui se seroit précipitée en

plus grande quantité.

Une autre remarque par laquelle je terminerai ce Mémoire, est relative au choix à faire de la scammonée. Il y en a de deux espèces dans le commerce; celle d'Alep & celle de Smyrne. La premiere doit être préférée à la seconde, parce qu'elle contient trois fois plus de substances résineuses. La teinture de huit onces de scammonée d'Alep, a donné, après l'évaporation, trois cent dixhuit grains de réfine; & la même quantité de scammonée de Smyrne, n'en a donné que quatre - vingt - seize : différence si considérable, qu'elle mérite beaucoup d'attention, vû qu'elle met dans l'impossibilité de prévoir l'action de ce remede, lorsqu'on le prescrit intérieurement, à moins qu'on ne prenne la précaution de ne prescrire que la résine purifiée avec l'esprit-de-vin, & obtenue par l'évaporation, ou par sa précipitation à l'aide de l'eau.

### EXPÉRIENCES

SUR des combinaisons du mercure & de l'acide muriatique par affinité simple.

PAR M. MARET.

'ACIDE muriatique n'attaque pas le mercure, tant que ce métal est en état de mercure coulant; mais comme il l'enleve aux acides vitrioliques & nitreux, c'est avec raison que tous les Chymistes ont posé en fait que cet acide a plus d'affinité avec le mercure

que n'en ont tous les autres.

En réflèchissant sur ce phénomene, & sachant que, dans toutes les dissolutions, il faut que le dissolvant, pour s'emparer du corps à dissoudre, surmonte la résistance que lui oppose la force d'adhésion des parties intégrantes de celui-ci; je pensai qu'en affoiblissant celle qui unit les molécules du mercure entr'elles, on pourroit favoriser la combinaison par affinité simple de composition, sans avoir recours à l'affinité disposée.

La remarque de M. Macquer, sur ce qui fe passe dans tous les procédés employés pour la préparation du muriate mercuriel corrosif, (I) venant à l'appui de l'idée que j'avois con-

<sup>(1)</sup> C'est le nom, qu'adoptant la Nomenclature de

II

çue, & étant persuadé avec ce célèbre Chymiste, que la combinaison du mercure & de l'acide muriatique n'avoit lieu dans ces opérations que par la rencontre de ces deux substances en état de vapeurs, je présumai qu'on pourroit faire cette combinaison sans avoir recours à une affinité disposée, & j'y réussis par le pro-

cédé que je vais décrire.

Je n'avois pas encore lu l'excellente traduction de la pharmacopée de Londres par M...., & j'ai vu par la note premiere, p. 625 du second volume de cet Ouvrage précieux, qu'on avoit déjà eu la même idée. Mais mon procédé différant de celui que rapporte le savant Traducteur de cette pharmacopée, & étant, à ce qu'il me semble, plus simple, j'ai cru pouvoir le communiquer.

Celui dont parle M . . . . consiste à avoir deux cornues , dont l'une est tubulée ; à mettre dans celle-ci du muriate de soude bien décrépité; & du mercure dans l'autre; & à introduire le bec de ces deux vaisseaux

dans un ballon à deuxcous.

On lutte exactement les jointures. On place chaque cornue sur un fourneau particulier. On donne le feu, & dès qu'on juge que le mercure est affez échaussé pour s'élever en vapeurs, on verse de l'huile de vitriol par la tubulure de la cornue sur le muriate de

M. de Morveau, je donne au sublimé corross. Je nomme muriate mercuriel doux, le mercure doux; potasse méphitisée, l'alkasi fixe végétal crystallisé, & par la dénomination acide muriatique, je désigne l'acide marin, par celle de muriate de soude, le sel commun.



foude. Les vapeurs se rencontrent dans le ballon, & il se forme un muriate mercuriel corrosis.

Ce Savant croit ce procédé plus curieux qu'utile, vu sa complication. Celui que je vais décrire, non moins curieux, paroîtra peutêtre, par sa simplicité, avoir plus d'utilité.

Mon objet étoit de faire rencontrer de même le mercure & l'acide muriatique en état de vapeur. Je pris un grand creuset de terre que je remplis de sable, trois autres creusets dont deux percés à leur fond, en forme d'aludels, & deux petits matras dont le goulot étoit évasé.

Je mis du mercure dans un des matras, & de l'acide muriatique fumant dans l'autre.

Je plaçai mon creuset rempli de sable sur un sourneau allumé; j'ensonçai dans le sable le matras qui contenoit le mercure, puis je recouvris ce creuset des deux qui étoient percés; ils surent surmontés par le troisséme

qui ne l'étoit pas.

Quand je crus le mercure assez échaussé pour commencer à se vaporiser, j'introduisis le matras où étoit l'acide muriatique dans le ereuset qui contenoit celui du mercure; je luttai les jointures; je poussai le seu & le soutins un peu de temps: puis, ayant laissé réfroidir les vaisseaux, je les déluttai & je trouvai mes aludels tapissés de mercure sous sorme d'un enduit noirâtre & d'une poussiere crystalline blanchâtre; je détachai cette poussiere avec la barbe d'une plume, & je recon-



### DE DIJON, 1783.

13

nus bientôt qu'elle étoit le produit de la combinaison du mercure avec l'acide muriatique & un véritable muriate de mercure. Mais quelle étoit la qualité de ce muriate, étoit-il doux, étoit-il corrosis? L'épreuve de l'eau de

chaux vint résoudre ce problème.

C'étoit avant la séance du Cours de Chymie, du 25 Mars 1782, que j'avois fait cette opération; j'en si voir les résultats dans cette séance; & ayant mis dans un mortier de verre une portion du sel que je détachai, je versai dessus de l'eau de chaux: j'apperçus d'abord quelques atômes de jaune, mais ils disparurent dans l'instant; l'eau resta limpide, & la poudre saline prit la couleur noire que l'eau de chaux donne toujours au muriate mercuriel doux.

Le succès de cette expérience m'a engagé à en tenter une autre, qui ne m'a pas donné tout ce que j'en attendois, mais qui m'a sourni une nouvelle preuve de l'affinité simple du mercure & de l'acide muriatique.

Il étoit démontré par le résultat du procédé décrit ci-dessus, que ce métal & cet acide, ainsi que l'a pensé M. Macquer, se combinent en état de vapeurs. On pouvoit dire, pour rendre raison de cet esset, que si l'acide muriatique, même bouillant, n'attaque point le mercure en masse, c'est que l'assinité d'agrégation des parties intégrantes de ce métal est supérieure à l'assinité de composition de cet acide avec le mercure, tandis que la premiere, diminuée par la rarétaction des parties



métalliques portée au point de les volatilifer, ne peut plus s'opposer à l'action de la seconde.

Mais pour que cette explication sût satisfaisante, il auroit sallu que la combinaison eût lieu dans la circonstance où le mercure seul seroit en état de vapeurs. Je crus qu'il étoit possible de vérisier cette conjecture, & qu'en présentant à l'acide muriatique le mercure en vapeurs, il y auroit une combinaison capable de donner par un procédé simple un muriate mercuriel doux ou corrosis.

L'expérience que j'ai tentée d'après cette idée, a eu une partie de l'effet que j'en espérois; j'ai eu un sel mercuriel que ses qualités assimilent au muriate mercuriel doux; mais sa formation ne fait qu'appuyer la théorie de M. Macquer, & le procédé que je vais décrire ne m'a pas paru pouvoir être utile pour la pré-

paration de cette drogue.

J'ai mis dans une petite cornue une once & demie de mercure revivisé du cinabre, & dans un ballon deux onces d'acide muria-

tique fumant.

J'ai enfoncé la cornue dans un bain de sable, de maniere qu'elle en étoit presqu'entièrement recouverte; j'ai lutté les vaisseaux, &

j'ai donné un grand feu.

Le mercure est passé en vapeurs dans le récipient, s'y est en partie réuni en masse, en partie attaché sous forme métallique au cou de la cornue, & en partie sous celle

### DE DIJON, 1.782.

15

d'une poudre grisatre que Boheraave nomme

æthiops-perse.

J'ai décanté la liqueur du récipient, il en restoit un peu dans le ballon avec le mercure entouré d'une poudre qui avoit les mêmes apparences que celle que j'avois détachée du cou de la cornue. J'ai versé un peu d'eau distillée dans ce récipient, & j'ai filtré le tout; le mercure & la poudre grise, rassemblés sur le filtre, pesoient une once trois gros cinq grains.

L'eau qui avoit passé par le filtre, & qui contenoit un peu de dissolution muriatique de mercure, a été précipitée par la potasse méphitisée, & a donné une terre mercurielle.

Cette premiere épreuve, jointe à la diminution de poids du mercure, ne me permettoit pas de douter qu'il n'y eût eu dissolution d'une portion de ce métal dans l'acide muriatique; mais le papier teint en bleu par le tourne-sol, plongé dans la liqueur décantée, rougissoit sur le champ. Cette liqueur continuoit à être très-sumante, & tout annonçoit que l'acide muriatique n'étoit pas saturé.

Je remis le mercure dans la cornue, & la liqueur dans le ballon; je recommençai l'opération; tout se passa comme dans la premiere; je procédai aussi, comme la premiere sois, pour séparer de la liqueur le métal non dissous, il pesoit une once deux gros.

L'acide n'étoit pas encore saturé, & il étoit toujours sumant: j'aurois peut-être porté la dissolution jusqu'à saturation, en réitérant les



distillations, mais j'étois impatient de savoir quel étoit le sel que m'avoit donné mon opération. Je pensai que la portion d'acide combinée avec le mercure, devant être moins volatile que celle qui n'étoit point entrée en combinaison avec ce métal, je n'avois, pour les séparer, qu'à mettre en distillation la liqueur que j'avois retirée du ballon, & je la distillai à un seu doux, en plaçant la cornue sur la surface d'un bain de sable peu échaussé.

Mais la liqueur passa rapidement & en entier dans le récipient, il ne resta dans la cornue qu'un peu de matiere saline, jaunâtre très-adhérente au verre, que je ne pus en détacher qu'avec violence & après avoir cassé la cornue.

Cette tubstance triturée avec l'eau de chaux n'a point donné le jaune qu'auroit produit un muriate mercuriel corrosif.

Dissoute dans l'eau bouillante, & la dissolution précipitée par la potasse méphitisée, j'ai eu une terre mercurielle, blanchâtre. Ce résultat m'a prouvé que la substance restée dans la cornue étoit réellement un sel mercuriel; mais sa petite quantité prouvoit que l'acide qui étoit passé dans le récipient, devoit être encore chargé de mercure, & j'en eus bientôt la certitude.

J'étendis une portion de cette liqueur dans un peu d'eau, & je la précipitai par la potasse pure, j'eus un précipité blanc peu abondant, & la liqueur se couvrit d'une pellicule métallique.

Convaincu

### DE DIJON; 1783.

Convaincu par cet essai de la présence d'un sel mercuriel dans cet acide, je cherchai à le dégager de l'acide surabondant; & pour y parvenir, j'étendis une portion de la liqueur dans égale quantité d'eau; je la concentrai par une évaporation sur le seu, & je sis évaporer à l'air libre la liqueur concentrée.

Comme, après plusieurs jours, elle n'étoit pas complétement évaporée, je remis sur le seu la capsule qui la contenoit. J'eus un sel blanchâtre qui ne passa au jaune par l'eau de chaux, grisonna, & ne sut point dissous malgré la trituration. J'en obtins un peu de dissolution par l'eau bouillante, mais en très-

petite quantité.

Cela me suffsoit pour être certain que j'avois eu un sel mercuriel qui n'étoit pas du
muriate corrosif, mais du muriate doux.
Je desirois trouver un autre moyen de me
procurer ce sel; j'imaginai qu'en m'emparant de l'acide surabondant par un alkali,
je mettrois ce sel dans le cas de se crystalliser, & dans cette idée je distribuai
de ma liqueur dans deux verres; je versai dans l'un de la dissolution de potasse
méphitisée, & dans l'autre, de l'alkali volatil caustique.

J'eus dès le premier moment un précipité blanchâtre dans les deux verres, mais qui se redissolvoit à l'instant dans celui où je mettois de l'alkali volatil, & que je ne sis reparoître qu'en précipitant cet alkali par un

alkali fixe.



Je filtrai alors les deux liqueurs; je recueillis les précipités arrêtés sur le filtre, & j'essayai, mais inutilement, de les dissoudre dans de l'eau de chaux & de l'eau distillée bouillante, ils resterent constamment blancs.

Je pris le reste de ces précipités, les mis dans une siole à médecine, & les exposai à la sublimation : il ne s'en éleva au dôme de la siole qu'une très-petite partie sous forme d'une poudre bleuâtre, que je ne pus

parvenir à en détacher.

La liqueur passée par le filtre, neutralisée au point de ne point altérer la couleur bleue du papier, donnoit encore un précipité blanc par l'addition d'un alkali; je cessai de la précipiter, & après une nouvelle filtration, je l'étendis d'un peu d'eau distillée, & je la sis évaporer sur un bain de sable.

Il se fit une crystallisation sans forme déterminée, qui tapissa la capsule, & qui étoit

blanchâtre.

Je décantai quelques gouttes de la liqueur avant son évaporation complette; j'y versai de la potasse méphitisée, & j'eus un précipité absolument semblable au premier. Je poussai l'évaporation à siccité, & je soumis le sel aux épreuves suivantes.

Exposé à l'air pendant vingt-quatre heures, il ne s'humecta point. J'en mis sur un charbon ardent, il se fondit en partie, donna une sumée blanche qui s'attacha à une pièce de monnoie de cuivre, mais sans y adhèrer, &

le cuivre ne fut point blanchi.

### DE DIJON, 1783.

19


J'en fis dissoudre une partie dans de l'eau; une once d'eau se chargea de 56 gr. \frac{1}{3} de ce sel, la dissolution sut complette & prompte; je voulus la précipiter par l'esprit-de-vin, mais il n'y eut point de précipitation.

Je plengeai une pièce de monnoie de cuivre dans la dissolution d'une partie de ce sel, & au bout de quelques heures, la dissolution avoit pris une couleur bleue; un précipité blanc couvroit la pièce de cuivre, mais sans y adhèrer.

Il résultoit de ces épreuves, que ce sel contenoit réellement du mercure, mais qu'il étoit au moins très-difficile de désunir le sel mercuriel d'avec le muriate de potasse, & que la combinaison de ces deux sels en formoit un d'une très-grande dissolubilité.

Les expériences précédentes avoient prouvé que l'acide muriatique pouvoit attaquer le mercure & le dissoudre directement & par affinité simple, pourvû que les molécules du métal lui sussent offertes dans un état de division qui eût affoibli l'affinité d'agrégation. Mais elles prouvoient encore que le sel produit par cette combinaison, n'étant pas un muriate corrosif, quoiqu'il y eût surabondance d'acide, ce n'étoit point à cette surabondance qu'il falloit attribuer la qualité corrosive du sublimé.

Il me semble que ce phénomene ajoute beaucoup de probabilité à la conjecture de M. Bertholet, sur la cause de la différence



#### O ACADÉMIE

qui existe entre le muriate corrosif & le muriate doux.

Ce savant Chymiste l'attribue à ce que, dans l'un, le mercure s'est uni à l'acide en état de chaux, tandis que dans le mercure doux, une partie du métal s'est combiné en état métallique. Or, il est évident que dans let deux procédés que j'ai employés, le mercuré s'est combiné dans ce dernier état avec l'acide muriatique, & l'on pourroit en conclure que c'est à cette circonstance qu'est due la formation du muriate doux. Peut-être même ce succès autoriseroit-il M. Bertholet à cesser . d'admettre dans le muriate doux, une portion de chaux mercurielle, & il me semble qu'en réflèchissant sur le procédé ordinaire de la préparation du mercure doux, il ne seroit pas déraisonnable de le prétendre.

En effet, on éteint du mercure avec du muriate corrosif, & l'on expose le mêlange à la sublimation. La chaux mercurielle est bien moins volatile que le mercure en état de métal. Répugneroit-il donc de penser que celui-ci s'est volatilisé plus promptement que sa chaux?

Le peu de muriate corross que l'on trouve dans les vaisseaux sublimatoires, ne seroit que le produit du dernier dégré de seu qui auroit volatilisé la chaux. Il seroit facile de vérisser cette conjecture, en examinant le résidu rouge de la sublimation qu'on a cru n'être que la chaux martiale du vitriol verd, qu'on suppose être restée combinée avec le

mercure dans le muriate corrosif, & qui n'est peut-être qu'une chaux de mercure. Cette supposition m'a toujours paru bien étonnante. L'expérience seule peut la justisser ou l'anéantir. J'invite ceux, à qui les circonstances permettent de la tenter, de ne pas la négliger.

Je vais terminer le récit des faits que j'ai cru devoir rapporter, par quelques réflexions fur la folubilité du fel mixte que j'ai obtenu par la précipitation du fel mercuriel, avec furabondance d'aeide, à l'aide de la potaffe

méphitifée.

Le mercure, dans cette combinaison, est très-dissoluble: n'offriroit-elle pas un nouveau moyen de donner le mercure avec plus de fûreté? C'est un problème que l'observation & l'expérience peuvent seules résoudre, & dont il seroit intéressant de tenter la solution avec la prudence qui doit diriger les essais d'un moyen nouveau.

### DISSERTATION

SUR l'origine des gouttes d'eau renfermées dans les crystaux de roche & autres corps.

PAR M. LE CAMUS.

L n'y a point de fait, en histoire naturelle, qui ne mérite l'attention la plus scrupuleuse du Philosophe, & dont la description ne puisse B iii



intéresser le public qui pense, & qui dans ce siécle, devenu curieux de savoir, interroge la Nature & écoute ses réponses. Celui qui fait l'objet de ce Mémoire est connu, & il a déjà piqué la curiosité de plusieurs Naturalistes; c'est le crystal de roche contenant des gouttes d'eau, dont je vais rechercher l'origine.

Aueun Auteur de Minéralogie, au moins de ceux qui font parvenus à ma connoissance, & dont je posséde les Ouvrages, n'a parlé de ces gouttes d'eau renfermées dans le crystal de roche, ou dans d'autres matieres, telles que la réfine copal, &, ce qui étonnera peutêtre, dans le sel gemme & dans le nitre. Quelques Naturalistes, tels que M. de Bomare & M. Targioni dans ses Voyages, parlent de ces petits géodes qu'on trouve en Italie, qui sont de la nature de l'agathe, & qui contiennent quelques gouttes d'eau, & à qui ils donnent le nom de enhydres, qui veut dire pierre remplie d'eau; mais ils ne disent nulle part comment cette eau s'est trouvée renfermée dans ces petits globules.

Palissy est le seul des Anteurs anciens qui ait parlé de l'existence de ces gouttes d'eau dans du crystal de roche; car on lit dans son Ouvrage, qu'il vitun crystal de roche chez un nommé Pierre Seguin, Lapidaire, lequel crystal contenoit une goutte d'eau; mais il ne parle en aucune maniere de la formation de cette goutte rensermée dans le crystal. Il est étonnant que depuis Palissy jusqu'à nos



BE DIJON, 1783.

23

jours ( car il y a peu d'années qu'on les connoît & qu'on en voit dans quelques cabinets) aucun Naturaliste n'en ait parlé, si l'on en excepte ceux que j'ai cités plus haut. Il est vrai que le peu de goût qu'on avoit autrefois pour les Sciences, & sur-tout pour l'Histoire Naturelle, qui à peine sort de son berceau actuellement, en est seul la cause. Il falloit donc ( qu'on me permette de rendre ici justice à Palissy); il falloit, dis je, que cet Auteur qui vivoit en 1584, qui n'étoit qu'un simple Potier de terre, dénué entiérement, comme il l'avoue lui-même, de toutes connoissances scientifiques, même d'astrologie, qui de son temps étoit si fort en vogue, eut un génie bien ardent pour avoir, dans un siècle d'ignorance, donné un Ouvrage aussi intéressant sur l'Histoire Naturelle, que celui qu'il a donné; car on peut dire que son livre a servi de canevas à maints ouvrages modernes qui y ont trouvé le système de l'origine des montagnes, de la formation des corps pétrifiés, de l'origine des crystallisations, tant du crystal de roche que des sels, &c. &c. Aussi il eût été bien malheureux pour les Naturalistes actuels, que cet Ouvrage, après avoir payé le tribut à l'ignorance & à la persécution de ceux pour qui toute nouveauté est souvent un sujet de proscription, fût resté dans l'oubli; mais grace au zèle de MM. Faujas & Gobet, il vient de renaître dans tout son entier; ces Messieurs n'ont changé en rien le style, qui, quoique vieilli considérablement, se fait encore lire avec

Biv



plaisir & sans peine, & se ressent par-tout du naturel & de la bonhommie de son Auteur; ils y ont seulement ajouté des notes en explication de quelques noms de certaines substances qui ne sont plus connues sous ceux que

Palisty leur a donnés.

Mais je reviens à l'origine de ces gouttes d'eau contenues dans le crystal, que je vais tacher d'expliquer, d'après quelques observations que j'ai été dans le cas de faire; & je crois que l'on verra par les causes que j'assigne à ces accidens, qu'il n'est plus permis d'en révoquer en doute l'existence, comme M. Bertrand dans son Dictionnaire des Fossiles (pag. 305). D'ailleurs, la cupidité des Marchands a répandu un assez grand nombre de ces crystaux dans les Cabinets d'Histoire Naturelle, pour qu'on puisse se convaincre de leur existence: j'en posséde un entr'autres, qui, je crois, peut passer pour un des plus beaux qui existent, & peut être une preuve très-sensible de ce que j'avance.

Tous les crystaux de roche, de sels, &c. se forment, comme l'on sait, dans un milieu aqueux, au moins d'après ce qui se passe sous nos yeux dans la crystallisation des derniers; peut-on ainsi déterminer l'origine de celle des premiers, c'est-à-dire, des crystaux de roche? Or, le fluide dans lequel nagent les molécules qui, par la loi des affinités, cherchent à s'unir pour former un crystal, peut être sujet à beaucoup de variations. Par exemple, si au moment où la crystallisation commence à se

former, il éprouve quelque mouvement subit occasionné par quelque secousse donnée à la montagne, alors toute génération est confondue, la vase trouble le fluide, la crystallisation devient tumultueuse, chaque crystal se confond avec son voisin, & ne présente plus que les simples élémens d'une crystallisation qu'il auroit acquise dans le repos. Tels sont la plupart des crystaux que l'on ramasse au pied des glaciers en Savoie, où les amas énormes de glace qui recouvrent ces montagnes, occasionnent souvent, par la chûte de quelquesunes de leurs masses, des secousses qui se propagent jusques dans l'intérieur des montagnes contre lesquelles elles viennent tomber; montagnes qui contiennent souvent des crystallieres. On appelle ainsi les endroits où se trouve le crystal de roche. Alors on sent que dans ce cas toute crystallisation doit dès ce moment être interrompue; & lorsque le fluide, redevenu tranquille, permet aux molécules de se rassembler, ce ne peut plus être dans le même ordre qu'auparavant : delà résulte une confusion qui dénature les crystaux de roche.

Si le fond de cette crystalliere, au lieu d'être recouvert par de la vase, n'est qu'un rocher que laissent à découvert quelques particules métalliques, ou qui soit hérissé de pointes de crystaux de schorl ou d'amiante, alors le crystal de roche qui se forme sur une telle base, contiendra nécessairement des particules métalliques, des aiguilles de schorl & des silets



d'amiante, tels qu'on en voit dans plusieurs cabinets contre l'opinion de ceux qui nient qu'il y ait 'de l'amiante dans du crystal de roche, & qui prétendent que ce n'est qu'une illusion d'optique occasionnée par une félure ou un étonnement dans le crystal; ou, ce qui revient au même, que ce n'est qu'un prestige de l'imagination. De tels Naturalistes prouvent par-là que l'observation ne les a pas encore assez instruits sur les merveilles de la nature, & qu'ils n'ont vu que très-peu de collections d'Histoire Naturelle, qui sont les grands livres où l'on peut le plus utilement & le plus commodément s'instruire.

Il est vrai que souvent on a présenté à des curieux ( car les Marchands d'Histoire Naturelle s'avisent de tout pour flatter leur cupidité ) des morceaux de crystal de roche représentant de petits filets blanchâtres & entortillés, qu'ils baptisoient argent natif capillaire dans du crystal; & il est vrai que ces Naturalistes très-peu instruits & très-peu clairvoyans, les ont payés fort cher sur une telle étiquette. C'est bien le cas de dire que les effets que l'on voit dans ces crystaux, ne sont qu'un prestige de l'imagination; & je ferai voir plus bas ce que c'est que ces prétendus filets d'argent natif. Je ne nie cependant pas qu'il puisse se trouver dans les crystaux quelques morceaux d'argent & d'or, comme il se trouve du cuivre & du fer; mais alors il est ou en feuilles ou en petites masses bien apparentes, & non en filets, parce que je ne crois

pas que l'or, l'argent ou le cuivre, enfin les métaux vierges, puissent végéter au dessus du rocher, seul cas où la matiere crystallisante pourroit l'envelopper; & je suis encore trop incrédule pour ajouter soi à ce que l'on dit de l'or de Hongrie & de Bohëme, qui végéte au dehors & s'attache aux ceps de vigne.

Enfin, si la base de la crystalliere se trouve recouverte de bitume, alors l'eau-mere doit presidre nécessairement une teinte plus ou moins soncée de brun, & communiquer cette couleur aux crystaux qui seront ce qu'on appelle ensumés. Il en sera de même des autres couleurs que prennent quelquesois les crystaux, tels qu'orangers, jaunâtres ou verdâtres; lesquelles couleurs ne peuvent être produites que par des essores métalliques ou des dissolutions végétales.

Ayant donné à entendre que les crystaux se forment dans des endroits creux qui se trouvent dans les montagnes, & où les eaux qui charient la matiere terreuse la plus subtile, viennent former les crystaux de roche; & qu'il est d'ailleurs à présumer que ces cavités se sont formées par quelques écarts ou fissures de la montagne; on peut supposer que ces fissures se propagent au dehors d'un des flancs de la montagne, dès-lors l'air peut être admis dans la crystalliere, & c'est le seul cas où il peut se former des gouttes d'eau dans les aiguilles de crystal, & voici comment.

Le crystal de roche est, je le suppose, comme tous les sels naturels ou factices, retenant par conséquent plus ou moins long-temps l'eau de fa crystallisation; car on sait que tous les sels que l'on fait crystalliser, sont, par cette raison, plus ou moins de temps à sécher, & que même quelques-uns, tel que le sel de glauber, ne séchent jamais parfaitement; & alors s'ils ne sont renfermés exactement, ils s'unissent facilement avec l'eau qui est combinée avec l'air, & ils tombent en deliquium. On fait que le sel marin, pour être marchand, doit rester trois ou quatre ans dans les salins, selon que la faison a été plus ou moins humide. Sicela est ainsi, par rapport aux crystaux de roche, on peut avancer que l'air qui entre dans la crystalliere par la fissure que j'y ai supposée, séche d'autant plus promptement les crystaux qui sont près de cette fissure, que les montagnes où se trouvent les crystallieres, sont plus élevées, telles que celles de l'Obrelande en Suisse, de Willach en Valais, &c. & que l'air qui environne le sommet de ces montagnes, est plus pur & moins mêlé de vapeurs aqueuses.

Alors s'il se trouve quelques crystaux nouvellement formés, cet air qui agit principalement sur l'extérieur des aiguilles, en séche promptement l'épiderme, si je peux parler ainsi. Or, comme l'effet de la sécheresse est de produire le resserment des pores de tous les corps sur lesquels elle agit, il résulte de ce resferrement une suppression de la transpiration intérieure qui cherche à s'établir au dehors, & il arrive dans les crystaux de roche ce qui arrive au corps humain, une transpiration arrêtée. Je crois qu'on peut me permettre cette comparaison d'autant plus volontiers, que tout ce qui est matiere suit à peu près les mêmes loix; l'action de l'air se propageant ensuite de plus en plus dans l'intérieur du crystal, l'eau est nécessairement contrainte de refluer comme les humeurs du corps humain, dans le centre ou aux environs : là elles forment des tumeurs qui dans les crystaux de roche font ces bulles d'air qu'on y apperçoit; mais si l'air agit avec plus de force sur un tel crystal, ille pénétre lui-même &, produit ces petits entortillemens qui sont le plus souvent vuides, parce que l'eau a été entiérement absorbée par l'action de l'air. Or, comme le propre de l'air qui agite l'eau est de la faire blanchir, blancheur qui n'est due qu'à la quantité de petites bulles qu'il forme, il n'est pas étonnant que ces ressemblances de végétation soient de cette couleur, & qu'alors les Marchands les fassent passer pour de l'argent vierge, & que les ignorans les achetent pour

Telle est l'origine que j'assigne à ces bulles, qui, lorsque l'eau remplit entiérement la cavité qu'elles occupent, sont imperceptibles, parce que l'eau se consond par la couleur avec la matiere du crystal; mais lorsqu'une partie de cette eau s'est évaporée, parce que l'air n'a peut-être pas agi aussi fortement ou aussi également par-tout, alors n'occupant qu'une partie de la cavité, elles deviennent visibles



#### O ACADÉMIE

par l'espace plus ou moins long que l'eau a à parcourir. Dans le crystal que je posséde, la bulle d'eau offre un phénomene que l'on n'a pas encore vu dans les crystaux qui contiennent des gouttes d'eau; c'est que l'intérieur de la cavité qu'occupe la goutte d'eau, représente un prisme à six pans, tel à peu près que l'extérieur de l'aiguille de crystal, à l'exception cependant que la pyramide n'existe pas. Chaque côté du prisme qui est très-applati, est terminé par un biseau qui forme les pans de la crystallifation héxagone. Ici on peut concevoir quelque doute sur la formation de ce crystal, suivant l'hypothèse que j'ai établie pour les bulles rondes ou ovales. Je ne vois cependant pas que l'on puisse l'expliquer autrement; car dire que ce crystal s'est formé sur des crystaux de schorl dont il a pris l'empreinte intérieurement; que par quelqu'accident, ce crystal s'est détaché & a laissé vuide la place qu'occupoit le crystal de schorl, & qu'ensuite cette petite cavité se soit remplie d'eau, & ait été rebouchée par la matiere crystalline; cela peut être, & c'est l'idée qui m'est venue d'abord. Mais un si grand concours de circonstances m'ayant paru difficile à admettre, j'ai mieux aimé supposer que la cavité étant un peu grande en raison de la grosseur dont pouvoit être l'aiguille de crystal ou peut-être la masse (car je soupçonne que celui-ci provient d'un crystal en masse, tel que celui de Madagascar; il vient des montagnes du Hartz en Saxe), il s'est formé intérieurément une espèce de crystallisation en retrait, ou bien cette étendue de la goutte d'eau s'étant trouvée parallele à l'horizon, l'air qui est, selon moi, toujours la cause de ce phénomene, soussiant également & aussi parallelement à l'horizon, aura déterminé la forme applatie, & ce biseau que l'on observe dans ce morceau : c'est ce que je crois de plus probable.

Ayant dit que ce morceau provenoit d'un crystal, ou, comme on voudra, d'un quartz en masse, on voit que je suppose aux gouttes d'eau qui s'observent dans le crystal en masse, la même origine qu'à celles qu'on voit dans les crystaux réguliers; & une chose que j'ai observée dans plusieurs morceaux des premiers que j'ai vus, ayant des bulles d'eau, c'est que ces bulles se trouvent assez ordinairement répandues par bandes horizontales; ce qui consirmeroit mon opinion sur l'origine de la goutte d'eau qui est dans le mien.

Ce qui m's donné lieu d'établir que l'air est le seul agent qui concoure à former ces bulles d'eau dans les crystaux, c'est qu'étant à Berne en Suisse, & visitant la manusacture de salpêtre qui y est, je me trouvai présent au moment où un Ouvrier alloit racler une des cuves dans lesquellès on fait évaporer le salpêtre, & en enlever le sel, lorsqu'il vit à un pouce ou deux du bord, un beau crystal, dans lequel il y avoit une cavité occupée en partie par de l'eau; il le remit au Directeur qui étoit avec moi, & qui me dit que cela n'étoit pas absolument rare, qu'il

en avoit déjà trouvé quelques-uns dans ce genre, & qu'il les avoit remis à différentes personnes. Dissipé par d'autres objets, entraîné par la diversité des questions que j'avois à faire, je ne pus m'occuper plus long-temps du phénomene que je venois d'observer; mais de retour dans mon auberge, & rapportant sur mon journal ce que j'avois vu, je fis de plus grandes réflexions sur cet objet. Je me rappellai que ce tonneau étoit le premier de ceux qui étoient dans la galerie de crystallisation, & du côté de la porte, & que ce crystal s'étoit trouvé, comme je l'ai dit, très - près du bord du tonneau. J'imaginai que ce phénomene n'avoit pu avoir lieu qu'avec le concours de l'air; je notai même alors cette idée sur mon journal. Ayant depuis repris cette matiere à l'occasion des crystaux à gouttes d'eau, j'ai été dans le cas de fortifier cette idée par plusieurs raisonnemens, d'après lesquels j'ai cru pouvoir déterminer l'origine de ces gouttes d'eau, ainsi que je l'ai fait.

C'est aussi de cette maniere que se sont formées les gouttes d'eau contenues dans la résine copal, que l'on a vendue à Paris sous le nom d'ambre jaune, pour lui donner plus de valeur; ce qui étoit assez inutile, vû que c'étoit par rapport aux gouttes d'eau qu'on les achetoit, & non par rapport à la matiere. C'est aussi de cette maniere que les gouttes d'eau dans le sel gemme se sont formées. Mais une chose, à l'égard des sels, qui doit étonner, c'est

de voir cette eau qui sur la surface du sel le sond, & ne l'attaque pas dans son intérieur; seroit - ce parce que l'eau n'agit qu'autant qu'elle est excitée par l'air, & que dès qu'elle est rensermée le plus hermétiquement possible, elle cesse d'agir? Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il y a cinq ans, un Conssseur de Paris imita assez bien les gouttes d'eau du crystal, en rensermant dissérentes liqueurs dans de petites capsules de sucre candi & transparent. Etant alors à Paris j'en achetai, & j'en ai conservé quelques-unes jusqu'à ce jour, sans m'être apperçu de la moindre évaporation. Cette expérience peut-elle être de quelque poids pour favoriser l'idée que je viens d'énoncer?

A l'égard des petites géodes de Vicence qui contiennent de l'eau, comme elles sont de la nature de l'agathe, matiere qui approche assez de celle du crystal, il y a apparence qu'elles ont été formées de même, ou que la matiere agathine a rebouché le trou par où l'eau étoit entrée; & l'air ayant agi sur l'extérieur qu'il a séché, cette eau s'est retirée dans le milieu de la géode, & y est restée.

Il faut observer que l'action de l'air ne peut produire cet esset que sur les matieres dures, telles que le crystal, l'agathe, &c. ou visqueuses, telles que les gommes ou résines & les sels; car si la matiere est calcaire, comme elle n'est pas d'une grande dureté, l'eau contenue dans l'intérieur trans,



pire toujours au dehors; & c'est pour cette raifon qu'on n'a pas encore vu des crystaux de spath avec des gouttes d'eau, ni des géodes calcaires contenant de l'eau, quoiqu'elles renserment des aiguilles de crystal qui s'ysont sormées par le concours de cet élément, telles que celles que l'on trouve à Die, à Meulan & à Remusat en Dauphiné, & que même quelques-uns de ces crystaux peuvent contenir des gouttes d'eau.

Plusieurs circonstances concourent à ce que ce phénomene ne puisse arriver dans les géodes calcaires: mais pour expliquer ce desséchement de l'eau dans ces géodes, il est à propos de dire un mot de ces sortes de productions

naturelles.

Les géodes sont composées de toutes sortes de matieres : nous en voyons d'agathe; i y en a de calcaires, d'argilleuses & de sa blonneuses; toutes ont pour origine l'eau qui aglutinant une certaine quantité de molcules terreuses, en forment des masses pl ou moins grosses, qui affectent différentes f mes. Ces corps venant à se sécher, éprouv un retrait intérieurement, qui forme dans milieu une cavité; mais si l'extérieur, diverses circonstances, éprouve plutôt l cheresse, les pores alors se resserrent croûte se durcit, & l'eau, ou au moi majeure partie, ne pouvant plus s'évap est forcée de rester dans les intervalles cavité, où elle donne naissance à ces cr que l'on apperçoit dans certaines géç particuliérement dans celles de Rem Dauphiné.

#### DE DIJON, 1784.

D'autres géodes sont composées de matieres tellement poreuses, qu'elles sont pénétrées facilement par les eaux qui filtrent à travers les terres, & qui, chariant avec elles des parties homogenes, & susceptibles par conséquent de crystallisation, forment dans l'intérieur des unes des crystaux de spath, dans les autres des mamelons de calcédoine, cornaline ou onix, suivant la teinte dont l'eau est chargée.

Enfin, il y a des géodes dont la matiere est mêlée d'une si grande quantité de sable, qu'elles ne peuvent retenir l'eau, dont elles sont humestées, assez long-temps, pour que cette eau puisse former quelques crystallisations particulieres; alors elles ne présentent au Naturaliste que des cavités vuides & peu intéressantes.

D'après cela, on doit penser que la plupart des géodes calcaires ne contiennent des crystaux qu'en raison de leur dureté. C'est ainsi que la pierre de Remusat, quoique calcaire. en contient, parce qu'étant fort dure, l'eau peut y séjourner quelque temps: mais dans les géodes de mamelons de calcédoine, telles que celles qui se trouvent près de Soissons, ou à cavités vuides, telles que celles que j'ai trouvées à Francheville près Lyon, on n'y trouve aucuns crystaux; parce que la terre, dont elles sont formées, étant très-poreuse, l'eau en a été absorbée par les terres voisines, dont les molécules, comme autant de tuyaux capillaires, ont pompé l'eau contenue dans la géode. Seulement on remarque que l'eau



s'étant retirée, la matiere qui remplit l'intérieur s'étant conséquemment séchée, elle a formé, dans son retrait, des fissures en différens sens, qui, dans quelques géodes, ont détaché quelques portions de cette matiere séche, ce qui produit le bruit que l'on entend quand on les secoue; semblables à ces géodes dites pierres d'aigle, avec cette différence que, dans celles-ci, il y a presque toujours un noyau étranger à la matiere, qui s'est formée autour par juxtaposition. Alors ces différentes couches ayant, en tous les sens, le même retrait sur elles-mêmes, elles laissent le noyau libre, qui fait le bruit que l'on entend lorsqu'on les agite. Il y en a cependant quelques-unes qui ne font aucun bruit, quelque mouvement qu'on leur fasse éprouver. Les anciens appelloient ces sortes de pierres d'aigle (dont le vrai nom est étites) pierres d'aigle femelles, pour les distinguer de celles qui font du bruit, qu'ils appelloient étites mâles. Mais la raison du silence des unes, vient de ce que la matiere s'est trouvée être, ainsi que le noyau, de même nature; alors ce noyau a lui-même essuyé le même retrait que les différentes couches. Il n'est donc resté aucun corps dans le milieu, par conséquent il ne peut résulter aucun bruit de ces géodes, lorsqu'on les secoue.

Voilà ce qui m'a paru de plus vraisemblable sur l'origine de ces dissérentes productions naturelles.

# MÉMOIRE

SUR la blende artificielle, ou combinaison du zinc & du soufre.

PAR M. DE MORVEAU.

NOUS ne sommes jamais assurés de connoître parfaitement les substances minérales, leur composition & leurs propriétés essentielles, que lorsque nous sommes parvenus à forcer la nature de les produire dans le laboratoire, c'est-à-dire, sous nos yeux, avec les matieres même que nous lui fournissons. C'est ce qui m'a engagé, depuis plusieurs années, à tenter diverses expériences pour former des mines artificielles. Je sais que quelques Minéralogistes sont dans l'opinion que la nature a d'autres ressources que l'art pour opérer ces combinaisons : ce sont précisément les termes dans lesquels M. Monnet a parlé de l'union du zinc avec le soufre, dans son Traité de la dissolution des métaux. Mais ce Savant n'a pas fait attention qu'il falloit distinguer les moyens & les procédés des combinaisons. Les procédés peuvent être différens, à raison d'une infinité de circonstances qui se rencontrent dans le vaste attelier

de la nature, & sur-tout à raison du temps qu'elle ne compte pas, & qui rend infiniés les forces des plus petits agens, exactement comme les puissances augmentent dans la méchanique, par la lenteur des mouvemens qu'elles impriment aux corps résistans. Mais il faut bien que les moyens soient les mêmes, puisque l'art n'a & ne peut avoir que ceux de la nature (1). Aussi, quoique tous les Chymistes aient regardé comme démontrée l'impossibilité d'unir le zinc au soufre (2), je n'ai pas hésité d'entreprendre de faire réussir \ cette combinaison, persuadé que s'il manquoit quelque chose à mes procédés pour obtenir une imitation parfaite; que quand pour abréger l'opération, & suppléer des circonstances qui ne

<sup>(1)</sup> Elémens de Chymie de l'Académie de Dijon, tom. 1er. pag. 13.

(2) Voy. Cramer, Elémens docimastiques, tom. 1er. pag. 246; Gellert, Chymie métallurgique, tom. 1er. pag. 176; Lewis, New dispensatory, pag. 249: M. Baumé, Chymie expérimentale, tom. 2, pag. 364; Erxleben, ansansgrund der Chemie, §. 770; M. Wenzel, verwandschaft der korper, pag. 402; M. Weigel, grundriss der Chem. tom. 2, pag. 562; Wasferberg, inslit. Chem. part. 2, pag. 53: M. Macquer, Distion. art. Zinc; & M. de Fourcroy, leçons élémentaires, tom. 1er. pag. 570. M. Sage croit que le sousse taires, tom. 1er. pag. 579. M. Sage croit que le foufre ne peut s'unir au zinc, que par le moyen de la terre qu'il nomme absorbante, avec laquelle il forme une espèce de soie de soufre; Elémens de Minéralog. tom. 3. pag. 119. Enfin, le célèbre Bergman a pensé luimême que le fer pouvoit être l'intermede nécessaire de cette union. Dissertat. sur les mines de Zinc, S. 8, H.



DE DIJON, 1783.

feroient pas à ma disposition, je serois obligé de substituer la fluidité séche à la fluidité humide; comme je n'aurois toujours fait que mettre en jeu les mêmes affinités, les mêmes attractions, les résultats de mes essais pourroient encore servir à esfacer une erreur, & découvrir une vérité de plus en Chymie, dès qu'ils montreroient le soufre & le zinc directement combinés, & sans intermede.

L'Académie peut se rappeller que j'ai mis sous ses yeux les produits de ces essais, à la séance du 28 Décembre 1780. Ce qui m'engage à revenir sur ce sujet, est un fragment dans lequel M. Dehne a traité la même matiere, & qui est inséré dans le Journal chymique de M. Crell, part. VI, pag. 49. Je commencerai par résumer ici les principales circonstances de mes expériences, & je serai ensuite connoître celles de M. Dehne: leur réunion me paroît donner la solution complette du problême.

### S. Ier:

Blende artificielle par la combinaison directe du soufre avec la chaux de zinc.

J'avois bien pensé que si on n'étoit pas parvenu à unir le zinc au soufre, ce n'étoit pas, comme on l'avoit conclu un peu trop légérement, qu'il n'y eût point d'affinité entre ces deux substances, mais parce nous n'avione

pas encore découvert le procédé nécessaire pour mettre en jeu cette assinité, ou, pour mieux dire, pour écarter ce qui y faisoit obstacle. J'avois observé, d'autre part, que la présence du sousser retardoit considérablement la susion de quelques substances métalliques; ce qui m'avoit sur-tout été rendu très-sensible dans mes essais de composition de pyrite artificielle d'étain. Je jugeai qu'il pouvoit en être de même du mêlange de sousse de zinc, & que probablement il n'y avoit d'autre difficulté que de mettre ces deux matieres en état de résister au degré de chaleur qu'exigeoit leur union par la susion.

Ces réflexions m'ont conduit à essayer la chaux de zinc. Comme j'étois encore dans l'opinion que le fer qui se trouve toujours, quoique souvent en très-petite quantité, dans les blendes, devoit faciliter la combinaison, ou du moins la rapprocher davantage de celles de la nature, je sis un mêlange exact de deux gros de sleurs de zinc, trèspures, obtenues par la simple calcination, un gros de sine limaille de fer, & deux gros de sleurs de soufre je plaçai ce mêlange dans un creuser de hesse, recouvert d'un autre creuset reaversé & bien lutté, qui sut exposé pendant une heure entiere au seu du sourneau

de M. Macquer.

Je trouvai, après le réfroidissement, au fond du creuset, un culot assez compact, d'un gris métallique, tirant un peu au rouge à sa surface: cette surface ésoit comme ridée;

#### DE DIJON, 1783.

le culot n'adhéroit qu'à un des côtés du creuset : l'ayant cassé, je remarquai à l'intérieur, une cavité qui formoit comme deux couches séparées. Le grain de la cassure étoit métallique, ou plutôt très-ressemblant, pour la couleur & le tissu, à la blende grise, folide, à petits grains, comme on en trouve dans les mines de Chessy, d'Huelgoet, &c. La partie supérieure du creuset étoit tapissée, en quelques endroits, d'une lame mince, d'un jaune irisant. Au fond du creuset renversé, qui servoit de couvercle, j'observai trois ou quatre petites aiguilles fines, brillantes, très-blanches, que je jugeai produites par la sublimation de quelques parcelles de soufre & de zinc, mais qui étoient en trop petite quantité pour être soumises à l'examen.

Le poids du culot, parfaitement débarrassé de toute matiere étrangere, se trouva de deux cent trente-cinq grains, c'est-à-dire, dix-neuf grains de plus que le soufre & le fer. Il étoit donc démontré, par cette seule circonstance, qu'il y avoit une portion de zinc combinée, puisqu'à supposer, contre toute vraisemblance, qu'il ne se fût point brûlé de soufre, que le fer en eût pu fixer le double de son poids, en un mot, que le zinc seul se fût détruit & volatilisé dans l'opération, il resteroit encore plus de - de la masse, qui ne pourroit être ni soufre, ni fer. Ce culot n'avoit d'ailleurs ni la couleur, ni la crystallisation, ni même la dureté de la pyrite martiale, soit naturelle, soit arti-



ficielle; il faisoit seu difficilement, & seulement lorsqu'on le frappoit sur un angle obtus; les angles aigus se laissoient entamer au conteau. La réunion de tant de circonstances ne permettoit plus de douter que ce ne sur un vraie blende artificielle, & même avec une proportion de zinc, au moins égale à celle de fer.

Ce premier fuccès m'enhardit à tenter cette combinaison, sans y employer le ser, ni aucune autre matiere qui pût servit d'intermede d'union, & en mêlant simplement le foufre & le zinc, toujours à parties égales, & observant de ne me servir, dans ces expériences, que des fleurs de zinc, que j'avois tirées de ce demi-métal, après l'avoir purgé de fer, à la maniere de Cramer. Il y a en quelques variations dans les produits, relativement au degré de feu & autres circonstances des diverses opérations; mais j'ai obtenu constamment une masse bien fondue, dont le poids excédoit de beaucoup le poids de l'un des ingrédiens, & qui étoit conféquemment une vraie blende artificielle, ayant d'ailleurs tous les caracteres de celle que je viens de décrire.

En soulevant le couvercle du creuset, dans le commencement de l'opération, j'ai eu occasion de me convaincre que la fusibilité du soufre étoit aussi sensiblement diminuée par la présence de la chaux de zinc.

J'ai vu une autre fois, en examinant ce qui se passoit dans le creuset, que la chaux

43

de zinc avoit repris un coup-d'œil métallique, même avant toute fusion, & conservant encore

l'état pulvérulent.

Enfin, dans l'un de ces essais, j'ai obtenu des crystaux prismatiques sublimés, & attachés aux parois du creuset renversé, qui servoit de couvercle, & qui garnissoient presque toute la surface de l'un des côtés. Ces crystaux avoient une parfaite analogie avec la blende jaunâtre, par leur couleur & leur éclat.

L'affinité ainsi établie, il ne me restoit plus qu'à m'approcher encore davantage du procédé même de la nature, en décidant, par la voie humide, l'action de l'une des substances sur l'autre. J'ai trituré, pour cela, divers mêlanges de soufre pulvérisé, & de . fleurs de zinc, humectés à différens degrés : je les ai laissés ensuite plusieurs jours à l'air libre, quelquefois recouverts d'eau distillée, & je n'ai rien apperçu qui annonçât une véritable combinaison; j'ai vu seulement que la chaux de zinc avoit pris, à la surface de quelques-uns de ces mêlanges, une couleur grise assez soncée, & ce changement m'a convaincu qu'il n'étoit pas impossible de décider une réaction plus complette. Il me paroît évident en effet, qu'il ne manque ici que la circonstance de la fluidité des deux substances, ou seulement de l'une des deux. Pour produire cet état de fluidité, il faut un dissolvant: l'eau pure ne peut en servir, comme l'indique la théorie, & comme le prouvent mes essais. Mais l'eau chargée d'acide més

phitique, dissout les chaux métalliques, sufceptibles de se combiner avec le même gas; tout de même que les sels les plus insolubles s'unissent à leur acide par excès : il y a plus, j'ai fait voir (1) que le foufre lui-même pouvoit être tenu en dissolution par l'eau méphitisée. Voilà le dissolvant dont il faut essayer la puissance, avant que de prononcer que la nature a d'autres moyens que l'art. La Chymie moderne l'a introduit dans ses laboratoires. L'effet en sera lent sans doute, comparé à la courte durée de nos opérations les plus familieres : il sera petit, & dans le rapport très-borné de la capacité de nos vaisseaux; mais il n'en sera pas moins entier dans ces proportions de quantité. Voulonsnous acquérir la pleine possession de cet agent si long-temps méconnu, si universellement répandu, si puissant dans les mains de la nature? Il est temps de perdre l'habitude de compter peu pour rien.

Cependant sans attendre le résultat de l'expérience nouvelle que je viens de proposer, il me paroît que l'on doit déjà tenir pour constant que le sousre peut s'unir au zinc. Peut-être sera-t-on tenté d'objecter, d'après les circonstances de mes procédés, que cette union ne peut avoir lieu que quand le zinc est présenté au sousre en état de

<sup>(1)</sup> Nouveaux Mém. de l'Acad. de Dijon, 1° . Sem. 1782, pag. 172 & 173.

chanx, & que le soufre ne peut l'attaquer, lorsqu'il a la forme métallique. Je remarquerai d'abord que cela n'intéressoit en rien l'imitation parsaite de la blende, puisque les Minéralogistes doutent encore s'il existe réellement du régule de zinc natif, & qu'ainsi, la nature trouve elle-même, le plus souvent, les matériaux de cette production dans l'état qui dispose leur affinité. Mais je ne dois pas laisser penser que ce soit la présence du principe métallisant qui fasse réellement obstacle à la combinaison; & pour établir le contraire, il me suffira de faire connoître les expériences de M. Dehne.

#### S. II.

Blende artificielle par la combinaison du soufre & du zinc en état de métal.

M. Dehne étoit, comme tous les Chymistes, dans l'opinion de l'indissolubité absolue du zinc par le soufre, lorsqu'il eut communication d'une recette manuscrite qu'il crut avoir été tirée de quelqu'ancien livre, & qui sut l'occasion de son travail.

Cette recette, bien digne en effet des premiers temps de la chymie, étoit fort recommandée contre l'épilepsie, la paralysie, la goutte & les maux de nerfs. Elle étoit ainsi

conçue.

" On fait calciner dans un vaisseau de fer

46

» plat, une livre & demie du zinc qui vient » des Indes Ofientales, avec une pareille » quantité de soufre, pour le purisier par-là » d'une portion de plomb & d'arsenie qui » peuvent s'y trouver. Le zinc ne se brûle » pas, si on répand dessus de la poussiere de » charbon de la hauteur de deux doigts, & qu'on remue continuellement avec un bout » de tuyau de pipe: après que tout le soufre » est brûlé, on coule le métal fondu, & on-" le convertit en fleurs dans un creuset. On " verse sur cette chaux de zinc un quart de » son poids de fort vinaigre, & on fait digérer » pendant huit jours à un feu doux : après les » premieres vingt-quatre heures on y ajoute » une once d'eau forte. Les huit jours écoulés » on décante la dissolution, on y remet pour » lors un quart de vinaigre que l'on fait di-" gérer encore pendant huit jours. Les disso-» lutions réunies & filtrées sont miles dans la » cornue pour en séparer le vinaigre par la » distillation; & on ajoute par demi-once du » résidu salin, une once d'esprit de vin très-» rectifié, & pareille quantité d'urine & de " bon esprit de sel ammoniac. Il se forme sur » le champ une gelée (offa helmontii); le mê-» lange prend dès le premier jour, par la di-» gestion, une couleur orangée, il devient " rouge le second jour ; & pour lors tout passe à une douce distillation, comme une » teinture rouge de sang. Je dirai en passant, pour ceux qui seroient

#### DE DIION, 1783.

47 entieux d'apprécier cette recette, que M. Dehne l'a suivie exactement dans tous ses procédés, qu'il obtint à la distillation, d'abord un sel, ensuite des gouttes blanches qui dissolvoient le sel, puis des stries grasses comme dans la distillation de l'éther, après cela un sublimé brun; enfin, à un feu très-violent, des gouttes jaunes, tournant promptement au rouge, qui se méloient à la liqueur du récipient. Il y eut un résidu grisatre assez considérable; il trouva du sel ammoniac sublimé au col de la cornue; la liqueur étoit colorée comme du vin, elle avoit à peu près l'odeur & la saveur de l'esprit de corne de cerf. On a lieu de regretter que M. Dehne n'ait pas poussé plus loin l'examen de ce produit, pour déterminer à quelle substance ou à quelle combinaison il devoit cette couleur, & pour en simplifier le procédé visiblement surchargé d'opérations inutiles, comme toutes les an-

ce Mémoire. Ce fut en travaillant à cette préparation. que ce savant Chymiste commença à soupconner que le zinc étoit dissoluble dans le soufre. Ayant mis fondre huit onces de zinc très-pur, couvert de soufre & de poussiere de charbon, il fut fort surpris de voir qu'il se changeoit très-promptement en une chaux d'un jaune brun ; avant que tout le soufre fût brûlé, la masse métallique avoit entiérement disparu, au point qu'il ne lui fut pas possible

ciennes formules; mais je reviens à l'objet de

d'en rien couler; cependant il eut bientôt occasson de se convaincre que le zinc ne s'étoit pas dissipé en sleurs, puisqu'il resta une matiere grise semblable à une scorie de sousre brûlé, dont le poids égaloit, à très-peu de chose près, celui de tous les ingrédiens pris ensemble.

Une autre fois, ayant ajouté quelques onces de soufre à douze onces de zinc sondu & couvert de poussière de charbon, au bout de quelques minutes, le zinc se changea en partie en une substance d'un gris obscur; il versa promptement le métal qui restoit, il se trouva déjà diminué de deux onces, quoiqu'il n'y eût sur le total des matieres employées, qu'un déchet presqu'insensible.

Ces observations réunies à celles que j'ai rapportées dans la premiere partie de ce Mémoire, me paroissent ne laisser aucun doute sur la possibilité de dissoudre le zinc par le sousre, soit qu'on le lui présente en chaux, soit qu'on le lui présente en régule, & de former ainsi une combinaison qui a intrinséquement les principaux caracteres de la blende

naturelle.



## SUITE

DES observations d'Histoire naturelle dans la traversée de Bourgogne, &c. (1)

PAR M. PASUMOT.

NE singularité aux environs de Beaune, est ce que l'on nomme Genes. C'est une espèce de fontaine qui sourdit tout-à-coup au pied du côteau, à un quart de lieue au nord-est de l'Aigue, au milieu d'une vigne, quelque temps après qu'il a beaucoup plu, & qui sournit un volume d'eau, souvent considérable, pendant six, huit, quinze, vingt jours, & quelquesois davantage, selon que les pluies durent ou ont duré. Ce phénomene excite une curiosité naturelle, & chacun raisonne beaucoup, sans en connoître la cause, qui cependant est très-simple. La voici exacte, à ce qu'il me paroît.

à ce qu'il me paroît.

D'abord il faut observer que le lien où l'eau sourdit, se trouve vis-à-vis d'une espèce d'anse dans la côte, à laquelle répond un petit vallon élevé qui sépare deux têtes

<sup>(1)</sup> V. la premiere partie dans le second Sémestre de 1782, pag. 111.



du côteau, & qui ne fournit jamais d'eau. Ainsi, l'eau qui y tombe, pénétre dans l'intérieur des roches qui forme le noyau de la montagne. En fecond heu, le sommet de la côte, dans cet endroit, n'est point un plateau uniforme, mais il y a beaucoup de cavités, d'espèces de vallons qui n'ont aucune issue, & qui renferment l'eau jufqu'à ce qu'elle ait pénétré dans l'intérieur de la montagne. En troisiéme lieu, avant que Genet ne sourdisse ( en langage vulgaire, avant qu'il ne leve le cul, ) toutes ces hautes cavités sont remplies d'eau. Ces eaux pénétrent l'intérieur de la montagne, se rendent toutes au même endroit, par une disposition naturelle, & sourdissent ensuite au milieu de la vigne. Ce qui confirme cette explication, c'est que d'après le témoignage des gens qui fréquentent ces endroits, toutes les cavités, tous les lieux où l'eau reste en dépôt, s'épuisent à mesure que Genet jette, & il ne commence à sourdir que lorique tout est rempli d'eaux stagnantes fur, la bauteur.

Ce qu'il y, a de plus fingulier au fujet de cette fontaine, c'est que lorsqu'elle commence à sourdir, c'est ordinairement le signe de la cessation des pluies, & du retour du beautemps. J'en ignore la raison, & je pense qu'il n'est guere possible de la connoître, à moins que l'on n'ait des observations exactes sur l'état de l'athmosphere, avant que la fontaine ne sourdisse, & sur les différentes circons-

### D t D i J o N, 1783;

31

tances dans lesquelles elle commence à sourdir.

J'ai trouvé, avec étoinement, dans le cours de ce ruisseau, une lave volcanique, que l'ai cassée en deux portions ( j'en ai donné une à M. Ganiare de Bessey, & l'autre à Dom Rerol). Après avoir réssechi comment cette pierre étrangere pouvoit se trouver dans cet endroit, & qu'elle n'avoit pu y avoir êté amenée anciennement par les caux de la Saone, parce qu'il n'y à point en de volcans dans les Vosges; je me suis rappelle qu'il a existé autrefois, à peu de distance, un Village nomité Sanvigne; & j'ai vu, par des fragmens de tuiles antiques, qu'il y avoit eu là une habitation fomaine. Dès-lors mon étonnement a cessé. Cette lave aura surement été apportée du temps des Romains, qui les employoient à faire des petits moulins à bras, qu'on apportoit d'Italie dans les Gaules. Ce fait n'a pas befoin que je le prouve. Il explique aussi pourquoi s'ai encore trouve de la lave volcanique aux environs de la colonne de Cuffy, & pourquoi il existe encore dans ce Village, à côte de la Cure, une moitié cave d'un de ces perits moulins, qui fert d'abreuvoir à la volaille.

La position singuliere de Vollenay mérité quelques considérations, qui doivent trouver ici leur place. Ce Village est situé à mi-côte, dans un enfoncement rond, qui, vu d'une certaine distance, ressemble parfaitement bien au cratere d'un volcan éteint, qui se seroit



Ce phénomene physique est assez intéressant pour mériter que l'on s'occupe d'en donner l'explication, le proposai ce problème, en 1774, dans le Journal de Physique, tom. III, pag. 126. Un Auteur, honnête & modeste, essaya de répondre à la question par la même voie, tom. III, pag. 429. Son explication m'ayant paru insussissante, je repliquai par le même Journal, tom. IV, pag. 34. Comme depuis cette époque, personne n'a résolu le problème, je vais essayer d'en donner la solution.

Afin de pouvoir y procéder complétement, j'avois déjà observé que l'air se dégage des vapeurs qui empêchent ordinairement que l'on ne voie ces montagnes, sans que les girouettes l'annoncent; que les barometres commencent quelquefois à indiquer cette variation dans l'air, & que souvent ils ne l'indiquent pas, que la pluie survient par les vents de sud-sud-ouest, sud-ouest, & ordinairement par celui d'ouest, & que lorsque l'athmosphere est assez préparée à la pluie, alors les girouettes tournent, & le mercure a baissé. Ordinairement c'est lorsque les vents que je viens de nommer, soussient sans donner de pluie, que ces montagnes deviennent visibles; & si c'est dans un intervalle de temps pluvieux qu'on vient à les voir, le mauvais temps augmente, ou tout au moins continue encore sans augmenter.

D'après ces données dans le problême en question, j'établirai en fait, & non pas en



DE DIJON, 1783.

55

supposition, que lorsque les vents pluvieux indiqués viennent à fouffler, comme ils font orageux, & presque toujours rapides, ils causent, d'une part, par l'humidité qu'ils portent, & d'autre part, par l'évaporation que Jeur rapidité occasionne, un réfroidissement dans la couche de l'air qu'ils traversent, & qui n'y existoit pas auparavant. Cette couche étant réfroidie, les vapeurs s'y condensent, & s'y condenseront de plus en plus. Mais la couche inférieure étant moins froide. & les autres couches étant d'autant plus chaudes, qu'elles approchent plus de la surface de la terre, alors elles raréfient les va-peurs aqueuses. L'air dissout alors ces vapeurs qui deviennent invifibles. Il s'en charge jusqu'à saturation, & l'excédent de cette saturation refluant jusques vers la terre, s'y précipite en serein ou rosée, si les couches les plus chaudes n'ont pas tout absorbé, Alors l'air est nettoyé, dans ces couches inférieures, par la raréfaction & dissolution des vapeurs. L'air paroît très-serein, & les objets éloignés, que les vapeurs moins raréfiées rendoient invisibles, deviennent d'autant plus visibles, que la raréfaction des vapeurs est plus grande, & la dissolution plus complette. Ainsi, dans cet état de l'athmosphere, l'on doit voir les sommets des Alpes, de Beaune & des autres endroits qui ont à peu près la même exposition, quoique la distance soit d'environ cinquante lieues, parce qu'alors la couche de l'air refroidie, qui occasionne la

D iv



dissolution des vapeurs dans les couches inférieures, est plus élevée que le sommet du grand Saint-Bernard, & de l'autre montagne qui est visible.

Ces effets s'operent, & cette variation d'état a lieu dans l'air sans que les girouettes tournent, parce qu'elles sont inférieures à la couche d'air dans laquelle le premier changement arrive. Quand la couche d'air, dans laquelle la condensation des vapeurs s'opere, fe trouve n'être qu'à la hauteur des montagnes élevées, il est de fait que leurs sommets commencent à se couvrir, & ensuite s'envelopper de vapeurs ou fumées paisibles, qui ne deviennent agitées que quand il s'est établi un certain degré de froid, foit par l'abondance des vapeurs, soit par la rapidité du vent. Avant que ce terme soit, ou arrivé, ou prêt d'arriver, les barometres, ou n'indiquent rien, ou ne donnent qu'un commencement d'indication, pour deux raisons. La premiere, c'est qu'avant qu'il arrive du changement, & pendant que l'air s'y dispose, il y a un état de stagnation qui est tel, que l'équilibre n'est point encore détruit. La seconde raison, c'est que la différence de pefanteur & de densité de l'air n'étant pas encore uniformément établie, elle ne passe d'une couche à l'autre que par une succession un peu lente. Mais aussi quand la variation d'équilibre a influé jusques sur les couches d'air inférieures, alors les barometres l'indiquent; & comme les vents pluvieux amoncelent les vapeurs, les entassent, les condensent de plus en plus & fort promptement, la pluie doit aussi suivre sans beaucoup tarder, & elle arrive essectivement.

Les vents du sud-est & sud-sud-est ne sont point des vents froids pour la France, à moins qu'il n'y ait quelque cause locale. Leur effet est de refouler les vapeurs vers le nord-ouest & nord-nord-ouest. Comme leur degré de température ne réfroidit point la couche d'air qu'ils traversent, la couche inférieure ne devient pas plus chaude. Les vapeurs aqueuses restent donc dans leur état, sans qu'elles puissent être ni rarésiées, ni dissoutes par en bas. Ainsi, ces vents nettoient moins l'air que les vents de sud-ouest & sud-sudouest, qui, réfroidissant leur couche aérienne, détruisent l'équilibre dans l'air, & font que les conches inférieures étant plus chaudes, elles raréfient les vapeurs aqueuses, & les raréfient jusqu'à dissolution.

Telle est au moins, à ce qu'il me semble, l'explication la plus vraie & la plus éxacte qu'il soit possible, du phénomene de la vision des Alpes, comme signe certain du mauvais temps qui doit suivre promptement, & qui suit en esset. Ce même phénomene ayant lieu dans beaucoup d'autres endroits qu'à Beaune, cette solution du problème est la même pour Lyon, pour Chalon, pour Beaune, pour Nuits, pour Dijon, & même pour Langres, où ce n'est point les Alpes, mais les Vosges



que l'on voit dans les mêmes circonfiances & avec la même suite de mauvais temps.

Comme je viens d'établir mon explication comme affaire de fait & non pas de supposition, je vais en donner la preuve dans les

observations suivantes.

I. Le 13 Septembre 1776, étant au sommet du Puy de Dôme, avec M. Desmarost de l'Académie Royale des Sciences, & M. Duboulay, sous-Ingénieur de la Province d'Auvergne, il souffloit un vent violent de sud-ouest, qui avoit regné la nuit précédente, & qui vers une heure après midi amena des flots de nuages qu'il avoit préparés, & qui étoient des sumées épaisses très-froides qu'il poussoit très-rapidement. Après avoir enveloppé le sommet de la montagne, ces fumées commencerent à s'abattre vers le bas. A mesure qu'elles faisoient, pour ainsi dire, effort pour s'abattre, elles devenoient tout d'un coup une espèce de vapeur subtile qui disparoissoit, parce qu'elle étoit absorbée par l'air inférieur : l'instant d'auparavant la fumée déroboit la vue des objets qui redevenoient visibles au même instant. Il s'opéroit donc une raréfaction subite dans la couche d'air inférieure, parce qu'elle étoit plus chaude que la supérieure qui poussoit les fumées aqueules. Les nuages s'étant ensuite augmentés & fort épaissis, parce que le vent les avoit accumulés & condensés de plus en plus, il plut depuis six jusqu'à sept heures. Le thermometre, qui à deux heures étoit à douze degrés de dilatation, baissa successivement. A

huit heures du soir, il n'étoit qu'à neuf degrés, & la pluie reprit avec violence. Je passai la nuit sur le sommet de la montagne avec M. Duboulay, fous une canonniere. Le vent n'ayant point diminué, la nuit fut froide, humide & très-fâcheuse. Que l'on imagine être au centre d'un volume d'eau confidérable & très-agité, roulé par un fleuve impétueux & très-rapide, voilà ce que nous éprouvâmes. Je ne puis comparer le bruit continuel du roulis d'une masse d'air chargée de vapeurs épaisses, & poussée avec toute l'impétuosité imaginable, qu'à celui des flots de la mer en tourmente, excepté que le vent ne sisse point alors. Il gronde & s'élance par bourrasques, qui semblent devoir emporter tout avec elles.

Le lendemain 14, à cinq heures & demie du matin, le thermometre n'indiquoit plus que six degrés de dilatation; à onze heures il n'étoit plus qu'à cinq degrés & demi; à midi il étoit remonté à lept degrés, & il ne remonta plus. Mais en jetant de l'eau sur la boule qui étoit exposée à toute la rapidité du vent qui n'avoit pas cessé, & qui étoit telle que nous ne pouvions nous tenir de bout, la liqueur baissa encore jusqu'à un degré au dessus de zéro, parce que c'est un fait avéré que l'évaporation subite cause & augmente le froid jusqu'à congellation. L'état de l'athmosphere étant toujours le même, excepté seulement que les nuages étoient plus clairs, nous quittâmes notre station. Nous trouvâmes, à mesure que nous descendimes, une température

60

de plus en plus chaude. A Clermont, cinq cent cinquante-sept toises au dessous du sommet du Puy de Dôme, le thermometre n'avoit pas baissé au dessous de quatorze degrés de dilatation.

Il n'est pas nécessaire d'être sur le sommet d'une très-haute montagne, pour observer la condensation des vapeurs dans la couche du vent, & leur raréfaction dans les couches inférieures: chacun peut faire cette observation vers la fin de l'automne, lorsque les brouillards se promenent sur les montagnes d'une hauteur médiocre. On remarquera que la portion la plus inférieure des vapeurs est beaucoup moins épaisse que celle de dessus, & que lorsque quelque bouffée de ces vapeurs obéit à un coup de vent qui l'abat, alors elle se dissipe, ou bien elle remonte en partie, si elle est trop épaisse. Il faut, pour bien faire cette observation, s'élever jusqu'à la couche inférieure des vapeurs. On observera, par le moyen d'un thermometre, que la couche des vapeurs deviendra de plus froide en plus froide.

II. Le 22 Septembre 1773, nous partîmes du Village d'Orcine, M. Desmarest & moi, à deux heures un quart du matin, pour monter au Puy de Dôme avant le lever du soleil. Le ciel étoit clair & l'air pur. Il soussioit un vent de sudouest qui étoit assez fort. Après avoir un peu cheminé, nous observames que nous nous trouvions à mi-corps dans une couche d'air sort chaude, tandis que la moitié supérieure

du corps étoit dans une autre couche froide, & si froide, que pour nous réchausser, nous nous assimes à terre, & que nous nous trouvâmes alors tout-à-fait plongés dans l'air chaud. A mesure que nous montâmes, le vent se trouva plus violent & en même temps plus froid. Avant quatre heures nous étions arrivés sur le petit Puy de Dôme. Nous espérions que le vent pourroit tomber au lever du soleil. M. Desmarest resta sur le petit Puy, & je montai au fommet du grand, plus élevé d'environ cent toises, & où j'arrivai à cinq heures un quart. Le vent, au lieu de se ralentir, augmenta en froid & en violence. A six heures & quart le thermometre étoit à dix degrés de dilatation. Les Monts-d'Or étoient chargés de brouillards, & le nord-est de l'horizon étoit noir de nuages. A fix heures & demie le thermometre avoit baissé à neuf degrés. Les hauts sommets des Monts-d'Or se dégageoient, & il n'y avoit que les montagnes inférieures qui conservoient encore leurs brouillards. Le vent étoit toujours le même & de plus en plus froid. A fix heures trois quarts le thermometre n'étoit plus qu'à sept degrés trois quarts: alors il survint des sumées poussées très-rapidement, qui s'épaissirent, entourerent la montagne, & déroberent la vue de la plaine; elles augmenterent de plus en plus. L'impression d'humidité qu'elles déposoient, augmenta le froid. Le thermometre tendant encore à baisser, alors je descendis vers M. Desmarest, qui n'avoit eu pour plus grand réfroidissement, que huit degrés trois quarts, parce que les sumées ne s'étoient point abaissées jusqu'à lui. Les nuages se dissiperent & le vent ne diminua pas; mais alors nous descendimes de la montagne.

Je pourrois ajouter encore d'autres observations; mais ce ne seroit qu'une surcharge au détail des deux que je viens d'exposer. On me dispensera sans doute de prouver qu'une couche de vent peut exister dans la région supérieure, sans que l'on en sente la moindre impression à la surface de la terre, & réciproquement que le vent peut exister dans le bas seulement, sans qu'on le ressente dans le haut.

Mais d'après ces faits qui prouvent la théorie de mon explication, il n'y a plus lieu d'être étonné de deux autres phénomenes très-ordinaires en automne: les voici.

Lorsque dans cette saison les brouillards qui précedent les premieres gelées, se dissipent en s'élevant, c'est un signe infaillible de pluie pour le lendemain, parce que la chalent de l'air d'en haut rarésant ces vapeurs, estes s'élevent dans la moyenne région jusqu'à ce qu'étant réstoidies par l'absence du soleil, elles se condensent pendant la nuit, & retombent en phrie le matin & pendant le jour, parce que les conches d'air inférieures sont encore plus froides que les supérieures.

C'est par les mêmes raisons que les gélées blanches d'automne sont encore un pronostic affez assuré de pluie pour le lendemain. Ces premieres gelées ne sont autre chose que des brouillards précipités à terre, où ils se con-



#### DE DIJON; 1783.

63

densent presque jusqu'à la glace: souvent même, & presque tonjours, il reste une portion de ces brouillards, qui, sans être tout-à-fait précipités, couvrent la surface de la terre. Alors la premiere croute terrestre étant résroidie, ainsi que la couche d'air qui lui est la plus contigue; la chalent du soleil levant rarésie les brouillards & dissout la gelée blanche, dont une partie considérable s'évapore. Toutes ces vapeurs remontent, & il doit pleuvoir le lendemain.

Un autre phénomene ordinaire sur la sin de l'autonne, & même dans le commencement de l'hiver, c'est de voir que lorsqu'une couche de brouillards est abaissée vers la surface de la terre, les rivieres & les ruisseaux, ainsi que toute plage aqueuse, évaporent beaucoup

par une fumée fort épaisse.

Dans cette circonstance, le fond des eaux est plus chaud que la couche d'air, quoique moins chaude que le fond de l'eau, l'est encore assez pour se charger des vapeurs qui s'élevent jusqu'à la couche d'air au dessus qui les reçoit encore, mais qui étant plus froide, les condense & les entasse en épaississant les brouillards, souvent jusqu'au point d'obscurcir le soleil. Ordinairement cette couche de brouillards est peu épaisse. Il est aisé de la traverser montant une montagne: on se trouve alors supérieur à la région des brouillards; on jouit de la lumière & de la chaleur du soleil, tandis

qu'en bas on est enseveli sous la couche nébu-

leute, & que l'on y éprouve du froid.
Lorsque cette évaporation des plages aqueuses a lieu, sans qu'il y ait une couche de brouillards, au moins visibles, près de la surface de la terre, c'est toujours parce que le fond des réservoirs aqueux est plus chaud que la couche d'air. C'est aussi par la même raison que lorsque dans les fortes gelées, l'on casse la glace d'une riviere ou d'un étang, l'on voit sortir de l'eau une fumée qui peut étonner. Mais quand cette fumée a lieu en cassant la glace d'une auge de pierre, ou même d'un tonneau, ce n'est ni le fond ni les parois qui sont plus échaussés que l'air, puisqu'ils sont eux-mêmes tapissés de glace, mais c'est le centre de l'eau dont la chaleur se trouve concentrée par la glace qui l'environne de toute part.

## **OBSERVATIONS**

SUR différentes tumeurs polypeuses.

PAR M. ENAUX.

ES tumeurs polypeuses & le traitement qui leur convient, sont assez connus pour ne pas entrer dans des détails à ce sujet; à moins que les observations sur cette maladie ne contiennent

65

tiennent des faits rares qui puissent persectionner le manuel de l'opération. C'est sous ce seul point de vue que je ferai l'exposition des faits de pratique dont l'expérience seule peut faire appercevoir l'utilité.

Je commencerai par donner l'histoire d'un polype qui avoit son siège dans le canal in-

testinal.

#### PREMIERE OBSERVATION.

# Sur un polype intestinal.

Ce polype, heureusement très-rare, n'a pas encore été décrit, au moins je ne connois aucun Auteur qui en fasse mention; cependant on peut trouver une observation qui a du rapport à cette maladie: elle est insérée dans le Journal de Médecine, Cahier du mois d'Août, année 1777, sous le titre de maladie singuliere, &c.

Mais cette observation a pour sujet le même malade que j'ai traité. L'Auteur qui résidoit à Paris, s'est rapporté à un récit insidele. Il a si sort altéré les faits, que je me crois obligé de les rétablir par amour seul de la vérité. J'ai d'ailleurs l'avantage de pouvoir appeller en témoignage MM. Maret, Durande & Hoin, qui ont vu le malade avec moi, & ont assisté à l'opération.

M..... âgé de 46 ans, d'un tempérament mélancolique, naturellement décoloré, éprouva dans sa jeunesse des indispositions

E

qui paroissoient dépendre d'un engorgement lymphatique. Parvenu à l'âge de 36 ans, il sut incommodé d'hémorrhoides internes qui déterminoient un écoulement de matieres glaireuses & sanguinolentes. Cette indisposition se soutint pendant plusieurs années.

Au commencement de 1774 le malade refsentit des douleurs assez vives dans toute l'étendue du ventre & avec pesanteur sur le siège. Un flux de sang hémorrhoïdal donna du soulagement. Je ne rappellerai pas ici tous les disférens remedes internes dont le malade sit usage; je dirai seulement qu'ils surent pris dans la classe des purgatis, & la poudre d'Alliaut y tint le premier rang.

Ce fut à la suite de ces remedes que le malade rendit une tumeur globuleuse, sa sortie fut suivie d'une hémorrhagie affez considérable. Depuis cette époque le tenesme se soutint au point que le ventre devint sensible, & la sortie d'une seconde tumeur semblable à la précédente, parut donner de la rémission dans les accidens. Je vis alors le malade pour la première sois.

Je le trouvai ayant de la fiévre, la bouffissure étoit très-marquée sur le visage. J'examinai la tumeur, elle avoit le volume d'un œus de poule, sa surface étoit lisse, & sa substance spongieuse avoit un pédicule membra-

neux, très-court & frangé.

Comme la pesanteur sur le siège entretenoit un tenesme fréquent, sans pouvoir aller à la garde-robe, je portai le doigt dans l'intestin;



67

j'y découvris une tumeur semblable à celle que le malade venoit de rendre, elle étoit adhérente au recum, & distante de quatre travers de doigt environ de l'anus.

Etant assuré de l'adhérence de ce corps étranger, je ne m'occupai plus que du moyen

de l'extirpation.

Il y avoit trop d'analogie entre cette tumeur & le polype utérin, pour ne pas employer le même moyen; je veux parler de la
ligature. Mais comment porter les deux canules de Levret armées d'une ficelle, pour embrasser la tumeur jusqu'à sa base? Le rétrecissement naturel de l'anus en rendoit la manœuvre trop dissicile. Comment à travers le
sphincter introduire la canule armée d'un fil
d'argent, dont l'anse doit nécessairement être
développée en grande partie avant son introduction? On sait de plus quelle est l'insidélité
de ce lien, qui se casse par la torsion & rend
l'opération insructueuse.

L'instrument de M. Herbiniaux n'étoit pas plus applicable à mon sujet, à raison du porteanse qui doit diriger le lien; l'étroitesse du

lieu s'opposoit à son introduction.

Tous ces moyens me paroissant insuffisans, j'imaginai qu'un seul instrument armé d'un lien, qui réuniroit tout-à-la-fois la flexibilité de la ficelle avec la solidité du fil d'argent, sans en avoir l'inconvénient, rempliroit assez mon objet pour former aisément une anse qui, embrassant la tumeur, en faciliteroit la chûte.

Pour oet effet je me servis de la quatriéme



corde de violon, plus solide que les cordes à boyaux ordinaires, & moins exposée à se ramollir à raison du fil de laiton qui l'entoure; je la plaçai dans la double canule de M. Levret; je sixai une des extrêmités de la corde à un anneau, & je passai l'autre portion dans la seconde canule, que je laissai mobile pour l'u-

sage suivant.

Le malade placé sur le bord de son lit, dans lune fituation à recevoir un lavement, je por--tai l'index dans le rectum, pour m'assurer de quel côté la tumeur étoit adhérente. Je glissai -la canule armée de la corde sur le doigt que j'avois introduit, & je la poussai jusqu'à la tumeur; alors je développai la corde qui forma une anse, que je dirigeai avec l'index 'autour du polype. Quand je fus assuré que l'anse embrassoit circulairement la tumeur, je foutins cette anse du côté opposé à la canule, & je poussai en même temps cette même canule pour porter plus avant la ligature qui devoit saisir le pédicule de la tumeur. Je retirai alors le doigt pour soutenir la canule de :la main gauche, & tirer ensuite la portion mobile de la corde, qui par cette manœuvre ferra le pédicule contre la canule.

Je fus bientôt assuré que j'avois sais la tumeur à l'endroit du pédicule, par la douleur que le malade éprouva en retirant la portion de la corde qui devoit former l'étranglement de la tumeur. Je fixai l'extrêmité de la corde à un anneau placé à la partie inférieure de la canule, je la laissai en place, je l'enveloppai

GQ.

d'un linge, & je plaçai le malade dans son lit, couché sur un des côtés. Je prescrivis un régime relatif à son état.

Le sixième jour la tumeur se sépara, & le pédicule membraneux qui étoit engagé dans l'anse, avoit alors le volume d'une plume ordinaire.

La tumeur, qui égaloit un œuf, étoit flétrie,

sa substance étoit spongieuse.

La sortie de ce polype rendit la liberté au canal intestinal, les évacuations devinrent ordinaires, les selles furent moulées, ce qui assuroit de l'état naturel du rectum. Je fis plus, je voulus m'en convaincre en y portant le doigt.

La convalescence ne sur point longue; le malade ne tarda pas à vaquer à ses affaires ordinaires, qui l'obligeoient à différens voyages.

Le rétablissement de la santé paroissoit mettre à l'abri de toute crainte; mais six mois après cette opération, le malade ressentit de nouvelles irritations dans le canal intestinal. Tous les symptomes se renouvellerent assez pour faire craindre la présence d'un corps étranger semblable aux précèdens.

J'examinai de nouveau l'état du rectum, j'y trouvai une tumeur égale en tout aux précédentes. Le malade crut que la chûte pourroit être spontanée, il disséra à se soumettre à une seconde opération. Il tenta dissérens remedes pendant l'espace de deux mois, après lequel temps il revint ici, & je le vis avec M. Durande. Le malade avoit alors une siévre



#### O ACADÉMIE

lente, le visage étoit décoloré, & la bouffissure étoit universelle. Comme les déjections se faifoient difficilement, je tentai la ligature; le moyen étoit trop simple; & il étoit indispenfable pour faciliter les évacuations. Je sis cette opération en présence de MM. Durande & Hoin, avec autant d'aisance que je l'avois faite la premiere sois en présence de M. le Docteur Maret. La tumeur se sépara après quelques jours; mais la sièvre se soutenant, le dépérissement augmenta, & le malade mourut six semaines après cette derniere opération.

L'ouverture du corps devoit présenter quel-

ques phénomenes intéressans.

M. Hoin, en mon absence, se chargea de cette opération qui sut saite en présence de M. Durande.

Le siège des polypes sut le premier objet des recherches.

L'intestin rectum avoit plus d'épaisseur que de coutume.

Cet intestin ne rensermoit aucune tumeur, on observoit seulement à sa surface interne & à son tiers supérieur, quelques mamelons superficiels, qui par leur dureté annonçoient qu'ils étoient l'esset de la cicatrice formée dans le temps de la séparation du pédicule de chaque tumeur.

Tout le canal intestinal étoit dans l'état

le plus naturel.

Le foie parut d'un volume énorme, & en l'examinant, on découvrit une tumeur graifseuse qui étoit adhérente au grand lobe; ce

71

lippome pesoit onze livres, & le soie étoit du poids de trois livres; de sorte que la masse totale alloit jusqu'à quatorze livres.

Après cela on peut bien présumer que la cause de ces polypes dépendoit de l'embarras au soie qui entretenoit l'engorgement des veines hémorrhoidales internes; engorgement qui avoit successivement donné naissance aux tumeurs polypeuses dont je viens de parler. On connoît assez le rapport de ces vaisseaux avec le soie, pour ne pas entrer dans de plus grands détails à ce sujet.

On peut voir cependant que si ces tumeurs eussent dépendu du seul vice local de l'intestin, comme on l'observe dans le polype utérin, le moyen que j'avois employé pour en faire la ligature, étoit sussissant pour assurer la guérison d'une maladie dont le siège n'a pas été connu jusqu'alors.

#### SECONDE OBSERVATION.

# Sur un polype utérin.

J'avois porté avec trop de facilité la ligature sur une tumeur polypeuse qui avoit son siège fort avant dans le rectum, pour ne pas mettre en usage le même moyen dans le polype utérin.

Peu de temps après cette premiere opération, je fus consulté sur l'état d'une fille qui, ayant un polype utérin très-considérable,



avoit éprouvé plusieurs sois, mais inutilement, la ligature par le fil d'argent; cette fille étoit âgée de cinquante ans, elle éprouvoit depuis plusieurs années des pertes de sang très-abondantes.

La malade, qui demeuroit à l'Hôpital de Nuys, fut confiée à M. Pignot, Chirurgien de cet Hôpital, qui ne méconnut point la cause de cette maladie; pour cet effet il tenta la ligature avec le fil d'argent, je crois même qu'il voulut se servir aussi de la ficelle; mais je suis assuré que les tentatives qu'il sit avec le fil d'argent surent inutiles, parce que le fil, quoique bien chois, se cassa après quelques torsions, & le volume de la tumeur qui égaloit la tête d'un ensant nouveau né, ne lui avoit jamais permis, à ce qu'il me dit, de porter l'anse jusqu'au pédicule qui étoit au fond de la matrice.

La perte abondante qui se renouvelloit assez fréquemment, avoit réduit la malade à un dépérissement qui donnoit lieu de craindre pour ses jours: persuadé qu'il n'y avoit de ressource que dans l'extirpation de la tumeur, je proposai d'en faire la ligature, & je la sis en présence de M. Pignot & de plusieurs Hospitalieres.

Après avoir fait mettre la malade dans une situation convenable, je me servis du même moyen que j'avois employé pour la ligature du polype intestinal; j'embrassai avec l'anse le pédicule, je le serrai assez pour sormer un étranglement suffisant pour faire tomber la tu-

**73** 

meur le quatriéme jour après l'opération. M. Pignot, de qui je tiens ce dernier fait, & qui prit soin de la malade, m'a assuré que la pour-riture qui suivit l'opération, le dispensa de serrer de nouveau.

J'ai vu la malade un an après son opération, l'embonpoint & la santé dont elle jouissoit me la firent entiérement méconnoître.

Je n'ai jamais pu être instruit si la chûte d'une tumeur aussi considérable s'étoit saite lentement à travers le col utérin, ou si elle avoit été précipitée par quelque cause extérieure: je sais cette remarque, parce que j'ai été témoin des accidens sunestes qui suivirent la dilatation forcée du col de la matrice, par la chûte inopinée d'un polype utérin.

Le silence de tous les Auteurs à ce sujet, prouve que les symptomes qui succéderent à la chûte du polype, dont je vais donner l'histoire, sont très-rares; & comme ils peuvent être confondus avec ceux qui se rencontrent par la seule présence d'un gros polype, je crois rendre par-là l'observation suivante plus intéressante.

#### TROISTEME OBSERVATION.

# Sur un polype utérin.

Une jeune Dame éprouvoit depuis plusieurs années des pertes de sang : on en ignoroit la cause lorsque je sus consulté. La matrice avoit un volume égal à celui de ce viscere, à l'époque d'une grossesse de quatre mois. Je touchai la malade, je sentis à travers le col de la matrice, qui étoit essacé & qui formoit un anneau de la largeur d'un écu de trois livres, une tumeur molle, lisse & polie, que je reconnus pour un polype utérin. Le siège de la tumeur ne permettoit pas de tenter la ligature, il étoit plus prudent d'attendre que ce polype descendit dans le vagin: comme la perte étoit suspendue dans le temps où je sus consulté, je conseillai un exercice modéré pour faciliter la chûte de la tumeur. La malade se portoit assez bien pour vaquer à ses assaires domestiques.

Quinze jours après cette époque, elle sentit une tumeur considérable tomber subitement dans le vagin; cette chûte fut suivie de douleurs qu'elle éprouva dans toute l'étendue du ventre, mais plus particulièrement du côté gauche; les accidens qui se soutinrent pendant deux jours avec assez de violence, déterminerent la malade à me mander; elle demeuroit à quatre lieues de Dijon, je ne pus me rendre auprès d'elle, M. Hoin me remplaça, & il trouva que les accidens étoient assez graves pour prescrire, & la saignée qui sut répétée, & les autres remedes convenables à son état.

M. Hoin sentit la tumeur entiérement descendue dans le vagin, elle avoit au moins le volume de la tête d'un enfant à terme. Le pédicule très-gros étoit adhérent au côté gauche de la matrice.

. Lorsqu'il y eut de la rémission dans les ac-

cidens, on se détermina à transporter ici la malade. Je trouvai tout ce que M. Hoin m'avoit annoncé relativement à la tumeur; mais comme la malade éprouvoit une sensibilité assez grande du côté gauche & dans la sosse iliaque, je crus que le tiraillement qu'éprouvoient la matrice & les ligamens de ce côté, pendoit du volume énorme de la tumeur. Je sus surpris d'entendre dire quelquesois à la malade qu'elle ressentoit des frissons irréguliers. Son tempérament sec & l'engorgement de la matrice me paroissoient favoriser l'état d'irritation où elle se trouvoit.

Ne voyant d'autres moyens à tenter que de procurer la séparation du corps étranger, je me déterminai deux jours après l'arrivée de la malade, à faire la ligature du polype en présence de M. Hoin. Je me servis de ma corde ordinaire, je serrai assez pour former un étranglement, qui détermina la pourriture dès le commencement du second jour, j'employai le quinquina en injection : je fus forcé de resserrer le troisième jour la ligature, parce que le pédicule étoit très-gros. Le polype tomba le sixième jour; il avoit la forme d'une grosse houppe de soie. Je sentis alors à travers la matrice le tronçon du pédicule qui devoit s'effacer par la suppuration; mais, malgré la séparation de la tumeur, la fiévre, les frissons irréguliers devinrent plus fréquens, la malade mourut le sixième jour après l'opération.

Je trouvai à l'ouverture du corps le bassin rempli de matiere purulente; elle avoit son

76

fiége entre les ligamens larges & dans le tissu cellulaire qui tapisse l'intérieur du bassin.

La matrice avoit le quatruple de son volume, & l'on observoit dans l'intérieur l'attache du pédicule qui ressembloit parfaitement à un petit chou-sleur : elle étoit située sur l'ouverture de la trompe, tout le reste de la matrice n'avoit rien de remarquable.

# **OBSERVATIONS**

SUR un charbon fossile incombustible trouvé à Rive-de-Gier.

Et sur les propriétés de quelques masieres passées à l'état de plombagine.

PAR M. DE MORVEAU.

1. Le charbon, dont je présente à l'Académie un morceau pour être placé dans son Cabinet, m'a été envoyé par M. de Saint-Victor, Officier Ingénieur Invalide, qui l'a pris à Rive-de-Gier, où il se trouvoit par occasion. Il me marque qu'il a été tiré d'un puits de recherche que des Particuliers ont fait ouvrir sur une montagne un peu éloignée des carrieres qu'on exploite, qui porte le pom de Montagne du seu, parce que le seu

y étoit anciennement; on assure même qu'il n'a cessé entièrement que depuis dix ans. Des terriers anciens annoncent que dans le quatorzième siècle on en tiroit du charbon. petra nigra. Les bancs de rocher que l'on a traversés dans l'approfondissement de ce puits, paroissoient comme volcanisés: à dix-huit toises on a rencontré une veine de charbon de onze pieds d'épaisseur entre toit & mur; ce charbon étoit dur, compact, presqu'aussi difficile à extraire que de la pierre, cependant peu pesant, approchant plus de la qualité des charbons légers, & présentant des bandes d'un coup d'œil plus brillant qu'à l'ordinaire, comme on peut en juger par le morceau que j'ai apporté.

On n'a pas été peu surpris (m'écrit M. de Saint-Victor), lorsque voulant essayer ce charbon au seu, on a vu qu'il ne brûloit pas, qu'il rougissoit au seu comme le ser, sans perdez

de son poids, ni même de son noir.

J'ai cru d'abord devoir observer par moimême un esset aussi singulier. J'ai pris un morceau de ce charbon, pesant exactement 445 grains; je l'ai mis au sourneau de susion, sur des charbon bien allumés, & je l'ai tenu rouge blanc pendant une demi - henre. Ce morceau, que je mets également sous les yeux de l'Académie, ne s'est réellement pas enslammé; il est aisé de juger qu'il n'a pas même perdu se noir vis & brillant qui en marquoit les bandes ou silets plus imprégnés de bitume, & je me suis assuré qu'il n'avoit



perdu, dans cette forte épreuve, que 77 grains, c'est-à-dire, un peu plus du sixiéme de son poids: le tissu n'ayant pas été altéré, même à l'xtérieur, on ne peut attribuer cette perte à un commencement de combustion; il est évident qu'elle n'est due qu'à l'eau que recele nécessairement toute matiere terrense.

J'ai cherché ensuite à déterminer ce que ce fossile contenoit réellement de principe inflammable. Pour cela j'ai fait fondre, dans un creuset, 6 gros de nitre; j'y ai projeté peu à peu de ce charbon pulvérisé, jusqu'à ce qu'il n'excitât plus aucune détonnation, & j'ai vu qu'il avoit fallu 80 grains pour alkaliser les 432 grains de nitre; ainsi, cette matiere étoit encore assez riche en phlogistique, puisqu'une de ses parties en alkalisoit près de 5 1. Comment donc ce charbon peutil être incombustible? Il me semble que ce phénomene ne peut s'expliquer que par l'existence de ce phlogistique en état de soufre méphitique, ou de plombagine, qui est de même incombustible, & qui, suivant la découverte de M. Scheele, forme néanmoins un composé pourvu de phlogistique, au point d'en tenir dix fois plus que le fer, & d'alkaliser jusqu'à dix parties de nitre, lorsqu'elle est absolument pure.

Ce ne sera probablement le seul fait dont l'analyse de la plombagine nous donnera l'explication; en voici quelques-uns qui me paroissent devoir être examinés, d'après ces

nouvelles données.

I I. Les charbons que laissent quelques substances, particuliérement du regne animal, font d'un noir plus brillant, ils ont un coup d'œil plus gras, une couleur plus plombée que le charbon ordinaire : voilà déjà une ressemblance, par les caracteres superficiels, avec notre charbon de Rive-de-Gier. Si elle se retrouve encore dans les propriétés essentielles, on conviendra fans doute que l'analogie est assez complette pour faire considérer aussi ces charbons comme une sorte de plombagine. Or, il est très-constant que ces charbons ne brûlent que très - difficilement; M. Spielman en a fait l'observation sur le résidu charbonneux de la distillation du cerveau humain (1); M. Macquer, sur le charbon de sang de bœuf (2); & M. Scheele, sur le charbon de la matiere caséeuse (3). Tous ces charbons ont rélisté à l'incinération, malgré un feu d'incandescence de plusieurs heures à l'air libre; cependant ils avoient encore la propriété de faire détonner le nitre ; ils tenoient donc du phlogistique, mais ils le tenoient uni sans doute à un autre principe. & dans l'état de combinaison qui forme la plombagine aussi incombustible qu'eux.

IIL On avoit observé au laboratoire de l'Académie, que toutes les sois qu'on avoit

<sup>(1)</sup> Instit. de Chymie, tom, 1et. pag. 473. (2) Distione, au mot charbon.

<sup>(3)</sup> Journ. Phys. com. xx11, pag. 170,



voulu faire passer l'acide phosphorique à l'état de verre, dans les creusets appellés de plomb noir, il se volatilisoit en état de phosphore, plutôt que de se vitrisser. Ce phénomene n'a plus rien d'étonnant; le plomb noir n'est autre chose que la plombagine elle-même que l'on fait entrer dans la composition de ces creusets, dans les Fabriques d'Ypse & de Passaw: c'est donc comme si on eût traité l'acide phosphorique avec de la poussiere de charbon, ou tout autre réductif. Et delà les Métallurgistes tireront la conséquence, qu'ils peuvent substituer la plombagine au charbon pulvérisé, pour composer ce qu'ils appellent brasque

légere.

IV. L'eisenman, ou mine de fer micacée, tache les doigts comme la plombagine; elle a tant de ressemblance avec ce minéral, que l'on peut conjecturer qu'elle n'est qu'une plombagine surchargée de fer, au point d'être comptée, à juste titre, parmi les mines métalliques. Un phénomene produit, par une méprise, au laboratoire de l'Académie, me paroît très-propre à confirmer cette opinion. Voulant faire l'opération du phosphore, on avoit mis, par équivoque, dans la cornue, un résidu de l'opération de la revivisication du mercure par le fer, au lieu du residu de l'opération précédente du phosphore, comme on le pratique, quand on croit qu'il n'a pas été épuisé. A peine commençoit-on à sentir l'odeur du phosphore, qu'elle sut remplacée par une vapeur sulphureuse suffoquante, qui

qui obligea d'abandonner l'opération. Les vaisseaux refroidis, on trouva qu'une partie du fer s'étoit sublimée au col de la cornue, fous la forme de paillettes brillantes de couleur métallique, grasses au toucher, tachant les doigts, fortement attirables à l'aimant, en un mot, jouissant de toutes les propriétés caractéristiques de l'eisenman, ainsi que l'Académie peut en juger par la portion de ce produit qu'il m'a paru intéressant de conserver, & que je mets sous ses yeux. Il est évident que ce n'est plus, ni la pyrite artificielle formée de la limaille & du soufre du cinabre, ni le fer pur en régule, qui ne se sublime pas, ni la chaux martiale abandonnée par l'acide vitriolique qui est encore plus fixe, non colorée & non magnétique; c'est donc une vraie mine de fer micacée artificielle.

V. On apperçoit souvent dans les laitiers, & sur-tout dans les sonds de sourneaux où on traite les mines de ser, une matiere pul-vérulente de couleur de ser, qui est friable sous les doigts, & qui les tache comme la mine de plomb; c'est encore un véritable eisenman, quoique la texture micacée y soit peut-être un peu moins sensible. J'ai retrouvé les mêmes caracteres dans les produits d'une expérience qui sut faite, il y a deux ans, aux sorges du Comté de Busson, sous les yeux de notre illustre Confrere. On jeta dans un grand creuset environ deux cent cinquante livres de ser sondu, au moment de la coulée de la gueuse; la partie insérieure du creuset



étoit plongée dans un brasier de charbons ardens, tandis que la partie supérieure étoit exposée à l'air, & même défendue de la chaleur par un cordon de briques soutenues par des cercles de fer, à la hauteur de la moitié du creuset. Lorsque je jugeai le métal suffisamment solide à sa surface, pour porter sans dépression le poids de l'athmosphere, je perçai sur le champ, avec un poinçon de fer, le trou que j'avois fait au bas du creuset. & qui n'étoit bouché qu'avec de la terre de coupelle, détrempée à l'eau, suivant la méthode de M. l'Abbé Mongez, pour les crystallisations métalliques. Il coula plus du tiers de la fonte qui s'étoit conservée fluide. ce qui forma une très-belle géode, dont les parois étoient par-tout d'un pouce d'épaisseur. Elle fut cassée pour en examiner l'intérieur; elle étoit tapissée de petites pointes saillantes, qui, vues à la loupe, paroissoient bien décidément des pyramides quadrangulaires, ou des octaedres, dont une partie étoit engagée. Mais ces pyramides étoient creuses, & si fragiles, qu'elles se laissoient emporter, pour la plupart, par une barbe de plume; la poussiere qui en résultoit étoit talqueuse. plus brillante & plus friable que le fer fondu, & tachoit les doigts. Toutes ces circonstances pourroient faire penser que l'action combinée de la chaleur & de l'air, qui étoit rentré dans la géode à l'instant que la matiere avoit cessé de couler par le trou, avoit pu ramener cette superficie à l'état d'eisenman.



VI. Les Chymistes connoissent l'alliage métallique composé de plomb, d'étain & de bismuth, qui, suivant les proportions indiquées par M. d'Arcet, devient fusible à un degré de chaleur inférieur à celui de l'eau bouillante. Ayant tenu cet alliage sur le feu un peu plus long-temps qu'à l'ordinaire, & toujours dans l'eau, après que la réunion des fragmens s'étoit faite par la fusion, j'apperçus, avec étonnement, une espèce de poussiere grise qui s'étoit séparée de la masse; je filtrai l'eau pour la recueillir, & je trouvai, sur le papier, une matiere absolument femblable au meilleur crayon d'Angleterre, qui auroit été réduit en poudre impalpable. Cette plombagine existoit - elle auparavant dans les métaux? J'ai peine à le croire, parce qu'elle auroit dû se séparer, lors de la premiere fusion, pour la composition de l'alliage. A supposer qu'elle eût pu rester unie à ce composé métallique, pendant sa liquéfaction dans le creuset, le fait ne seroit pas moins intéreffant; on n'auroit pas imaginé que l'eau bouillante fût un moyen d'en faire le départ.

VII. Il n'est personne enfin, qui n'ait remarqué, dans les tas de charbon végétal, des morceaux plus brillans dans quelques points de leur surface, d'un tissu plus serré, ayant un œil gras, & une couleur plombée toute particuliere. On retrouve, à peu de chose près, les mêmes accidens dans quelques fragmens de charbon sossile, lorsqu'on lui a fait



fouffrir ce que l'on nomme si improprement le dessoufrage, c'est-à-dire, lorsqu'on l'a exposé au seu pour le cuire & le convertir en cooks ou en cinders. Cette apparence plombée ne viendroit - elle pas aussi de ce que cette superficie se seroit rapprochée, à un certain point, de l'état de plombagine? Cette conjecture, déjà très-probable par les exemples analogues que j'ai rapportés, me paroît mériter la plus grande attention, parce qu'une sois vérisée, il en résultera deux conséquences importantes: l'une à la théorie chymique, l'autre à la pratique d'un de nos arts les plus utiles.

La première de ces conséquences sera que le charbon végétal ne doit pas être regardé comme un pur soufre méphitique, composé d'acide méphitique & de phlogistique, ni même comme un hépar formé de ce soufre & d'une base terreuse, puisque ce soufre est, de sa nature, plus incombustible. L'axiome, qu'il n'y a de corps semblables que ceux qui ont toutes leurs propriétés semblables, forcera donc d'admettre dans le charbon un principe véritablement huileux, au lieu du principe inflammable pur. La nature différente, soit de l'huile, soit de la base terreuse, soit de toutes deux, constituera alors toute la différence du charbon de bois & du charbon minéral, qui se ressemblent d'ailleurs si fort dans l'acte de la combustion.

Ce n'est pas que l'on ne puisse peut-être, avec autant de vraisemblance, assigner une



autre différence entre le charbon & la plombagine; en admettant, par exemple, dans la derniere de l'air vital, au lieu de gas méphitique. Cette explication répondroit à merveille à l'idée que nous avons de la grande affinité de l'air vital avec le phlogistique, que nous regardons, avec raison, comme cause prochaine de la combustion: car on n'auroit plus lieu de s'étonner qu'une substance où le phlogistique seroit d'avance saturé de ce principe, en éludât l'action; tandis que, dans le cas contraire, il est difficile de comprendre comment le phlogistique peut être enchaîné de maniere à résister à cette affinité.

. On opposeroit sans doute à ce systême, que la plombagine ne peut tenir que de l'acide méphitique, puisque c'est de l'acide méphitique qu'elle laisse en combinaison avec l'alkali du nitre, après sa déflagration. Mais ne seroit-il pas possible que, dans cette opération, l'air vital fût converti en gas méphitique, comme il l'est incontestablement dans la revivification de la chaux de mercure avec le charbon, dans la combinaison des acides avec l'alcohol, &c. &c.? Or, il ne faut ici que la possibilité, pour que l'objection cesse d'être décisive. Ainsi, de quelque côté qu'on tourne ses vues pour adopter une théorie, si l'on veut l'appuyer sur les faits, ceux que je viens de rapporter feront essentiellement partie des phénomenes qu'elle doit embrasser.

La seçonde conséquence à tirer de notre F in

hypothèse, sera que la maniere de cuire toute espèce de charbons, est d'autant plus vicieuse, qu'elle les approche davantage de l'état de plombagine; & connoissant la cause immédiate du mal, on sera sur la voie de découvrir les moyens de le prévenir. Quelques Maîtres de forge ont éprouvé qu'un charbon de bois mal préparé, tel que celui qui a été cuit sur un terrein pierreux ou sablonneux; celui qui a été refroidi avant le rougissage, celui à qui on a donné trop promptement le feu vif, &c. &c. étoit tendre à l'user, n'avoit aucune activité dans la fonte des métaux, ne résissoit que quelques momens à l'air des soufflets, se réduisoit subitement en frasil, qu'il voltigeoit sur le foyer de la forge, & qu'il en falloit quelquefois un tiers de plus par vingt-quatre heures pour faire le même ouvrage, sur-tout lorsqu'il n'étoit pas employé sur le champ (1). Leur expérience atteste encore que les charbons perdent sensiblement de leur qualité, en séjournant longe temps dans des lieux humides. Ces défauts, cette altération sont nécessairement les résultats de quelqu'affinité qui change la composition, qui détruit sa propriété combustible, sans toucher sensiblement à ses caracteres extérieurs; & puisque cette affinité nous est totalement inconnue, il est permis sans doute de soupçonner la même cause où l'on apperçoit le même effet.

<sup>(1)</sup> Art du Charbonnier, par M. Rigoley, Directeur des Forges d'Aify, ch. 3.

# MÉMOIRE

SUR les Plantes astringentes indigenes.

PAR M. DURANDE.

L est souvent très-difficile de déterminer les propriétés des plantes d'après leur effet sur les malades. Le tempérament, le genre de la maladie, le climat, la saison, la constitution regnante, les différentes affections de l'ame, operent de telles variétés dans l'action des remedes, qu'à moins d'observations trèsmultipliées & toutes présentées dans le plus grand détail, on tombe aisément dans des erreurs dangereuses. Il seroit donc bien à desirer que l'on eût toujours des indices assurés des vraies propriétés des végétaux; mais si, sur un objet aussi intéressant, nos desirs ne sont pas remplis, au moins ne doit-on pas négliger ceux de ces indices qui sont en notre pouvoir.

Le principe astringent, par exemple, qui s'éleve à la chaleur du feu, sans perdre ses propriétés; qui se mêle à un grand nombre de menstrues, & malgré ce mélange, précipite encore le fer en noir; qui est capable de fixer une liqueur aussi volatile que l'éther; doit nécessairement insluer beaucoup sur les

vertus des plantes. Non-seulement il agit sur les fibres auxquelles il s'applique, sur les liqueurs avec lesquelles il se mélange sans s'altérer, puisque M. Percival s'est assuré de sa présence dans les urines, mais encore il paroît opérer sympathiquement sur les fibres & sur les vaisseaux les plus éloignés. Ainsi, Schultze fait observer que quelques gouttes de baume rouge vulnéraire de Dippel, que l'on sait être composé de limaille d'acier, de crême de tartre, de vinaigre & d'esprit-devin, ayant été versées dans la gueule d'un chien auquel on avoit ouvert l'artere crurale, firent cesser l'hémorrhagie, & donnerent lieu à la formation d'un caillot qui boucha l'ouverture de l'artere. Mais quoiqu'il soit trèsintéressant de s'assurer de la présence du principe astringent, & qu'il soit très-facile d'acquérir cette connoissance, cependant on trouve dans toutes les classes de la matiere médicale, des remedes astringens auxquels on attribue les vertus les plus opposées, & l'on en voit d'autres que l'on dit astringens, sans qu'ils aient cette qualité. Pour s'en convaincre, il suffira de jeter un coup d'œil sur la liste nombreuse des plantes qui précipitent le fer en noir plus ou moins foncé.

Achillea millefolium. Linn. Millefeuille. pp: noir bleuâtre.

Æsculus hippocastanum. Linn. Marronnier d'Inde. Ecorce. pp. verd noir très-soncé.

Agrimonia Eupatoria. Linn. Aigremoine. pp. noir.

Ajuga reptans. Linn. Bugle. pp. verd noir très-foncé.

Alchimilla vulgaris. Linn. Pied de lion. pp. noir.

Asarum europaum. Linn. Cabaret. pp. verd très-soncé.

Asplenium scolopendrium. Linn. Scolopendre. Langue de cers. pp. verd noir.

Les autres espèces d'asplenium, le ceterach, le politric, la sauve-vie, sont également astringentes.

Bellis perennis. Linn. Paquerette. Margue-

rite. pp. verd noir.

Berberis dumetorum. L. Epine-vinette. Racine. pp. verd foncé qui est resté suspendu dans la liqueur.

Betula alba. Linn. Bouleau. Fruit. pp. jaune verd. Feuilles. Ecorce. pp. verd noir foncé.

Betula alnus. Linn. Aulne. Feuilles. pp. noir.

Na. Les bouleaux étrangers, nana lenta

nigra, précipitent de même.

Cichorium entybus. Linn. Chichorée sauvage. Racine. pp. jaune verd. Feuilles. pp. verd noir foncé.

Carpinus ostrya. Linn. Charme. pp. noir. Comarum palustre. Linn. Comaret des marais. pp. noir.

Cornus mas. Linn. Cornuiller ou caneulier. Feuilles. Rameaux. Semences. pp. noir.

Cornus fanguinea. Linn. Cornouiller fangnin. pp. noir.

Na. Le Cornouiller blanc, arbre étranger,

précipite de même.

Cratagus oxyacantha. Linn. Alisier. Aubeépine. Senelles. pp. noir.

Na. Les autres espèces d'alisser ont la même

propriété.

Cynoglossum officinale. Linn. Cynoglosse. Langue de chien. pp. noir.

Equisetum arvense. Linn. Prêle des champs.

pp. noir.

Equisetum palustre. Linn. Prêle des marais. pp. noir.

Euphrasia officinalis. Linn. Euphraise. pp.

verd très-foncé.

Fagus sylvatica. Linn. Hêtre. L'écorce & les feuilles. pp. verd noir foncé.

Filago germanica. Linn. Cotonniere com-

mune. pp. noir.

Fragaria vesca. Linn. Fraisier. Racine. pp. noir.

Fumaria officinalis. Linn. Fumeterre. pp. noir.

Geum urbanum. Lin. Benoîte. Caryophyllata. Feuilles & racines. pp. noir.

Geranium columbinum. Linn. Bec de grue.

Pied de pigeon. pp. noir.

Robert, herbe à Robert. pp. noir très-foncé.

Geranium fanguineum. Linn. Bec de grue sanguin. pp. noir.

Gnaphalium dioicum, Linn. Pied de chat. pp. noir.

Hieracium pilosella. Linn. Epervier. Piloselle.

pp. verd très-foncé.

Humulus lupulus. Linn. Houblon. pp. noir. Hypericum perforatum. Linn. Feuilles & fleurs. pp. noir.

Iris pseudoacorus. Linn. Iris jaune. Faux

acorus. Racine. pp. noir.

Lamium album. Linn. Lamier blanc. Ortic blanche. pp. verd foncé.

Leontodon taraxacum. Linn. Pissenlit. Dent

de lion. pp. verd foncé.

Lichen pulmonarius Linn. Pulmonaire de chêne. pp. rouge brun.

Lithrum salicaria. Linn. Salicaire. pp. noir. Lycopus europaus. Linn. Pied-de-loup. pp. verd noir.

Lysimachia vulgaris. Linn. Lysimachie. Corneille commune. Feuilles & fruit pp. verd noir foncé. Racine. pp. brun.

Lysimachia nummularia. Linn. Lysimachie

nommulaire. pp. verd noir.

Mespilus germanica. Linn. Nefflier. Feuilles. Rameaux. Fruits, avant leur maturité. pp. noir.

Toutes les autres espèces de ce genre sont

également astringentes.

Morus alba. Linn. Mûrier blanc. Feuilles & rameaux. pp. verd noir foncé. Fruit. pp. brun.

Myrthus communis. Linn. Myrthe. pp. noir. Nymphaa alba. Linn. Racine. pp. noir.

92

Nymphaa lucer. Linn. Nenuphar jaune. Racine. pp. noir.

Vlantago major. Linn. Grand plantain. pp. verd affez foncé.

Plantago lanceolata. Linn. Plantain lancéolé. pp. verd affez foncé.

Polygonum persicaria. Linn. persicaire. pp. verd noir.

Polygonum amphibium. Linn. Perficaire amphibie. pp. verd très-foncé.

Polygonum bistorta. Linn. bistorte. pp. noir. Polygonum hydropiper. Linn. Curage. Poivre d'eau. pp. noir.

Polypodium filix mas. Linn. Fougere mâle. Tiges & racines. pp. noir.

Potentilla ansorina. Linn. Argentine. Feuilles. pp. noir. Racine. pp. verd noir foncé.

Potentilla reptans. Linn. Quinte-feuille. Racine. pp. verd noir foncé.

Poterium sanguisorba. Linn. Pimprenelle. pp. verd foncé.

Prunella vulgaris. Linn. Prunelle. pp. verd très-foncé.

Pteris aquilina. Linn. Fougere dite femelle. Tiges. pp. noir. Racine. Point de précipité. Prunus cerufus. Lin. Cerifiers. Ecorce. pp.

Prints Ininofa Linn Printel

Prunus spinosa. Linn. Prunelier. Prunier épineux. pp. verd noir.

Pyrola rotundifolia. Linn. Pyrole. pp. verd foncé.

Quercus mas. Linn. Chêne. Feuilles. Glands.' Noix de galle. pp. noir.



Rhamnus catharticus. Linn. Nerprun. Il colore seulement la dissolution de vitriol de Mars en jaune brun foncé.

Rheum rhubarbarum. Linn. Rhubarbe. Feuilles

pp. verd noir. Racine. pp. noir.

Rheum rhaponticum. Linn. Rapontic. pp. vert.

Rhus sumac. Linn. Sumac. Feuilles & fruits.

Ribes rubrum. Linn. Groselier rouge. La racine colore la dissolution de vitriol de Mars en jaune brun foncé.

Rosa canina. Linn. Rose sauvage. Grate-cul.

Feuilles & fruits. pp. noir.

Rosa centifolia. Linn. Rose de Provins. Fleurs. pp. noir.

Rubus fruticosus. Linn. Ronce. pp. noir.

Rubus casius. Linn. Ronce à fruit bleu. pp. noir.

Rumex acetofa. Linn. Oseille. Racine & se-

mences. pp. noir.

Rumex acutus. Linn. Patience sauvage à feuilles aigues. Racine. Feuilles & semences. pp. noir.

Rumex aquaticus. Linn. Patience aquatique. Parelle. Racine. Feuilles & semences. pp. noir,

Rumex obtusifolius. Linn. Patience sauvage à feuilles obtuses. Racine, feuilles & semences. pp. noir.

Rumex patientia. Linn. Patience des jardins. Feuilles, racine & femences. pp. noir moins

foncé que les précédens.

Ruscus aculeatus. Linn. Houx. Frelon. pp.

Salix alba. Linn. Saule commun. Feuilles. Branches. Ecorce. pp. noir.

Salix capraa. Linn. Saule marceau. Feuilles. Branches. Ecorce. pp. noir.

Salvia officinalis. Linn. Sauge des boutiques. pp. verd très-foncé.

Sanicula europea. Linn. Sanicle. pp. noir.

Sideritis hirfuta. Linn. Crapaudine. pp. verd très-fonce.

Sorbus ancuparia. Linn. Sorbier des oiseleurs. Feuilles. Branches. Fruits avant sa maturité. pp. noir.

Sorbus domestica. Linn. Sorbier ou cormier.

pp. noir.

Sparganium erectum. L. Ruban d'eau redreffé. Fruit. pp. verd noir. Feuilles. pp. un peu plus foncé.

Sparganium natans. Linn. Ruban d'eau flottant. pp. pareil.

Spiraa ulmaria. Linn. Ulmaire. Reine des

prés. pp. noir.

Spiraa filipendula. Linn. Filipendule. pp.

Symphitum confolida. Linn. Confoude. Feuilles. pp. verd noir. Racine. pp. verd foncé.

Thymus serpillum. Linn. Serpollet. pp. verd clair.

Tormentilla ereda. Linn. Tormentille. pp.

Typha latifolia. Linn. Massette à grandes

DE DIJON, 1783. 95
feuilles. Elle colore la dissolution de vitriol

en jaune verdâtre.

Typha angustifolia. Linn. Massette à seuilles étroites. Même esset.

Vaccinium myruillus. Linn. Airelle myrtile. pp. verd foncé.

Vaccinium vieis idea. Linn. Raisin d'ours. pp.

pareil.

Verbena officinalis. Linn. Verveine. pp. verd foncé.

Vinca major. Linn. Grande pervenche. pp. violet foncé.

Vinea minor. Linn. Petite pervenche. pp. pareil.

Vitis vinifera. Linn. Vigne. Les feuilles. pp. noit.

Verjus. pp. pareil.

Ulmus campestris. Linn. Orme. pp. noir.

Urtica divica. Linn. Grande ortie.

Urtica pilulifera. Linn. Ortie à pp. noir.

Urtica urens. Linn. Ortie grieche.

Des plantes qui passent faussement pour astringentes.

Scrophularia · aquatica. Linn. Scrophulaire

aquatique.

Elle a été recommandée comme astringente pour la guérison des hernies; elle précipite cependant le fer en rouille.

Sysimbrium sophia. Linn. Sysimbrie à seuilles



étroites. Talistron des prés. Les graines sont employées comme astringentes contre les pertes; il est des campagnes où toutes les semmes affectées de cette maladie sont usage de cette plante & s'en trouvent bien: elle ne colore point la dissolution de vitriol de mars, elle n'est pas astringente, elle ne peut agir que par les propriétés anti-scorbutiques communes à toutes les cruciformes.

Thlaspi bursa pastoris. Linn. Thlaspi bourse à

pasteur.

Cette plante que tous les Auteurs disent aftringente, ne précipite point le fer en noir, & n'agit que comme le talistron des prés.

Viscum album. Linn. Le Gui.

Il passe mal-à-propos pour astringent, il ne précipite point le fer en noir, on le conseille

néanmoins contre les pertes.

Les massetes qui ont été conseillées contre les pertes, & qui colorent seulement la dissolution de vitriol de mars en jaune verdâtre, pourroient être retranchées de la liste des astringens; au moins n'ont-elles cette propriété

qu'à un degré foible.

Les qualités astringentes attribuées faussement à ces plantes, prouvent combien il est difficile de déterminer la vertu précise des médicamens, d'après leur action sur les malades, & combien il seroit avantageux d'avoir des indices plus assurés; c'est encore ce dont on aura une preuve plus complette, en résléchissant sur les propriétés que l'on a coutume d'accorder aux différentes plantes que j'ai présentées dans la liste des astringens.

Achillea millefolium. Linn. Millefeuille.

Cette plante est regardée comme un excellent antispasmodique. On la recommande dans les siévres intermittentes, la diarrhée, les douleurs & les coliques hémorrhoidales, les coliques utérines, la suppression des régles, les pertes, la cardialgie, le flux hémorrhoidal, sur-tout le muqueux. Elle doit la plupart de ces vertus, qui paroissent si contradictoires, au principe astringent & aux dissérens états dans lesquels les malades se trouvent.

Æsculus hippocastanum. Lin. Marronnier d'Inde. L'écorce est recommandée comme fébrifuge, antiseptique, détersive & sternutatoire.

Agrimonia eupatorium. Linn. Eupatoire.

Elle est recommandée comme tempérante; dépurative & apéritive. On la prescrit dans la jaunisse, la cachexie, l'hydropisse, les engorgemens des glandes.

Ajuga reptans. Linn. Bugle.

Elle est recommandée dans la pthysie humide, on s'en sert en gargarisme contre l'esquinancie; on l'applique aux plaies comme détersive.

Alchemilla vulgaris. Linn. Pied-de-lion.

On recommande cette plante comme vulnéraire astringente.

Asarum europæum. Linn. Cabaret.

Ce purgatif violent a été recommandé dans les fiévres intermittentes rébelles, la sciatique, l'hydropisse, la manie. On ne doit plus être Înrpris, lorsqu'on est informé de ses qualités astringentes, que les Auteurs de la matiere médicale indigene aient proposé de le substituer à l'ipécacuanha.

Asplenium scolopendrium. Linn. Scolopendre. Elle est très-recommandée comme diurétique. Les autres espèces de doradille recommandées contre les coliques, les maladies de poirrine, agissent par leur qualité astringente.

Bellis perennis. Linn. Paquerette. Marguerite. On a conseillé cette plante contre la pulmonie, la toux, l'étisse, les vers, la dysenterie, le scorbut. C'est au principe astringent qu'elle doit ces propriétés.

Berberis dumetorum. Linn. Epine-vinette.

L'écorce de la racine est recommandée comme apéritive & employée contre la jaunisse. Il est nécessaire de connoître ses qualités astringentes pour s'en servir dans cette maladie avec quelqu'avantage.

Betula alba. Linn. Bouleau.

Les feuilles passent pour résolutives & détersives. L'eau de bouleau est conseillée contre la pulmonie, & recommandée comme diurétique.

Betula alnus. Linn. Aulne.

On a conseillé d'appliquer les feuilles d'aulne séchées & chaussées au sour, sur les parties assedées de rhumatismes. Le principe astringent qui les rend toniques, peut contribuer au soulagement qu'elles procurent en pareil cas.

Cichorium entibus. Linn. Chicorée sauvage:



Elle est employée comme dépurative, apéritive, fébrifuge, & même comme rafraîchissante. On s'en sert contre les obstructions, surtout celles du foie, les sièvres intermittentes, le scorbut, l'étisse, la cachexie, l'hypocondriacie. La racine est moins astringente que les feuilles.

Cratagus oxyacantha. Linn. Aube-épine. Se-nelles.

On conseille souvent les fruits de cet arbrisseau comme diurétiques, dans la cachexie, l'hydropisse, les embarras des voies urinaires. Ils ne réussissent que dans les cas où le défaut de ressort exige les toniques assringens.

Cynoglossum officinale. Linn. Cynoglosse.

On a conseillé la racine de cette plante contre la toux, la diarrhée, la gonorrhée: elle agit par son principe assringent & narcotique. Elle ne conserve cépéndant ce dernier qu'autant que l'infusion est faite avec beaucoup de ménagement.

Equisetum arvense. Linn. Palustre ejusd. Prêle

des champs, des marais.

Les anciens attribuoient à cette plante la propriété de dissoudre la rate. Après une diete de vingt-quatré heures, ils faisoient boire aux coureurs l'infusion de prèle pendant trois jours; aujourd'hui on prescrit seulément cette plante comme diurétique dans les affections catarreuses des reins & de la vessie, comme astringente contre les pertes.

Euphrasia officinalis. Linn. Euphraise.
On se sert assez in distinctement de cette
G ij

# À C, A D É M I E

100

plante dans les maladies des yeux, elle ne peut les fortifier que par ses parties astringentes. Elle ne doit point convenir dans tous les cas d'inflammation & d'irritation, aussi s'apperçoit-on souvent qu'elle satigue beaucoup l'estomac.

Fagus sylvatica. Linn. Hêtre.

L'écorce est recommandée comme fébrifuge. L'huile fraîchement exprimée des faines, pese sur l'estomac; ce qu'on peut attribuer aux particules astringentes qui se précipitent avec le temps.

Filago germanica. Linn. Cotonniere commune. Herbe à coton.

Cette plante est astringente comme le piedde-chat. Elle peut le remplacer dans la toux catarrale.

Fragaria vesca. Linn. Fraisier.

On ne cesse de conseiller cette racine comme rastraîchissante, & j'ai entendu des malades se plaindre d'être encore très-échaussé, après en avoir usé pendant plusieurs mois. Cette racine ne peut paroître rastraîchir que dans les cas d'atonie, de dégénération des humeurs; elle soutient alors l'estomac, l'empêche d'être accablé par la quantité d'eau. Elle ranime, comme tous les toniques, l'action des visceres, facilite le renouvellement du sang & des humeurs: c'est ainsi que le quinquina, le camphre, &c. paroissent dans certaine sièvre diminuer la chaleur & la sécheresse. La racine de fraisser passe encore pour apéritive dans la jaunisse & les obstructions.

## DE DIJON, 1783.

Elle a été recommandée contre l'asshme & la toux invétérée. Il est des circonstances qui peuvent la rendre utile dans ces maladies.

Fumaria officinalis. Linn. Fumeterre des bou-

tiques.

Elle est très-recommandée comme dépurative & apéritive dans les maladies de la peau, dans celles du foie; mais il est essentiel de savoir qu'elle réussit sur-tout par ses propriétés astringentes, ce qui indique le période de ces maladies où on peut l'employer. C'est par la même propriété qu'elle a réussi dans des dysenteries invétérées, où l'on croyoit n'avoir employé qu'un dépuratif.

Geranium robertianum. Linn. Bec de grue à

Robert. Herbe à Robert.

Cette plante a été recommandée intérieurement comme apéritive dans la jaunisse, comme résolutive après des chûtes. On l'emploie extérieurement sur les éréspelles, les ulceres; on l'applique sur la gorge pour dissiper l'inslammation de cette partie. Ses propriétés sont dues au principe astringent, par lequel elle rougit le papier bleu, ce que Geofroi attribuoit à un sel alumineux, mêlé de souste, de terre & d'un peu de sel volatil concret: d'où l'on voit combien les Auteurs de matière médicale ont négligé les expériences les plus simples pour s'assurer de la véritable qualité des plantes.

Gnaphalium dioicum. Linn. Pied-de-chat.

Cette plante est recommandée pour calmer la toux, mais elle ne peut convenir lorsqu'il

y a échauffement ou irritation. J'ai vu un malade abuser en pareil cas des tablettes de piedde-chat qui lui procurerent le ténesme.

Hieracium pilosella. Linn. Epervierre pilo-

felle.

102

Elle est recommandée contre les hémorrhagies, les ulcérations internes, la pulmonie, le cours de ventre, les sièvres intermittentes. Elle n'agit que par son principe astringent uni aux parties extractives qui se trouvent dans toutes les plantes à fleurs composées.

Humulus lupulus. Linn. Houblon.

La racine est recommandée comme diurétique & anti-scorbutique. Floyer prétendit qu'elle pouvoit remplacer la salsepareille; & M. Willemette nous apprend qu'un Herboriste de Nancy la vendit long-temps pour cette plante. Les semences sont pareillement astringentes; il est cependant des pays où l'on s'en sert contre la constipation, ce qui prouve que les astringens sont capables de produire les essets les plus variés, suivant l'état où se trouvent les malades.

Hipericum perforatum. Linn. Mille-pertuis.
Les sommités ont été recommandées contre l'hémoptysie, le pissement de sang, l'ulcération des voies urinaires, la suppréssion des régles, les affections hypocondriaques & hystériques. On a encore loué leur application sur les parties affectées de rhumatismes.

Iris pseudo acorus. Linn. Iris jaune. Faux acorus.

La racine est recommandée contre la toux

103

rébelle, la constipation opiniatre & le cours de ventre. L'inertie des intestins, qui peut produire ces deux affections opposées, est également combattue par ce remede assringent.

Lamium album. Linn. Lamier blanc. Ortie

blanche.

Il est recommandé comme astringent & comme diurétique contre les pertes, les sleurs blanches & la rétention d'urine.

Leontodon taraxacum. Linn. Piffenlit.

Il est recommandé comme apéritif, diurétique, fébrifuge, contre les obstructions, la jaunisse, les affections catarreules des voies urinaires, les maladies de la peau, les sièvres intermittentes. Dans tous les cas où il y a de l'érétisme, où les sécrétions sont arrêtées par l'irritation, où les engorgemens sont trèsinvéteres, les apéritifs qui ne sont pas astringens, méritent de lui être présèré.

Lichen pulmonarius. Linn. Pulmonaire de

chêne.

Elle est recommandée contre la toux des hommes & des animaux. On s'en est servi utilement contre la jaunisse; mais il faut connoître ses qualités astringentes, pour pouvoir l'employer avec quelque succès dans ces maladies.

Lithrum salicaria. Linn. Salicaire.

Elle est recommandée contre les pertes & les cours de ventre. Je l'ai vu cependant augmenter la diarrhée, mais il y avoit irritation & phlogose, ce qui sit que le remede pro-



duisit un effet absolument contraire à l'intention de celui qui l'avoit prescrit.

Lysimachia vulgaris. Linn. Lysimachie. Cor-

neille. Chassebosse.

Elle est recommandée comme vulnéraire. Lysimachia nummularia. Linn. Lysimachie nommulaire.

Outre ses propriétés astringentes, elle a été employée contre le scorbut & la pulmonie.

Morus alba. Linn. Mûrier blanc.

Les feuilles sont recommandées comme diurétiques. Leur qualité astringente indique affez qu'elles ne peuvent être employées que dans les affections catarreuses des voies urinaires.

Morus nigra. Linn. Mûrier noir.

C'est par les propriétés astringentes qu'ont les mûres avant leur maturité, que leur sirop réussit dans l'esquinancie catarreuse, mais il ne peut convenir dans celle qui est inslammatoire.

Nymphaa lutea-alba. Linn. Nénuphar jaune & blanc.

Ces plantes, auxquelles on attribue la propriété de calmer les passions, agissent par des parties astringentes & narcotiques; elles doivent aux mêmes principes leurs propriétés contre le vomissement & le crachement de sang, les pollutions nocturnes & les écoulemens vénériens.

Plantago major-lanceolata. Linn. Grand plantain, plantain lancéolé.

Outre les propriétés astringentes, ces plan-

tes sont recommandées pour déterger les ulceres scrophuleux, & guérir les morsures des bêtes vénimeuses; on les conseille encore comme fébrisuges.

Polygonum perficaria. Linn. Perficaire.

Elle est recommandée extérieurement pour déterger les plaies & arrêter les progrès de la gangrene.

Poligonum amphibium. Linn. Persicaire am-

phibie.

Cette plante a été long-temps vendue avec le houblon en Lorraine pour la falsepareille. Ses succès, comme dépuratifs, engagerent M. Villemette à faire beaucoup de recherches, après lesquelles il parvint enfin à la reconnoître.

Polygonum hydropiper. Linn. Persicaire cu-

rage. Poivre d'eau,

Elle est recommandée intérieurement comme un puissant diurétique & un anti-scorbutique très-actif, on s'en sert aussi extérieurement comme détersive.

Polygonum aviculare. Linn. Renouée.

Les gens de la campagne s'en servent pour la guérison des plaies; ils l'appliquent sur les poignets dans les siévres intermittentes.

Polypodium filix mas. Linn. Fougere male.

Cette plante est recommandée comme apéritive, diurétique, & sur-tout comme vermisuge. Ses propriétés vermisuges ne peuvent être séparées de ses qualités astringentes, ce qui doit engager à lui faire succéder un purgatif. On a conseillé la sougere dans les as-



fections hypocondriaques, & contre le gonflement de la rate. On prend souvent le gonflement du colon pour une affection de la rate; d'ailleurs ce viscere se gonfle par le défaut de ressort, comme on l'observe dans le scorbut. & les astringens deviennent utiles dans ce cas.

Potentilla anserina. Linn. Argentine.

Elle a été recommandée comme fébrifuge, diurétique, astringente, dans les sievres intermittentes, la difficulté d'uriner, les fleurs blanches.

Potentilla reptans. Linn. Quintefeuille.

Elle a été recommandée comme fébrifuge. Lorsqu'on la prescrit dans un temps convenable, pendant le cours des fiévres intermittentes, on observe bientôt que les urines déposent, ce qui prouve qu'elle agit comme diurétique.

Prunella vulgaris. Linn. Prunelle.

On la dit vulnéraire.

Pteris aquilina. Linn. Fougere femelle, on

grande fougere.

Les feuilles & les tiges sont astringentes. mais la racine ne l'est point. C'est aussi trèsmal-à-propos qu'on prétend la substituer à celle de fougere mâle.

Prunus cerusus. Linn. Cerisier.

L'écorce est employée comme fébrifuge.

Prunus spinosa. Linn. Prunelier. Prunier

épineux.

L'écorce est pareillement recommandée comme fébrifuge. Les fleurs le sont comme laxatives.

Pyrola rotundifolia. Linn. Pyrole.

On la recommande comme vulnéraire dans les maladies de poitrine.

Quercus mas. Linn. Chêne.

Toutes les parties de cet arbre sont astringentes; mais les glands torrésiés, ou réduits en émulsion, ont été recommandés contre la toux invétérée, le marasme, la sièvre colliquative. On s'en sert depuis long-temps, à la campagne, dans les coliques venteuses, contre lesquelles M. Godard a fait reconnoître l'essicacité de la noix de galle.

Rhamnus catharticus. Linn. Nerprun.

Il est très-recommandé comme purgatif hydragogne; il est astringent, ce qui peut le rendre diurétique; mais il doit y avoir des circonstances où le cabaret, qui posséde les propriétés astringentes à un plus haut degré, mèrite de lui être préséré.

Rheum rhabarbarum. Linn. Rhubarbe.

La racine est plus astringente que les feuilles : ces dernieres peuvent être employées lorsqu'on a besoin de moins de stipticité.

Rheum rhaponticum. Linn. Rapontic.

On voit, par la maniere dont il précipite le fer, que c'est mal-à-propos qu'on le dit plus astringent que la rhubarbe; il doit seulement être moins purgatif.

Rhus sumac. Linn. Sumac.

Qutre ses qualités astringentes, on lui attribue la propriété d'augmenter la force du vinaigre; ce qu'on peut attribuer à la grande

au lieu de bandelettes, pour emmaillotter les enfans.

Spiraa ulmaria. Linn. Ulmaire. Reine des prés.

On conseille la racine de cette plante comme diaphorétique sur la fin des sièvres malignes. Elle réussit de plus assez souvent à calmer les douleurs hémorrhoïdales; ce qui ne peut avoir lieu qu'autant que ces douleurs proviennent du défaut d'astion du système de la veine-porte, s'il y avoit beaucoup d'éréthisme, de phlogose: s'il existoit des obstructions au soie ou à la rate, cet usage seroit pernicieux.

Symphitum confolida. Linn. Confoude.

Toutes les parties de cette plante sont assringentes. On le croyoit de même, lorsque Cartheuser prétendit qu'elle n'agissoit que par son mucilage. L'erreur de ce Médecin prouve l'utilité des réactifs dans l'analyse des plantes.

Thymus serpillum. Linn. Serpolet.

Il est recommandé contre les pâleurs, la toux invétérée, la migraine qui dépend du dérangement des digestions.

Typha lantifolia-angustifolia. Linn. Massette à larges seuilles, à seuilles étroites. Ces plantes, quoique recommandées contre les pertes, sont très-peu astringentes.

Vaccinium myrtillus-vitis idaa. Linn. Airelle.

Raifins d'ours.

110

Ces plantes sont très-recommandées comme

diurétiques dans les maladies de la vessie. Leur qualité astringente, qui augmente leur action dans les affections catarreuses des voies urinaires, les rend nécessairement très-contraires dans beaucoup d'autres circonstances.

Verbena officilanis. Linn. Verveine.

On conseilloit autresois cette plante dans les sièvres intermittentes. On l'a quittée pour employer d'autres végétaux qui agissent également par leur principe astringent. On s'en sert à l'extérieur, contre les points de côté, les douleurs de tête, les coups de soleil.

Vinca major-minor. Linn. La grande & petite pervanche.

Outre les qualités aftringentes que l'on reconnoît à ces plantes, on les conseille dans les maladies de poirrine; on les emploie extérieurement contre l'esquinancie.

Vitis vinifera. Linn. Vigne.

Les feuilles se prescrivent intérieurement contre les cours de ventre; on les applique sur la peau dans les maladies dartreuses, où elles agissent comme répermissives.

Le verjus est astringent, on l'a vu réussir comme sébristige dans les sièvres bilieuses. Il est recommandé pour prévenir les suites des coups & des chûtes. Comme acide végétal, il doit s'opposer à l'épaississement des humeurs, il soutient l'action des vaisseaux par ses parties astringentes. Il paroît ainsi très-propre à prévenir des conjessions dangereuses.

Ulmus campestris. Linn. Orme.

112

Il est recommandé comme diurétique. On fait un secret de l'usage de sa racine contre les coliques néphrétiques & les affections récentes de la vessie; on l'a encore conseillé comme fébrisuge. Le Docteur Lyson lui a reconnu des propriétés dépuratives, pour lesquelles on en fait beaucoup d'usage aujour-d'hui. Mais on attribue plus particulièrement ces propriétés à l'orme pyramidale, qui n'est qu'une variété, & qui par le soin que la nature a pris de placer les mêmes vertus dans les plantes analogues, ne peut offrir des essets fort dissérens.

Urtica dioica-pilulifera-urens. Linn. Les orties. Ces plantes sont non-seulement recommandées comme astringentes, mais encore comme béchiques incisives, contre l'asthme & la toux invétérée.

#### RÉCAPITULATION.

Plantes recommandées seulement comme astringentes.

Carpinus ostrya.
Cornus mas.
Cornus fanguinea.
Comarum palustre.
Fragaria vesca.
Lycopus europæus.
Mespilus germanica.
Myrthus communis.

Polygonum aviculare.
Polygonum bistorta.
Pyrus cydonia.
Rhus sumac.
Tormentilla erecta.
Typha latifolia.
Thypha angustifolia.
Spirea filipendula.
Astringentes

## 'Astringentes dites antispamodiques.

Achillea millefolium. Hyperticum perforatum.

## Astringentes dites dépuratives.

Agrimonia eupatoria. Cichorium intybus. Fumaria officinalis. Polygonum amphibium.

Rumex acutus. Rumex obusifolius: Sanguisorba major & minor. Ulmus campestris.

## Astringentes dites apéritives.

Berberis dumetorum. Cichorium intybus. Equisetum arvense. Equisetum palustre. Leontodon taraxacum.

Lichen pulmonarius. Polypodium filix mas. Rumex acutus. Rumex obtusifolius, Ruscus aculeatus. Salvia officinalis.

# Astringentes recommandées comme béchi-

Asplenium ceterach... nuraria. Betula alba.

Filago germanica: Trichomanes.. Ruta Gnaphalium dioicum; Hieracium pilosella. Iris pseudo acorus.

H

Lichen pulmonarius.
Lyfimachia nummularia.
Pyrola rotundifolia.
Quercus mas. Glandes. Gallæ.
Rofa centifolia.

Symphitum confolida.

Thymus ferpillum.
Urtica dioica.
Urtica urens.
Urtica pilulifera.

## 'Astringentes employées comme diurétiques.

Cratægus oxyacantha.
Fragaria vefca.
Geum urbanum.
Lamium album.
Leontodon taraxacum.
Morus alba.
Potentilla anferina.
Potentilla reptans.

Ribes rubrum.
Rumex acetofa,
(radix).
Rofa canina.
Rubus fruticofus.
Rufcus aculeatus.
Vaccinium vitis idæa.
Vaccinium myrtillus.
Ulmus campeftris.

## Astringentes purgatives.

Afarum europæum. Iris pfeudo acorus. Rhamnus catharticus. Rheum rhabarbarum.

Rheum rhaponticum. Rumex patientia. Rumex acutus. Rumex obtufifolius.

Astringentes & vermisuges.

Polypodium filix mas.

## DE DIJON, 1783.

715

Astringentes anti-scorbutiques.

Lyfimachia nummularia. Rumex aquaticus. Acutus.
Obtusifolius.

Astringentes employées comme emménagognes.

Ruscus aculeatus. Salvia officinalis.

Thymus ferpillum:

Astringentes dites céphaliques.

Salvia officinalis.

Thymus ferpillum?

Astringentes & carminatives.

Quercus mas. Salix alba-capræa.

Astringentes antiaphrodisiaques.

Nymphæa lutea.

Nymphæa alba.

Astringentes opthalmiques.

Euphrasia officinalis.

Astringentes & sebrifuges.

Æsculus hippocasta- Fagus sylvaties:
num. Geum urbanum.

H ij

1

#### TIG ACADÉMIL

Leontodon taraxa-

cum.

Prunus cerusus.
Prunus spinosa.

Salix alba.
Salix capræa.
Potentilla anserina.
Potentilla reptans.

## Astringentes stomachiques.

Geum urbanum.

Salvia officinalis.

## Astringentes narcotiques.

Cynoglossum officinale.

Nymphæa alba. Nymphæa lutea.

## Astringentes antiseptiques.

Æsculus hippocasta-

Salix capræa. Spiræa ulmaria.

Salix alba.

## Astringentes dites sudorifiques.

Sparganium erectum. Spiræa ulmaria. Sparganium natans.

## Astringentes dites rafraichissantes.

Cichorium intybus. Fragaria vesca. Leontodon taraxacum.

Sanguiforba major & minor.

## DE DIJON, 1783

117

## Astringentes vulnéraires.

Ajuga reptans.
Alchemilla vulgaris.
Geranium robertianum.
Hieracium pilofella.

Hipericum perforatum. Lyfimachia vulgaris: Sanicula officinalis. Vinca major. Vinca minor.

## Astringentes dites détersives.

Æsculus hippocastanum.
Geranium robertianum.
Morus rubra.
Plantago latifolia.
Plantago lanceolata.

Polygonum perficaria.
Rumex aquaticus.
Rumex acutus.
Rumex obtufifolius.
Tormentilla erecta.
Vitis vinifera.

Astringentes répercusives recommandées contre les rhumatismes, l'inflammation & les dartres.

Ajuga reptans.
Betula alnus.
Geranium robertianum.
Hipericum perforatum.
Rumex aquaticus.

Rumex acutus.
Rumex obtufifolius.
Rubus fruticosus.
Verbena officinalis.
Vinca major.
Vinca minor.
Vitis vinifera.

A la vue de cette liste nombreuse de re-Hiij

medes aftringens, dont la plupart sont d'un usage journalier, on doit être étonné de la foiblesse de notre organisation, qui exige un emploi fréquent de toniques styptiques, & en même temps du peu de fatigue que ces médicamens portent sur nos organes, puisque l'observation seule n'a pu suffire à faire reconnoître leurs véritables propriétés. On doit encore se convaincre de la nécessité d'employer les réactifs dans l'analyse des plantes. Faute de se servir de la dissolution du vitriol de mars, on a cru des végétaux simplement mucilagineux. tandis qu'ils étoient astringens; on a substitué des plantes astringentes à d'autres qui étoient seulement dépuratives, & dont l'effet devoit être très-différent. L'avantage de connoître avec exactitude les propriétés essentielles des remedes, doit engager non-seulement à ne négliger pour leur analyse aucun des moyens connus, mais encore à tâcher d'en employer de nouveaux, vu que ceux dont on a fait usage jusqu'à ce jour, paroissent encore insussissans à bien des égards. Ce dont on peut s'en convaincre, en réfléchissant un instant sur les différences qu'établira nécessairement la présence ou l'absence du principe astringent dans l'effet des mêmes remedes.

Les diurétiques astringens conviendront, par exemple, dans la leucophlegmatie, & non dans l'anasarque. Ils seront utiles dans les assections pituiteuses ou catarreuses des reins, & trèscontraires dans les inslammations, les coliques dépendantes de calcul ou de graviers.

Les purgatifs conviennent rarement dans les cas d'obstructions, de desséchement, de phlogole; mais ceux qui sont aftringens ne peuvent

jamais convenir en pareil cas.

Les apéritifs astringens pourront être prescrits dans les cas où la viscosité des fluides se trouvera jointe à l'inertie, au défaut de senfibilité & d'action des solides, où il y aura empâtement ou simple gonssement; mais dès qu'il existera un endurcissement plus ou moins considérable avec tension ou irritation, ces remedes seront très-contraires, les apéritifs simples demandent déjà dans ce cas les plus grands ménagemens.

Les astringens dépuratifs doivent nécessairement n'être employés qu'après un long usage de délayans, d'humectans, de relâchans, autrement ils pourroient agir comme répercussifs.

Les astringens béchiques ne conviennent que pour arrêter les progrès de la fausse pulmonie catarreuse de la colliquation, & quelquefois de la pthyfie nerveuse.

Les astringens anti-scorbutiques ne peuvent qu'être nuisibles, lorsqu'il y a beaucoup de

chaleur.

Les astringens opthalmiques peuvent, en fortifiant les organes de la vue, prévenir le retour des fluxions; mais s'il y a phlogose, inflammation, si l'estomac est très-chaud, ils feront très-contraires.

Les astringens fébrifuges sont contre-indiqués dans les fiévres avec obstructions. Ils ne doivent que rarement être employés dans celles



où quelqu'excrétion critique est nécessaire à la terminaison de la maladie.

Les astringens emménagogues sont très-contraires dans tous les cas de chaleur & d'irritation à la matrice.

Les astringens antiseptiques sont indiqués dans l'état de relâchement d'inertie des vais-seaux, de colliquation des humeurs.

Les astringens céphaliques ne peuvent soulager que dans les cas de foiblesse d'estomac,

suite du mauvais régime.

Les astringens détersifs conviennent dans les cas d'engorgement pituiteux, & quelquefois dans ceux où il n'y a qu'un phlogose assez légere; mais ils sont très-contraires, dès qu'il

y a éréthisme ou inflammation.

Ces vues générales sur l'application des astringens, me semblent devoir suffire pour faire sentir combien il devenoit utile de déterminer avec précision la propriété de la plupart de ces remedes. Telles surent les raisons qui m'engagerent à faire ces dissérentes expériences, lorsque je voulus publier la Flore de Bourgogne. Depuis la lecture de ce mémoire à l'Académie, j'ai vu que M. Bergius avoit également reconnu la nécessité de déterminer la vertu astringente des végétaux. Mais j'ai mis en expérience un plus grand nombre de plantes, & le point de vue très-dissérent sous lequel je les ai envisagées, m'a fait présumer que ce travail pouvoit devenir intéressant.

## DISSERTATION

SUR la situation la plus ordinaire de l'enfant dans la matrice pendant la grossesse.

#### PAR M. HOIN.

PRESQUE tous ceux qui ont écrit sur les accouchemens, ont parlé de la fituation de l'enfant dans la matrice pendant le temps de la grossesse; & il semble que depuis Hippocrate jusqu'à nos jours, ils aient pris à tâche de se copier les uns les autres. Cependant le même Hippocrate, qui leur a servi de guide, devoit leur inspirer des doutes qui auroient pu les conduire à la connoissance de la vérité. Dans son livre de natura pueri (1), il dit expressément: Non datur probè ac certo cognoscere etiamsi puerum in utero videas, utrùm caput sursum habeat, an deorsûm. Zuinger (2), en commentant ce livre, paroît n'avoir plus de doutes sur cet objet, en disant, d'après

<sup>(1)</sup> Interprête Jano Cornaro, in-8°. Lugd. 1564, fol. 42. Ce livre, suivant Galien, doit être attribué à Polibe; selon d'autres, Hippocrate l'a composé, mais dans sa jeunesse.

<sup>(2)</sup> In-fol. Basil. 1579, pag. 200.

Varro (1): Confixos pueros esse à capite infimo nixos, sursum pedibus elatis, instar arboris sicue caput stirpi sive candici, artus ramis assimilentur.

Aristote, Galien, si long-temps les oracles de toutes les Facultés, avoient dit, d'après le livre de Odimestri pareu, du Prince de la Médecine, que l'enfant, dans le sein de sa mere, étoit dans une situation accroupie, la tête en haut, & panchée en devant, le dos tourné & courbé du côté de celui de la femme; les fesses en bas, appuyées sur l'orifice interne de la matrice; les cuisses flêchies, les genoux rapprochés de la poitrine, les talons près des fesses, les coudes sur les genoux, les mains fermées contre les joues ou les yeux; que plus ou moins près du terme de l'accouchement, l'enfant courbant la tête de plus en plus en avant, venoit enfin, par un mouvement prompt, la plonger sur l'orifice utérin. On a donné le nom de culbute à ce changement de position. Leur sentiment devoit être adopté universellement, & il le fut. Ce n'est pas qu'il n'ait trouvé quelques contradicteurs, tels que Varro, Columbus, Onimos, Lamotte, Smellie, &c. mais le torrent l'a emporté, & c'est encore l'opinion la plus accréditée. Voyons cependant si la raison, l'expérience & la physique s'accordent avec eux, & si leur opinion est admissible.

L'examen de ce point de doctrine, qui, au

<sup>(1)</sup> Varro, ad Gell. lib. 16°. cap. 16°.

premier coup d'œil, ne paroît pas être d'une grande utilité à la pratique des accouchemens, est réellement plus important qu'onne pourroit le croire, comme on le verra dans le cours de cet essai. Pour y procéder, il est nécessaire de rappeller ici la figure, la situation de la matrice, & sans s'attacher à la maniere dont s'opere la génération, d'en fuivre pas à pas les produits, leur accroissement depuis leur entrée dans la matrice jusqu'à leur sortie; je serai alors mieux à même de démontrer

de quel côté est l'erreur.

La matrice, dans son état de vacuité, est très-petite, d'une figure piriforme, dont la base est en haut, le sommet en bas. Elle est applatie antérieurement & postérieurement; celle-ci est néanmoins plus convexe, Sa substance est un entrelacement en tous sens de vaisseaux de tous genres, de fibres musculaires très-fortes, unies les unes aux autres par un tissu cellulaire très-dense, très-serré, très-solide. On la divise en fond, qui est sa partie supérieure; en corps, qui est la moyenne; en col, qui est l'inférieure. La cavité de ce viscere n'occupe que son fond I fon corps; elle est applatie & représente un triangle presqu'équilatéral, dont les côtés font formés par une ligne légerement elliptique, mais plus marquée dans celle qui parcourt le fond d'une trompe à l'autre.

Ce viscere est situé dans la cavité du petit bassin, entre la vessie & l'intestin rectum. Il est retenu en place par ses ligamens & par le

124

tissu cellulaire qui occupe le bas-sond du bassin. Il est très-mobile, & son sond se porte presque toujours un peu à droite (1), parce que l'intestin rectunt, qui vient gagner l'anus par le côté gauche, l'y oblige, principalement lorsqu'il est gonssé par des vents ou des matieres stercorales, quoique la vessie, comme le remarque le célèbre de Haller, puisse faire en devant, ce que l'intestin sait en arriere.

Les premiers jours de la conception, on n'apperçoit qu'une vessicule encore flottante dans la cavité de l'utérus. A mesure qu'elle s'y gonfle, elle s'attache de toute part à fes parois, mais bien plus intimement par les points qui doivent former le placenta. Au septiéme jour environ, on peut voir à l'œil nu, une masse d'une espèce de gelée transparente, qu'on divise aisément en deux parties: une beaucoup plus grosse, moins longue, qui est la tête; l'autre d'une forme plus allongée, très-déliée, qui est le tronc. On apperçoit à la partie presqu'inférieure de ce même tronc, quelques filets qui vont se rendre à un des points du sac où tout est renfermé; ce sont eux qui doivent sormer le cordon ombilical. La figure du fœtus humain ne fauroit mieux être comparée qu'à celle d'un tétard.

Vers le quinziéme jour, quelquefois plus

<sup>(1)</sup> V. Elementa Physiol. Haller, tom. VII, part. 11, lib. xvIII, pag. 49.

tard, on apperçoit aux deux côtés du tronc. & au bas de sa partie inférieure, de petites protubérances, qui sont les premieres ébauches des bras & des jambes. Le fœtus d'un mois, ou cinq semaines, a près d'un pouce de long; les traits du visage se développent. ainsi que les pieds & les mains; le ventre s'éleve & s'arrondit. De six à sept semaines, le fœtus a souvent près de deux pouces de longuenr; mais la tête est excessive, relativement aux autres parties. Au second mois le fœtus passe deux pouces de long; le développement est de mieux en mieux marqué. Les vaisseaux composant le cordon ombilical, qui jusques-là avoient été droits & appliqués les uns près des autres, commencent à se contourner, parce que ce cordon s'est allongé, quoiqu'il Loit très-court près de ce qu'il doit être.

A trois mois le fœtus a près de trois pouces, il pese environ trois onces. Quatre mois & demi après la conception, sa longueur va de cinq à sept pouces, plus ou moins; on distingue parfaitement toutes ses parties. A six mois il peut avoir neuf à dix pouces. Il est long d'un pied à peu près à sept; le volume de la tête ne garde encore aucune proportion avec le corps, qui est très-fluet. Ce n'est que depuis ce terme jusqu'à celui de l'accouchement, que l'enfant allant de seize à vingt pouces, & de six à neuf livres de pesanteur, augmente son développement plus proportionnellement, quoiqu'alors même la tête soit toujours plus yolumineuse que le tronc.

On vient de voir que le fœtus humain prenoit un accroissement d'autant plus grand & plus prompt, qu'il approchoit du terme des neuf mois. Le placenta, les membranes & les eaux dans lesquelles l'enfant nage, suivent une marche toute opposée. Dans les commencemens le placenta occupe presque la moitié du sac ovoide: peu à peu il vient à n'en occuper que le tiers, puis le quart, & à la fin à peine en fait-il la cinq ou sixième partie. Il en est de même des eaux contenues dans les membranes; elles sont d'abord dans une très-grande quantité, relativement au volume du fœtus, puisqu'elles vont à plusieurs onces, quand il n'en pese qu'une au plus, & qu'elles vont rarement à trois ou quatre livres, quand le poids de l'enfant est de sept à huit, & quelquefois bien davantage. D'où l'on peut conclure avec le célèbre Baron de Haller (1), que le fœtus dans les commencemens est excessivement petit en comparaison de l'œuf dans lequel il est contenu, & qu'au terme de neuf mois, il le remplit presqu'entièrement, tandis que les eaux sont en petite quantité.

La figure que décrit le fœtus pendant son séjour dans ses enveloppes & dans l'utérus, peut dans les premiers temps être droite, c'est-à-dire, tant qu'il a la forme d'un ver ou d'un tétard; mais dès que les parties commencent

<sup>(1)</sup> Elementa Physiol. tom. VIII, lib. XXIX, sect. IV, pag. 372.

à se dessiner, il doit se recourber. En effet, c'est l'état dans lequel l'atrouvé, dans les œuss, M. de Haller, & ainsi que l'ont décrit tous les Auteurs qui ont parlé de la situation de l'enfant, notamment Mauriceau (1). Ensin, il est forcé de se replier sur lui-même long-temps auparavant qu'il y soit nécessité, pour pouvoir être contenu dans la matrice & se conformer à la sigure presqu'orbiculaire de sa cavité.

La structure & la configuration des parties de l'homme le forcent à être debout ou assis, à porter la tête haute lorsqu'il est éveillé. & à se placer horizontalement pour prendre du repos, ne pouvant sans incommodité avoir la tête plus basse que les autres parties. Il n'est pas étonnant que les premiers qui ont parlé de la situation de l'enfant dans le sein de sa mere, lui aient affigné la même position. comme devant être la plus naturelle & la plus avantageuse à son développement; car ils ne savoient pas que l'enfant eût une vie qui lui fût propre, ce que l'observation & l'anatomie ont fait connoître depuis. Cela n'a pas empêché les modernes de lui conserver la même Lituation, soit par respect pour leurs Maîtres qui la leur avoient enseignée ainsi, soit par le préjugé qu'ils avoient trouvé établi, tant les hommes en général reviennent difficile-

<sup>(1)</sup> Traité des maladies des femmes grosses, &c. in-4°. Édit. de Paris, 1721, tom. 1°1. pag. 233.



ment sur les choses dont ils sont une sois prévenus, malgré la sorce des raisons qu'on leur oppose, & les expériences les plus convain-

cantes qui en démontrent la fausseté.

Le célèbre Astruc, entr'autres (1), a avancé les paradoxes les plus étranges pour soutenir une opinion qu'il avoit trouvé confignée dans presque tous les Auteurs qui ont écrit sur l'art des accouchemens. Il ne craint pas de dire que la partie supérieure est dans l'embryon la partie la plus légere de son corps, soit à cause des cevités de la poitrine, des narines, de la bouche & des oreilles, soit à cause que la tête, qui est fort grosse, est peu remplie par la substance du cerveau. . . . En voilà assez, continue-t-il, pour que le reste du corps tombant en bas, comme plus pesant, la tête occupe la place la plus élevée. Est-il doctrine plus erronée, plus contraire à l'expérience & à la vérité, que celle qui enseigne que le fœtus a la tête plus légere que le reste du corps, vu que dans les premiers temps de la conception, c'est la partie la plus apparente; que c'est celle dont le développement est le plus prompt & le plus considérable; que jusqu'au terme de l'accouchement la tête est toujours la partie la plus volumineuse & la plus pesante? Comment, si son affertion étoit vraie, rendroit-on raison de la figure pelotonnée que prend le fœtus long-temps avant

<sup>(1)</sup> L'Art des Accouchemens, Paris, in-12. 1776, liv. 1<sup>er</sup>. chap. 3, pag. 31.

119

d'y être forcé? Pourquoi a-t-il la tête si penthée en devant, puisque le menton est appuyé, suivant Astruc & les autres, si elle est

filégere?

M. Levres, mon illustre Maître, cét homme, qui, quoi qu'en disent ses détracteurs, a non-seulement reculé les bornes de l'art des accouchemens, mais encore sera regardé dans tous les temps comme un des plus grands Accoucheurs qu'il y ait eu; M. Levres, dis-je, qui s'est élevé contre tant de préjugés, étoit fait plus que personne, pour démontrer la fausseté de celui qui existoit au sujet de la situation de l'enfant: cependant, comme les autres, il a suivi le torrent en adoptant le sentiment de Mauriceau. Mais s'il a soutenu une erreur, il ne l'a pas au moins étayée d'absurdités.

Dans ses leçons particulieres, il enseignoit que l'ensant a la tête en haut jusqu'au sept ou huitième mois qu'il fait la culbute. Il disoit, ce sont ses propres expressions que je rapporte, que de cent ensans qui viennent à terme, à peine en voit-on un qui ne présente pas la tête; au lieu que du même nombre qui viennent avant terme, à peine en trouve-t-on dix qui soient dans cette position (1). Sa grande & longue pratique auroit pu lui faire connoître son erreur, si la promptitude ordinaire aux fausses-couches,

<sup>(1)</sup> En commentant le §. 426, pag. 76 de son Com-



sur-tout habitant une Ville immense, où sonvent l'éloignement empêche qu'on arrive à temps pour être témoin de la maniere dont se termine l'accouchement, avoit pu le mettre à même de juger absolument d'après l'expérience. Ce qui l'a déterminé d'autant plus vo lontiers à admettre la culbute de l'enfant dans le septieme ou huitieme mois, ce sont les douleurs souvent très-vives qu'éprouvent à ce terme quelques femmes, & qu'il a attribué, avec Mauriceau, à la percussion plus ou moins vive que fait dans ce mouvement précipité, selon lui, la tête de l'enfant sur le col de la matrice; douleurs qui se font ressentir quelquefois jusqu'au moment de l'accouchement. & dont j'assignerai plus bas la véritable cause

Burton (1) veut que l'enfant ait la tête et haut pendant tout le cours de la grossesse, & attribue sa chûte sur l'orifice utérin, aux pre mieres contractions de ce viscere. M. Lemoine son Traducteur & son Commentateur, disciple du célèbre M. Ant. Petit, & vraisemblablement son organe en cet endroit, comme en bier d'autres, combat, de la maniere la plus victorieuse, l'opinion de Burton, qui avoit adopté lui-même celle de Ould son compatriote, et disant qu'au toucher d'une semme grosse de sept, huit ou neus mois, on sent presque toujours la tête de l'enfant à travers la paroi de

<sup>(1)</sup> Système complet de l'Art des Accouchemens, &c. 60-80. Paris, 1771, tom. 1, pag. 141,



DE DIJON, 1783.

la matrice qui se trouve dans le fond du vagin. D'où il conclut que le sœtus a effectivement la tête en haut dans les premiers temps de la grossesse, qu'elle descend peu à peu, à mesure qu'elle acquiert plus de pesanteur, & qu'ensin elle est portée vers l'oriste par son propre poids, lorsqu'elle est devenue fort grosse. Il admet, comme l'on voit, la culbute, mais avec des modifications & non pas dans ce sens, que la tête de l'ensant, située dans le sond de la matrice jusqu'au septieme ou huitieme mois, est alors portée subitement & sans aucune préparation vers l'orisice de cet organe.

Parmi tous les Accoucheurs qui ont parlé de la situation de l'enfant dans la matrice, j'ai choisi ceux qui, soutenant la même opinion, l'étayoient de raisons différentes, & en même temps qui par leur juste réputation pouvoient entraîner plus aisément. Le premier, appuyé sur ce qu'avoient écrit les Accoucheurs, s'est épuisé en faux raisonnemens pour soutenir leur opinion devenue la sienne : les autres, imbus d'un préjugé consacré par le temps & la multitude; l'ont soutenue, & ils le pouvoient, s'il est jamais permis de soutenir une opinion erronée, puisqu'ils se trouvoient être du sentiment d'Harvée, de Mauriceau, de Dionis, de Deventer, Boërhaave, Heister, Haller, du Pline François, &c. Ce n'est pas moins une erreur que la Motte, ce Chirurgien si naif, si vrai, avoit attaquée avec vivacité; pas aussi hardiment cependant qu'il auroit pu le faire, puisqu'il ne donne point de situation déter-



minée au fœtus dans les premiers temps de la gestation (1), quoique, selon lui, il ait ordinairement la tête en bas.

Smellie (2) est un des premiers qui ait dit positivement que le sœtus, dès, les premiers temps de la conception, avoit la tête en bas & appuyée sur l'orisice interne de la matrice; qu'il conservoit cette situation jusqu'au moment de l'accouchement; que c'étoit l'attitude la plus ordinaire, la plus naturelle & la plus convenable à l'ensant. J'ajouterai à cela que tout tend à démontrer que, hors les cas où l'ordre de la nature est interverti par des causes dont souvent on ne peut rendre raison, on trouvera toujours l'ensant dans cette situation.

En effet, qu'on se rappelle ici ce qui a été dit plus haut au sujet du développement gradué & consécutif du fœtus, ainsi que de toutes ses appartenances; qu'on examine la figure de l'embryon dans les premiers temps de la conception; qu'on jette les yeux sur les planches qu'ont fait graver Mauriceau, Burton, pour faire voir à différens termes le volume de l'enfant, & l'on sera à même de prononcer, si le plus grand nombre des Accoucheurs est bien sondé à assurer que la tête de l'en-

<sup>(1)</sup> Traité des Accouchemens, in-4°. la Haye, pag.

<sup>93 &</sup>amp; 99.
(2) Traité des Accouchemens, in-8°. Paris, 1754, 20m. 1, pag. 189.

fant touche au fond de l'utérus jusqu'au sept, huit ou neuvieme mois qu'il la précipite sur l'orifice de la matrice.

Une des parties qui se développe le plus promptement dans l'embryon, est le cordon ombilical, puisque Bianchi l'a vu au septieme jour de conception; quoique vraisemblablement il existe des les premiers momens, n'y ayant point d'autre communication de la mere à l'enfant. Il est attaché, comme je l'ai dit, à la partie presqu'inférieure du tronc, qui est alors si mince, si fluet, qu'il paroît avec son cordon fervir d'une longue queue à la tête. Il est très-court & ne s'allonge que peu à peu; ce n'est que dans le second mois qu'il est affez long pour que les vaisseaux, qui le composent, se contournent en spirale. Les mem-branes sont très-amples & les eaux de l'amnios très-abondantes, relativement au volume de l'embryon & de fon cordon. Il se trouve donc flottant & suspendu, la tête étant toujours la partie la plus pesante, plus encore dans ce moment que dans tout autre, vu que le tronc n'est presqu'un filet, sera nécessitée à se porter vers le bas, & à s'y appuyer dès que le cordon fera assez long pour le lui permettre; car l'embryon est certainement plus pesant que le Auide dans lequel il est plongé, & dont l'abondance dans les premiers temps doit être regardée comme une des principales causes déterminantes de la bonne fituation de l'enfant.

C'est alors que le fœtus se pelotonne & se courbe, quoiqu'il n'y soit pas encore forcé



par l'exiguité du sac & la petite quantité des eaux, par une raison bien simple. Le corps ne trouve pas un appui assez solide sur le col dont la tête est posée sur la partie insérieure de la matrice, il se courbe en devant; la configuration de l'épine, quoique très-peu sormée, l'empêchant sussissamment de le faire en arrière. Les cuisses se sléchissent & rapprochent mollement les genoux de la poitrine, contre laquelle le menton est appuyé. Les talons se portent vers les sesses, les bras sur les parties latérales du corps, & le sœtus se trouve être dans la même attitude que les anciens, & d'après eux les modernes, lui ont supposée, à l'exception qu'elle est ici en sens contraire.

L'enfant suit les loix de la gravitation, puisque c'est la partie la plus pesante de son corps qui occupe le centre du bas de la matrice, & comme le vertex est cette partie de la tête en raison des lobes postérieurs du cerveau; c'est aussi le vertex qui se présente ordinairement à l'ouverture de la matrice, à quelque terme que ce soit de la grossesse que la femme accouche. Si l'enfant ne conservoit pas toujours cette situation qu'il est obligé de garder dans les premiers temps, par rapport à la briéveté de son cordon, quelle seroit la force qui pourroit le déterminer à se placer la tête en haut, quand fon cordon feroit affez long pour le lui permettre, & ensuite de la reporter en bas au sept, huit ou neuvieme mois? sera-ce par défaut de pesanteur? L'embryon, & sur-tout sa tête, toujours proportionnellement plus



DE DIJON, 1783.

135

grosse, est spécifiquement plus pesant que le fluide duquel il est environné. Sera-ce pour se mettre plus à son aise? Il y est autant à deux, trois, quatre, cinq ou six mois, qu'à sept, huit ou neus. Aucune raison donc ne peut le faire changer de position. On peut même ajouter que ce changement de situation est de toute impossibilité, & doit paroître tel, si l'on fait attention à la petite quantité d'eau qui se trouve dans l'amnios, relativement au volume de l'ensant, dans les derniers temps de la gestation.

On vient de voir que dans les cas où l'ordre de la nature n'étoit pas interverti; l'enfant avoit & devoit avoir la tête en bas, qu'il en présentoit le sommet à l'orifice utérin, comme en étant la partie la plus pesante. Il reste encore à démontrer maintenant que le corps, ainsi que la tête, sont ordinairement situés de côté, ce à quoi ils sont déterminés par la figure de ce viscere, & que c'est de cette situation de l'enfant que dépend l'ac-

couchement le plus naturel.

Il a été dit plus haut que la cavité de la matrice étoit de figure triangulaire, qu'elle étoit applatie de derriere en devant : ainfi donc elle doit communiquer cette forme applatie à la vessicule qui est le produit de la conception; forme qu'elle conserve jusqu'à ce que par son volume elle ait obligé la matrice à sortir du petit bassin où elle est contenue pendant les premiers mois de la conception. Alors ce viscere qui n'est plus comception.

136

primé en arriere par la faillie du facrum dans fa jonction avec la derniere vertebre lombaire & par le rectum, en devant par la vessie urinaire & les pubis, se développe plus aisément en tout sens, mais toujours inégalement. La colonne vertébrale d'une part, les muscles, les tégumens du bas-ventre, sur-tout si c'est un premier enfant, ainsi que la masse intestinale d'autre part, empêchent que la matrice ne forme un ballon parfaitement sphérique. D'où il résulte que le sœtus qui se pelotonne dès les premiers mois, doit présenter son plus grand diametre qui s'étend du sommet de la tête aux fesses, au plus grand diametre de la cavité de la matrice qui fe trouve être dans ses parties latérales. Dans cette situation qui, est ordinairement celle de l'enfant pendant la gestation, il est placé aussi avantageusement qu'il peut l'être pour son accroissement; ses mouvemens sont moins gênés, & il a une place suffisante dans le vuide qui lui reste à l'autre partie latérale de la matrice, pour loger & étendre mollement ses membres.

Il est facile de s'assurer de cette vérité, déjà annoncée en partie par Smellie (1), en

<sup>(1)</sup> Traité des Accouchemens, &c. tom. 1, pag. 181.

Je dis en partie, parce que cet illustre Accoucheur, qui a parsaitement connu la situation laterale de l'ensant dans la matrice, n'en a pas donné sa raison. Je dois ajouter que le célèbre Guillaume Hunter a publié en Angleterre, en 1777, des planches d'autant plus prècieuses, qu'elles sont gravées d'après nature, où il désente de la contraction de la c

examinant la tête des fœtus avortifs, qu'on trouvera toujours plus applatie d'une tempe à l'autre qu'elle ne devroit l'être, si elle n'avoit pas été comprimée par les parois antérieure & postérieure de l'utérus; & bien mieux encore en portant la main dans la matrice, soit pour y aller chercher les pieds de l'enfant dans un accouchement contre-nature, loit pour décoller le placenta quand on y est torcé par la nécessité; on verra alors de combien est plus grand le diametre latéral de l'utérus que l'antéro-postérieur. L'ouverture des femmes mortes étant grosses, démontre que l'enfant est situé de côté dans la matrice, du moins c'est ainsi que l'ont trouvé MM. Hunter. Camper, Monro, Garrow (1), M. Tarnier mon Confrere à Dijon, moi-même, & que l'ont dû trouver tous ceux qui ont ouvert des femmes mortes étant grosses.

M. Levres (2), qui a bien reconnu dans

montre cette situation latérale de l'ensant; mais encore où il sait voir de profil une matrice extraite du sein d'une semme grosse de neus mois, & qui contient encore l'ensant, qui prouve la vérité de ce que j'avance, au sujet de la figure applatie de la matrice pendant tout le temps de la grosselle: chose qui n'avoit pas encore été dite, que la pratique seule m'a enseignée, ne conaoissant ce bel ouvrage que depuis très-peu de temps, & mon mémoire étant composé depuis 1778.

<sup>(1)</sup> Observation sur les Accouchemens, par Smellie,

tom. 2, Recueil 13, pag. 254.
(2) Suite des Accouchemens laborieux, Paris, 1770, 26-8°. pag. 13.



quelques cas la situation latérale de l'enfant dans la matrice, la regarde comme contrenature, & l'attribue à l'attache latérale du placenta; il conseille (1) même de la corriger dès qu'on s'en apperçoit. Ce qui l'a induit en erreur, c'est que, persuadé que la tête se présentoit ordinairement au détroit supérieur, la face par derriere, ou au plus un peu obliquement, & trouvant la face latérale, il a cru que le retard de l'accouchement dépendoit de cette situation, tandis qu'il est produit alors par l'arrêt des épaules trop fortement comprimées par les parois antérieure & postérieure de la matrice, trop tôt débarrassée des eaux de l'amnios. Il est d'autant plus étonnant que cet illustre Accoucheur soit tombé dans cette erreur, que non-seulement il établit lui-même pour précepte (2), de placer la face latéralement, lorsqu'on veut lui faire franchir le détroit supérieur du petit bassin, dans les occasions où l'on est obligé d'amener l'enfant par les pieds, mais encore qu'il reregarde (3) cette même fituation latérale des épaules, comme cause de la difficulté & de l'impossibilité de l'accouchement par les seules forces de la nature, lorsque la tête est entiérement plongée dans le sacrum.

<sup>(1)</sup> Suite des Accouchemens laborieux, Paris, 1770, in-8°. pag. 186.

<sup>(2)</sup> Id. pag. 151-152.

<sup>(3)</sup> Id. pag. 7 & suivantes.

L'enfant, dans cette situation latérale de son corps & de sa tête, ne se borne pas à y être ainsi, conformément à la figure applatie de la matrice, figure qu'elle conserve toujours, mais plus ou moins pendant tout le cours de la groffesse; mais encore pour présenter sa tête au moment de l'accouchement, dans la même situation latérale, qui est celle qu'elle doit avoir Pour franchir aisément le détroit supérieur du Petit bassin. Elle offre, dans ce sens, son grand diametre, qui est de derriere en devant au grand diametre du bassin, qui est d'un ileum à l'autre; & le petit à la partie la plus étroite de ce même détroit, qui est du pubis à la saillie de l'os sacrum. La tête, il est vrai, se contourne lorsqu'elle a passé le détroit; mais les épaules restent toujours latéralement, s'engagent, dans cette situation, en s'inclinant Plus ou moins sur le tronc de l'enfant; car si elles ne s'inclinent pas assez, ou pas du tout, ou que trop volumineuses, elles ne suivent pas la tête lorsqu'elle a franchi la vulve, l'Accoucheur, qui veut les aller chercher, ne les trouve jamais sur les côtés, mais toujours une contre les pubis, l'autre contre le sacrum, plus ou moins obliquement: ce dont on est pleinement assuré avant d'y porter les doigts, par la position que prend la face de l'enfant, après sa sortie des parties extérieures de la femme.

Si l'on fait attention maintenant à la situation de la matrice dans le petit bassin, à l'inclinaison naturelle de son fond vers la partie 140

droite de ce petit bassin, il sera très-aise d'en conclure que l'embryon, dès qu'il aura acquis un peu de volume, portera sa partie la plus pesante, qui après la tête est le dos, du côté où il trouvera une pente; qu'alors c'est à gauche que se rencontreront les pieds, & qu'ainsi ce sera presque toujours de ce côté qu'on devra les aller chercher, lorsqu'on y sera forcé par la nature de l'accouchement. Par ce moyen on évitera de porter une main inutile, & toujours douloureuse, dans la cavité de l'utérus. L'infpection attentive du ventre de la femme, avant son accouchement, prouve cette vérité. Sur cent, à peine y en a-t-il une dont le fond de la matrice soit incliné ailleurs que sur la droite.

Après avoir démontré que la fituation la plus ordinaire de l'enfant dans la matrice, depuis le moment de la conception jusqu'à celui de l'accouchement, étoit toujours le même, qu'elle se trouvoit être en sens inverse de celle que presque tous les Accoucheurs lui avoient assignée, il faut répondre aux différentes objections qu'on pourroit faire, & qu'on a faites à cette opinion, & faire voir que plusieurs phénomenes attribués à la prétendue culbute, dépendent de toute autre cause.

La nature réfléchie dans ses opérations, dit M. Telinge, D. M. Prosesseur d'accouchemens à Rhetel-Mazarin, grand partisan de l'erreur que je cherche à détruire (1), a fait le sond de la

<sup>(1)</sup> V. Journal de Médecine, tom. xLVII, Février \$777, pag. 129.

matrice beaucoup plus étendu qu'aucune de ses parsies. Que peut - on en conclure raisonnablement? Que le fond de la matrice est destiné à contenir les parties du fatus les plus volumineuses. Rien de plus vrai en faveur de ce que j'ai avancé plus haut. Qui pourroit nier en effet, que le vo-1ume de la tête ne soit plus petit relativement que celui du corps de l'enfant plié mollement en double, qui, pour son développement, a besoin de vuide pour se mouvoir librement, ainsi que les parties inférieures? Parties que tout homme, même le plus idiot, comme le dit la Moue (1), avec sa naïveté ordinaire, peut reconnoître, étant couché avec sa femme, quand elle est grosse, en mettant la main sur son ventre.

Ce n'est que vers les derniers temps de la grossesse, dit encore M. Telinge, que le museau de Lanche formé par l'extrêmité du col de la matrice dans le vagin, s'efface entièrement, &c. . . . Ce n'est donc que vers ce temps que la tête du fatus peut se loger dans la partie inférieure de la matrice, sans être trop comprimée, & sans y causer une irritation dangereuse. La premiere partie de cette proposition est de la plus exacte verité; mais la conséquence est-elle aussi juste? C'est ce

qui mérite d'être examiné.

Quand le fond & le corps de la matrice ont fourni tout ce qu'ils pouvoient à l'extension de ce viscere, c'est alors que le col commence à prêter de proche en proche; mais

<sup>(1)</sup> Traité des Accouch. liv. 1, chap. 21, pag. 94.



s'il agrandit la capacité de l'utérus, il ne fait que proportionnellement au développ ment de l'enfant; ensorte que l'extrêmité « la matrice n'est pas plus étroite, relativeme au volume du fœtus, quand il n'y a que fond & le corps qui ont prêté, que lorsqu le col est développé : d'où l'on peut conclus que la cavité de la matrice n'est pas plu grande, relativement au volume actuel d'l'enfant, que le col soit effacé, ou qu'il n le soit pas; que même, au contraire, il el plus gêné sur la fin de la grossesse, parce que comme je l'ai déjà fait voir, son accroisse ment est beaucoup plus considérable à c terme, que celui des eaux & du placenta ce qui se prouve très-bien par la diminutio des mouvemens de l'enfant, qui deviennen bien moins fréquens & moins forts.

Si l'ontouche une femme dans son septiem mois de grossesse, & quelquesois même plutô on sent, à travers les parois de la matrice la tête de l'enfant qui occupe le sond d vagin, quoique le col soit encore très-allonge & si on ne la sent pas plutôt, c'est que tro peu volumineuse, trop peu solide, & la quan tité d'eau étant beaucoup plus considérable elle ne peut faire saillie au sond du vagin comme à un terme plus avancé, que l'utéru

d'ailleurs est plus émincé.

Je suis bien loin d'attribuer, comme l fait M. Telinge, la chûte du ventre des semmes dans les derniers jours de leur grossesse, à l position dissérente de l'ensant, puisque c changement, dans le volume du ventre, se remarque, soit que l'enfant présente la tête, Soit qu'il présente toute autre partie. La véritable cause s'en trouvera dans le rapprochement spontané des fibres motrices de la matrice, qui, ayant prêté tout ce qu'elles pouvoient prêter, cherchent à passer de l'es-Pèce d'état passif où elles ont été pendant tout le temps de la grossesse, à l'état actif qui prépare, détermine & acheve l'accouchement. Changement qui ne peut s'exécuter que le ventre ne s'affaisse sur lui-même, que tous les visceres abdominaux ne soient plus à l'aise, & que la femme ne se trouve plus légere, comparativement à ce qu'elle étoit auparavant. Si réellement, en portant la main sur le ventre de la semme, quelque temps avant fon accouchement, on croit sentir la tête de l'enfant, elle occupera la même place au moment du travail; mais ce sont, le plus souvent, les fesses que l'on prend alors pour la tête, qui peuvent en imposer à cet instant, comme elles le font souvent au toucher: à celui de l'accouchement dans le principe de la dilatation de l'orifice utérin.

Il en est de même des douleurs que plufieurs semmes ressentent depuis le septieme mois jusqu'au terme de l'accouchement, qui quelquesois sont si vives, que ces semmes se croient en travail. Elles sont attribuées, par Mauriceau & M. Levret, à la pression que fait la tête sur le col de la matrice, au mo-

#### Académie

144

ment de la culbute. Si cette prétendue culbute étoit véritablement la cause de ces dou leurs, devroient-elles exister, comme elle le font, chez les semmes dont les ensan présentent les sesses, les pieds, ou toute autrepartie? Pourquoi ne les pas attribuer à leu véritable cause, qui est l'extension de c même col, doné d'une plus grande sensibilit que le corps & le fond de la matrice? Sensibilité encore augmentée par la présence d la partie de l'ensant qui y appuie, & qui et d'autant plus vive, que la semme a fait u plus grand nombre d'ensans.

Les circonvolutions du cordon ombilica autour du col & des autres parties de l'en fant, ont été regardées, par les partisans d la culbute, comme l'effet de ce mouvement mais la Motte dit très-bien (1): Ils doivent con venir aussi qu'il est obligé de faire plusieurs fois l culbute pour faire passer le cordon du col ent les jambes, ou des jambes au col; comme il l' trouvé plusieurs fois, ainsi que tous le Accoucheurs. Il est si aisé de concevoir con ment l'enfant peut, dans les différens mot vemens qu'il fe donne autour d'un cordon quelquefois très-long & flottant souvent dat beaucoup d'eau, le porter machinalemer autour de son col, ou d'autres parties de so corps, qu'il peut paroître étonnant que d

<sup>(1)</sup> Traité des Accouchemens, liv. 1, chap. 23 pag. 100.

145

grands hommes aient eu recours à un mouvement forcé de l'enfant, pour rendre raison d'une chose si simple.

M. Telinge apporte en preuve de l'opinion qu'il soutient, l'ouverture de trois semmes mortes, grosses de cinq ou six mois, dans lesquelles on a trouvé la tête du sœtus dans la partie supérieure de la matrice. Je me garderai bien de nier ces faits; mais j'ose assure que si ces semmes eussent vécu & porté leurs enfans à terme, ils auroient tous présenté les pieds ou les sesses, & pour preuve, voyons ce que des observateurs dignes de soi ont remarqué en pareil cas.

La Motte, observation 53°, ouvre une perfonne morte, grosse de six mois; la tête & les pieds occupoient la partie inférieure de la matrice. Observation 54°, une semme grosse de cinq à six mois, présente, à l'ouverture du corps, l'ensant situé en travers. Dans la 55°, observation, une semme grosse, au même terme, est ouverte; il trouve l'ensant la tête en bas, comme dans l'accouchement naturel.

Smellie (1) rapporte que M. Hunter, à l'ouverture de deux femmes mortes enceintes, a trouvé les enfans la tête en bas, & située latéralement. Il dit que le Docteur Camper a ouvert une semme, dans laquelle la tête

<sup>(1)</sup> Traité des Accouchemens, tom. 2, pag. 254; Recueil 13.

de l'enfant étoit située de la même maniere. Le Docteur Monro pere, a trouvé dans la matrice d'une semme, qu'on disoit grosse de six mois, le sœtus alongé, les jambes & les sesses regardant le sond, la tête en bas, ap-

puyée sur le bord du bassin.

À une opération césarienne, faite en ma présence en 1776, à une jeune personne qui périssoit d'une sièvre putride, grosse de six mois environ, l'enfant avoit la tête en bas, une oreille au pubis, l'autre au facrum; le tronc occupoit la partie latérale droite de l'utérus, & les fesses regardoient le fond. Même situation de l'enfant s'est présentée à M. Tarniere, Maître en Chirurgie à Dijon, en ouvrant une femme morte au même terme de groffesse. Ces faits opposés à ceux que rapporte M. Telinge, doivent au moins jeter du doute sur la conséquence qu'il en tire; mais ce qui achevera de prouver que lui & ses sectateurs soutiennent une opinion erronée, c'est l'examen de ce qui arrive à presque toutes les fausses-couches.

Si l'on ouvre les Observateurs qui ont écrit sur les accouchemens, on verra que je n'avance rien ici sans preuve. Mauriceau luimème, si favorable à la culbute de l'ensant, rapporte plusieurs observations d'accouchemens avant terme, où il a été obligé de retourner l'ensant pour l'amener par les pieds. (Voyez les observations 55, 59, 165, 202, 216, 221, 252, 651, 672.) la Motte en rapporte de même plusieurs. (Voyez les obser-

vations 130, 131, 140, 141, 142, 151, 351). La 220°. entr'autres, est bien intéressante & bien décisive en faveur de l'opinion que je soutiens. Il fut appellé par une femme, dans le septieme mois de sa grossesse, réduite à l'extrêmité par un accident des plus fâcheux qu'elle éprouvoit depuis plusieurs mois, qui étoit la pression de la tête de l'enfant ensermé dans la matrice, sur le col de la vessie, ce qui empêchoit l'urine de couler. La Moue l'aïant soulevée, il en sortit une quantité énorme; & toutes les fois qu'elle étoit obligée d'uriner, elle avoit soin de soulever sa matrice, comme il le lui avoit montré. Cette femme avoit certainement le détroit supérieur du petit bassin fort large, ce qui y avoit facilité ce plongement de la tête reconverte de l'utérus. Il ajoute de plus, dans la réflexion qui suit cette observation, qu'il a vu plusieurs semmes grosses sujeues à cet accident, qu'il a soulagées en leur faisant un peu repousser leur enfant avec leur doige, lorsqu'il descendoie trop bas, & comprimoie le col de la vessie, &c.

Smellie (1) dit expressément: Lorsqu'une femme avorte dans le quatrieme, cinquieme, sixieme & septieme mois de sa grossesse, c'est ordinairement la tête qui se présente & qui sort la premiere. Dans un autre endroit il dit encore (2): l'ai été appellé pendant une longue suite d'années

<sup>(1)</sup> Traité des Accouchemens, tom. 1, pag. 183. (2) Id. tom. 2, Recueil 13, art. 1er. pag. 253. K ij

pour des femmes qui ont fait des fausses - couches. dans le courant du quatrieme & du cinquieme mois, & j'ai observé que c'étoit toujours la tête qui se présentoit la premiere. C'est ce que j'ai pareillement toujours trouvé tel dans le nombre d'accouchemens avant terme, où j'ai été appellé assez à temps pour suivre la marche de la nature. Je me contenterai de rapporter ici deux de ces faits. En Janvier 1776, appellé à la Maison-de-force, subsistante alors à Dijon, je trouvai dans l'infirmerie des vénériennes, une fille d'environ seize ans qui passoit par les remedes. Elle avoit eu des douleurs trèsviolentes pendant toute la nuit, accompagnées d'une très-grande perte. Elle rendit, dans la matinée, une masse charnue, qui n'étoit autre chose qu'un placenta. Les femmes qui étoient autour d'elle, ignorant sa grossesse qu'elle avoit cachée, essayerent, avant de m'envoyer chercher, de tirer ce qui tenoit après le cordon; mais il se rompit. A l'inspection du placenta, je ne doutai pas qu'elle ne fût groffe de cinq à six mois, ce qu'elle eut bien de la peine à m'avouer. Au toucher je sentis la tête de l'enfant engagée dans le détroit supérieur du petit bassin. Les douleurs étant entiérement cessées, & la perte continuant toujours, je l'accouchai sur le champ avec le forceps, ne pouvant me servir de la main seule; la tête trop avancée pour aller chercher les pieds, & ne l'étant pas assez pour pouvoir la laisir aisément.

Au mois de Janvier 1778, je vis une femme

dans son cinquieme mois de grossesse, qui, à la suite de peines de corps forcées, ressentit des douleurs que je reconnus être pour délivrer, en trouvant la matrice ouverte de la largeur d'une piéce de vingt-quatre sols, les eaux écoulées, & la tête de l'enfant se présentant. Comme il n'y avoit point de perte, ni d'autres accidens, j'abandonnai à la nature le soin de cet accouchement. Effectivement, après quelques douleurs, la matrice se débarrassa de l'enfant & de toutes ses dépendances. A la fin d'Août de la même année, cette femme accoucha encore à près de six mois, de deux enfans, dont le premier présenta la tête, & le second les pieds; ce qui arrive fréquemment dans les accouchemens de jumeaux, quoique j'en aie rencontré beaucoup où chaque enfant s'est présenté par la tête.

Sur cent accouchemens contre nature, il y en a au moins quatre-vingt-dix où l'enfant présente la main, le bras ou l'épaule à l'orifice utérin, ce qui n'arriveroit pas si l'enfant n'avoit pas sa tête à la partie inférieure de la matrice. Alors si l'Accoucheur est appellé avant la rupture des membranes, ou immédiatement après, s'il trouve la main & la tête, il parvient à rendre naturel un accouchement si sacheux, en réduisant la main avant que le bras ne soit engagé; prositant, pour exécuter cette manœuvre, de l'intervalle de deux douleurs pour la repousser; s'arrêtant, mais soutenant la main lors de la

149

contraction, & la maintenant réduite, jusqu'à ce que la tête foit descendue assez bas pour l'empêcher de passer. J'ai trouvé trois fois ce cas, & ce moyen m'a parfaitement réussi les trois fois, ainsi qu'à d'autres Accoucheurs. Si au contraire il trouve le bras engagé, ou le moignon de l'épaule, il n'a pas d'autre moyen à prendre que d'aller chercher les pieds, qu'il trouvera, comme je l'ai dit plus haut, le plus souvent du côté gauche de la mere, & il s'appercevra alors que ce que j'ai avancé sur la forme applatie de la matrice, même dans les derniers temps de la grossesse.

La fréquence de cette derniere situation de l'enfant, dépend certainement, comme le remarque Smellie (1), de la position où se trouve la semme au moment où les membranes se déchirent, quand elle a le ventre ce qu'on appelle en besace; car si elle est debout ou assisée, la tête de l'enfant qui occupe toujours le centre de gravité, ne le trouvant alors que sur le devant du pubis, le bras ou l'épaule doivent se présenter à l'orisice; tandis que si elle est couchée, la tête, par son propre poids, se portant plus en arriere, se présente nécessairement la premiere. Ma pratique m'a montré qu'en général l'ensant ne se

<sup>(1)</sup> Observ. sur les Accouchemens, tom. III, Recueil 34, obs. 6, pag. 210.

présentoit, dans cette position, que chez les semmes qui ont déjà eu plusieurs couches.

Je suis persuadé de plus que les Accoucheurs attentifs ont presque toujours trouvé la tête très-voisine des pieds, quand ce sont ces dernieres parties que l'on reconnoît à l'orifice. Pour lors le corps est plié en double, le dos regardant le sond de la matrice. Suivant toute apparence, ces parties ne se présentent la plupart du temps, qu'en raison de l'obliquité de l'utérus.

J'ai démontré, par le raisonnement & par l'observation, que l'enfant a ordinairement la tête en bas, depuis les premiers temps de la conception jusqu'à celui de l'accouchement; que sa fituation est latérale dans la matrice, en raison de la structure de ce viscere, & que ce n'est que lorsque l'ordre de la nature est interverti, qu'il est situé différemment; d'où je me crois en droit de conclure que le mouvement de culbute attribué à l'ensant, est un être de raison qui répugne également à la nature, à l'esprit & à la saine physique.



# DESCRIPTION

D'UN Météore observé à la Chartreuse de Dijon, le 20 Juillet 1779.

PAR M. MARET.

La rareté extrême de ce phénomene dans nos climats, ne le rend pas moins remarquable que les effets qu'il a produits.

Pour rendre ces effets sensibles à ceux qui liront le récit que je vais en faire, sans connoître le lieu de la scène où ils se sont passés, il m'a paru nécessaire de commencer par donner une idée du local que ce météore a

parcouru.

Lorsqu'on entre dans la Chartreuse par la porte située à l'E, & qu'après avoir traversé le grand enclos, on est arrivé dans les basses-cours, on trouve un espace peu large & irrégulier, emplanté de noyers très-gros & très-vieux. Cette cour est fermée au nord par un mur de sept à huit pieds de hauteur, qui la sépare d'un étang (1). Elle est en partie

<sup>(1)</sup> Cet étang vient d'être comblé, & le mur qui en formoit la séparation, reculé très-loin.

ouverte au S, & la vue se porte de ce côté sur un grand réservoir & sur un potager.

En face est un bâtiment antique servant de cuverie, & où sont les pressoirs. Ce bâtiment, très-solidement bâti en pierres de taille, est terminé au N & au S par deux pignons très-élevés, dont l'aiguille est surmontée d'une croix en pierre de taille. Le couvert, qui est en tuiles & à deux eaux, a une pente très-rapide, & descend jusqu'à environ dix pieds du rez de chaussée.

On passe à côté de ce bâtiment pour arriver dans la seconde cour. Le mur de clôture de la premiere s'évase en cet endroit, & s'étend jusqu'à la porte septentrionale de la Chartreuse, en regnant le long de l'étang déjà désigné, qui se trouve à l'E de ce mur.

Le côté N du même étang est formé par un côteau d'une médiocre élévation, & dont la pente est très-rapide. Le grand chemin qui conduit à Paris, est ouvert à peu près aux deux tiers de la hauteur de ce côteau, dans la direction de l'O à l'E; & comme il est en partie taillé dans le roc, il y a au NE de la premiere cour de la Chartreuse, une portion de rocher à pic. Le reste du côteau est cultivé. Son sommet forme un plateau irrégulier qui s'abaisse insensiblement au N & à l'E, & dont la pente septentrionale s'étend jusqu'au cours de Suzon, au-delà duquel se trouve le Couvent des RR. PP. Capucins.

Quand on a dépassé le pressoir dont j'ai parlé, on entre dans une cour quarrée un

peu irréguliere, & plus longue que large, dans la direction de l'O à l'E.

Le pressoir en fait le côté du levant; plusieurs bâtimens très-anciens & fort élevés : forment celui du couchant, qui se termine au su sud par un vaste hangar servant de magasin à planches. Des bâtimens anciens composent aussi le côté septentrional, & à somme extrêmité orientale est la cellule de Dom Procureur.

Au sud de cette cour est un mur à clairevoie qui la sépare d'un grand jardin potager auquel est attenant un verger très-vaste, emplanté d'arbres fruitiers, & clos par un musde huit à neuf pieds de hauteur. Au-delà dece mur sont des terres labourées, des préstraversés par l'Ouche, un soulon à l'usagedes Tanneurs, dont l'écluse fait séjournerl'eau dans un bief évasé, & rend, par lessiltrations, les prés voisins un peu marécageux. C'est en cet endroit que le vallon de
Plombieres s'évase, après avoir été trèsresserré. Les côteaux qui terminent ce vallon
sont fort élevés, & commençent à se détourner
presqu'à l'angle droit, & à courir du N au S.

Le mur à claire-voie est formé d'un massis à hauteur d'appui, couvert de pierres taillées en bahut, sur lequel, de dix en dix pieds de hauteur, sont élevés des pilastres quarrés en pierres de taille de onze pouces d'équarrissage, & de trois à quatre pieds de hauteur, avec base & chapiteaux surmontés de globes de pierres, ayant sept à huit pouces

de diametre; des goujons de fer unissent toutes les parties de ces pilastres, & les globes

qui les surmontent.

Chaque espace vuide que laissent ces pilastres, est rempli d'une palissade en bois, composée de barreaux figurés en losanges, de quatre pouces sur chaque face, tenus en place par des lices qu'ils traversent. Ces lices sont arrêtées avec de forts crampons de ser dans des seuillures pratiquées sur les faces latérales des pilastres.

A cette description, dont les détails & les phénomenes feront sentir l'utilité, je dois ajouter qu'il y avoit dans la grande cour plusieurs tombereaux, & un char à quatre

toues, mais vuide.

Que plusieurs Maçons étoient placés dans le fond du cloître, sur des échafauds élevés à l'occasion des nouvelles constructions, & dominoient sur la campagne du côté du vallon de Plombieres.

Enfin, que Dom Procureur étoit avec un autre Religieux & deux féculiers, dans un sallon de son appartement qui a une fenêtre au levant, une au midi, ainsi que la porte d'entrée, & que cette porte étoit ouverte.

Les Religieux & les séculiers que je viens de citer, m'ont sourni les détails que je vais donner; & c'est d'après le témoignage des Maçons, dont j'ai fait mention, que je hasarderai une conjecture sur la formation du météore.

ll étoit environ six heures & demie du

soir lorsqu'il parut. Il y avoit eu de grand orages avec pluie dans la nuit, & dans l'après midi la pluie venoient de cesser; le ven étoit E, mais sut remplacé le soir par l SO.

Une violente explosion, suivie d'un ron lement semblable à celui d'un coup de ton nerre, dont la durée est prolongée, sixa l'at tention des témoins que j'ai dit s'être trouvé dans la chambre de Dom Procureur. Ils tour nerent les yeux du côté de la cour, & viren s'avancer, avec une rapidité incroyable, dan la direction du SO au NE, une colonne noir ayant plusieurs toises de largeur sur une hau teur considérable, & qui touchoit à un nuag de même couleur, dont la largeur & la lon gueur surpassoient beaucoup celle de cett colonne.

Cette trombe avoit franchi les murs d'enclos, sans les endommager; mais en tra versant le verger obliquement, elle brisa le branches des arbres, & les porta à plus d vingt pieds. Arrivée au mur à claire-voie elle renversa plus de cent pieds de la palis sade & des pilastres, malgré la résistance de goujons: parvenue au pressoir, elle abatti la croix qui terminoit le pignon méridional enleva une partie des faitieres & des tuile du couvert de ce bâtiment, qu'elle attaqu en écharpe. Continuant sa route, elle sit plie les noyers de la seconde cour, & ébranch ceux qui résisterent à son essort saspira sen siblement de l'eau en passant sur l'étang; &

la lumiere du soleil qui brilloit alors, réséchie par cette colonne, donna les couleurs de l'arc-en-ciel. Sa direction la portant ensuite sur le rocher coupé à pic, au delà du grand chemin, le choc qu'elle y éprouva lui sit prendre un mouvement de tourbillon qui l'éleva. De ce point, tendant toujours au NE, elle alla se dissiper en petite pluie du côté des Capucins.

Cette colonne entraînoit avec elle une quantité innombrable de feuilles, qui contribuoient à lui donner la couleur noire. Sa rapidité étoit si grande, que la palissade & les pilastres furent renversés dans le clin d'œil.

Elle ne touchoit pas terre, du moins peuton le croire, vû qu'elle franchit le premier mur de l'enclos sans y faire de dégradation, & qu'elle n'attaqua que le faîte du pressoir. Mais le mouvement qu'elle communiqua aux planches rassemblées dans le hangar des Meauisiers, celui qu'elle donna à un charriot qui se trouvoit dans la grande cour, & qui sut poussé à plusieurs pas de l'endroit où il étoit; l'effet qu'elle produisit sur les tombereaux qui furent soulevés, & sur les cheminées voisines ébranlées, prouvent que l'air pressé par le volume de cette colonne, & violemment agité par son mouvement rapide, concourut à la production de quelques-uns de ces phénomenes.

Un calme profond succéde au passage & à la disparition de ce météore. Mais ce qui

en rend l'observation intéressante, c'est la direction de sa marche, & l'explosion qui l'annonça.

Le vent étoit à l'E, & ne passa au SO que sur les huit à neus heures du soir, & la colonne observée traversa la Chartreuse du SO au NE. L'explosion qui en précéda l'apparition, sut semblable à un violent coup de tonnerre, & accompagnée de roulemens.

Les Maçons qui, dans le moment de cette explosion, découvroient la campagne de dessus leurs échafauds, assurerent qu'au même instant ils virent s'élever du bief du foulon des Tanneurs & des prés voisins, une vapeur qui ressembloit à une colonne prodigieuse, s'évasoit en s'élevant, & prit, dans le même

instant, la route qu'elle a tenue.

Cette route, presqu'absolument opposée à la direction du vent, fut-elle nécessitée par la force de projection du tourbillon, principe de la colonne? seroit-ce une espèce de foudre s'élançant de la terre sous une forme différente de celles qu'on a souvent observées? comment, & par quelle cause ce météore a-t-il été produit ? Toutes ces questions, trèsnaturelles à former, sont très-difficiles à réfoudre. Il paroît certain que toutes les trombes, dont on a donné l'histoire, sont des effets de l'électricité, de même que la foudre: la direction que celle-ci a prise contre celle du vent, prouve une impulsion vive, & assimile ce météore à l'effet que produiroit la foudre, s'élançant de terre sous un angle plus

159

on moins incliné à l'horizon. Au reste, l'explication que je hasarde est si conjecturale, que je n'y tiens point, & que je verrois avec plaisir quelque Physicien s'attacher à endonner une plus satisfaisante.

# DESCRIPTION ET USAGE

DU NÉCESSAIRE CHYMIQUE,

ET de l'appareil d'expériences sur le rèchaut à esprit-de-vin.

PAR M. DE MORVEAU.

ES progrès étonnans que la Chymie a faits depuis quelques années, n'ont pas seulement contribué à étendre les rapports de cette science à toutes les branches de la philosophie naturelle, ils ont servi encore à perfectionner, à simplifier la manipulation & les instrumens de presque toutes les opérations.

Tant que l'on n'a eu que des connoissances imparfaites des substances que l'on avoit à traiter, de celles même que l'on employoit comme moyens d'analyse, on ne marchoit qu'en tâtonnant; il falloit suivre presque superstitiensement la routine des procédés, se

mettre en garde contre toutes sortes d'accidens que l'on ne savoit pas prévoir, & opérer sur des masses, pour que les essets, rendus par-là, si je l'ose dire, plus grossiers, ne pussent manquer de tomber sous les sens, & d'éveiller ainsi l'attention de l'Observateur. Ce que les premiers Chymistes n'ont point découvert en travaillant dans de vastes sourneaux, l'Art le démontre aujourd'hui sur les moindres parcelles, avec une facilité qui ne permettroit pas de concevoir comment ces phénomenes ont pu leur échapper, si on ne savoit, par une longue expérience, que l'œil ne voit rien, s'il n'est dirigé par l'esprit.

Il ne faut d'autre preuve de cette vérité, que le Mémoire du célèbre Bergman, sur le chalumeau à fouder, appliqué à l'examen des minéraux. On convient affez généralement que c'est un meuble nécessaire à tous ceux qui voyagent, pour étudier la nature dans ce genre de ses productions, parce qu'il est difficile que l'on puisse se charger de tous les morceaux qui méritent cet examen; parce que quand cela seroit possible, l'observation faite sur le lieu même, a bien un autre prix que celle qui est différée à l'époque du retour dans le Laboratoire. Celle-ci n'a pour base qu'une réminiscence vague, affoiblie par l'impression de tous les objets divers qui se sont succédés; au lieu que l'on est tout à la premiere, que la curiosité est irritée à chaque pas, que souvent les apperçus d'une analyse ébauchée, sont utiles pour diriger deś



i6t

des recherches ultérieures, & avertissent de faisir des circonstances locales, dont on n'auroit connu l'importance que par le regret de

les avoir négligées.

Ce fut la ce qui me détermina, il y a quelques années, à faire exécuter deux boîtes, que je nommai le nécessaire chymique, parce qu'elles contenoient, sous un très-petit volume, & très-commode à porter en route, tout ce qu'il falloit pour opérer sur le champ un grand nombre d'essais de ce genre, soit par les réactifs, soit par le feu. Plusieurs Amateurs desirerent en avoir de pareilles; je les leur prêtai volontiers pour servir de modele: ils m'ont engagé depuis à rédiger une courte instruction sur la maniere d'en faire usage, pour diriger les expériences & assurer les observations. Ce sera l'objet de la premiere partie de ce Mémoire.

La seconde partie contiendra la description d'un appareil d'expériences, imaginé dans la même vue de favoriser les recherches. Il se rapproche tellement par le volume de la condition du nécessaire chymique, qu'il peut être facilement rensermé dans une troisieme boîte de même grandeur, pour ceux qui desireront le porter en voyage: il sera d'une utilité encore plus générale, puisqu'il peut, à un certain point, tenir lieu de Laboratoire à tous ceux qui n'en ont pas. Combien de gens sont détournés de se livrer à cette étude fi attrayante, par l'embarras de loger des sourneaux, les dépenses que cela entraîne,

la crainte des vapeurs du charbon, ou seulement l'impossibilité de pouvoir consacrer à certaines opérations, tout le temps qu'elles exigent. Ce sera donc servir la science, que de remettre les instrumens de l'expérience aux mains de ceux que ces considérations avoient forcé d'y renoncer.

#### S. Ier.

Chacune des boîtes du nécessaire chymique a 7 pouces de longueur, environ 4 pouces de largeur, & 1 ½ pouce d'épaisseur. Ce sont à peu près les dimensions d'un volume in-8°, ordinaire. Elles doivent être de bois trèsmince, & pourtant solide; les uns les sont couvrir par le Relieur, d'autres les présérent d'un bois susceptible de poli, & sinies par l'Ebéniste: cela dépend du goût, & ne fait rien à l'objet.

La premiere boîte est destinée à contenir les acides & autres siqueurs qui exigent le plus de précautions; c'est pour cela qu'elle est divisée en six cases séparées par de petites cloisons aussi en bois; ces six cases sont garnies de six pesits slacons d'un pouce de grosseur, de 32 à 33 lignes de hauteur, que l'on choisit pour les remplir avec le moins de jeu possible; ou, encore mieux, qui ont servi eux-mêmes à en arrêter les dimensions. Ces slacons doivent être de verre blanc crystallin un peu sort, portant goulots renversés, & bouchons usés à l'émeri. La partie supérieure



de ces bouchons est usée presqu'à moitié sur la meule, de maniere qu'ils forment un plan sur lequel se repose une vis en bois qui sert à les assujettir; un coup d'œil sur le dessin où j'ai fait représenter cette boîte ouverte (voyez fig. I.) fera mieux faisir la disposition de toutes ses parties que la plus longue description.

b b b b b Vis de pression qui s'élevent & s'abaissent en tournant dans l'écrou pratiqué dans l'épaisseur des traverses AA, direclement dans la ligne perpendiculaire au milieu du bouchon. Ces vis sont un peu grosses, & de bois de cormier, seul bois qui porte bien les filets dans la ligne transversale de son fil. On voit que les traverses AA sont suffisamment enfoncées pour laisser la place des têtes des vis.

-D Montant un peu plus fort qui sert à maintenir les deux traverses AA, lesquelles, sans cela, seroient sujettes à se déranger par

le mouvement des vis.

CC Crochets qui ferment la boîte. On sent que le petit côté sur lequel ils sont placés, doit former un angle un peu obtus avec le grand côté du couvercle, pour qu'elle puisse se fermer exactement.

Chaque flacon porte son étiquette sur un papier collé à l'ordinaire, & le signe est encore gravé sur le bord de la traverse supérieure, pour indiquer ce qu'il contient, dans le cas où l'écriture seroit effacée par la vapeur acide.

Il est aisé de voir que par cette disposi-



tion, ces flacons ne peuvent, ni se briser; ni laisser échapper la moindre partie de leur liqueur, & qu'ainsi on est à l'abri de tout accident. Il me reste à indiquer ce qu'ils contiennent, & l'usage que l'on en fait.

Le premier flacon est rempli d'acide nitreux pur, ou eau - forte redifiée à la maniere de Meyer, c'est-à-dire, précipitée par l'argent,

& ensuite redistillée.

Elle sert à toucher les minéraux pour reconnoître, à l'effervescence, ceux qui sont de nature calcaire, & ceux qui n'en sont pas, & qui n'en tiennent pas.

Elle sert à faire reconnoître les eaux minérales sulfureuses, en précipitant le soufre,

& détruisant l'odeur hépatique.

Elle occasionne dans les eaux gaseuses de petites bulles qui manisestent la présence de l'acide méphitique uni à une terre, ou à un alkali.

Le second flacon tient de la dissolution d'argene

par l'acide nitreux.

Elle sert à faire reconnoître, sur le champ, la présence de l'acide muriatique dans les eaux, à quelque base qu'il soit uni, par le caillé blanc qu'elle y occasionne.

Le caillé sera plus ou moins noir, fi l'eau tient quelque peu de soufre, ou même de

phlogistique.

Il y a dans le troisieme flacon de la dissolution de mercure par l'acide nitreux, faite à froid. Elle fert aussi à faire connoître l'acide muria-

tique par un précipité blanc caséeux.

Elle fait connoître plus fûrement l'acide vitriolique par le précipité grenu, & souvent jaunâtre, qu'elle détermine.

Elle indique la matiere extractive par de

petits nuages blancs.

N. B. Les deux diffolutions précédentes donnent également un précipité dans les eaux qui tiennent des alkalis ou des terres, fans qu'elles tiennent de l'acide muriatique, ni de l'acide vitriolique; on emploie d'autres réactifs pour assurer ces résultats.

On met dans le quatrieme de la dissolution de muriate barotique, ou sel marin à base de

terre pesante.

Elle maniseste sur le champ l'acide vitriolique, à quelque base qu'il soit uni, en régénérant du spat pesant qui est insoluble, & qui se dépose en poudre grenue, un peu grise.

Dans le cinquieme, de l'acide du sucre.

Il sert à découvrir la terre calcaire dans les eaux, par la propriété qu'il a de s'en emparer sur le champ, à quelqu'acide qu'elle soit unie, & de former avec elle un sel trèspeu soluble, qui se précipite sous la forme d'une poudre blanche.

Et dans le sixieme, de l'alkali volatil.

Il sert à faire reconnoître la présence du cuivre, par la couleur bleue qu'il donne à ses dissolutions; tellement que si on touche avec l'eau-forte un minéral que l'on soup-

conne tenir de ce métal, & qu'on y laisse tomber une goutte d'alkali volatil, le bleu

paroît sur le champ.

Si cet alkali volatil n'est pas suor ou caustique, il sert en même temps à découvrir, dans les eaux, la chaux & la magnésie; & quoique non caustique, il n'en seroit pas moins utile, dans l'occasion, pour la morsure de la vipere.

La seconde boîte du nécessaire chymique renferme le chalumeau, les petits instrumens qui l'accompagnent, les trois flux pour les essais au seu, & la suite des réactifs.

Le chalumeau est bien connu par le Mémoire de M. Bergman, dont j'ai donné la traduction dans le Journal Physique du mois de Septembre 1781, pour satisfaire l'empressement des Savans, & qui se retrouvera dans le second tome de ses Œuvres. La gravure qui y est jointe, me dispense d'en donner ici le dessin; & les autres objets de cette seconde boîte n'exigeant pas les mêmes précautions que les acides, la disposition en devient à peu près arbitraire; d'ailleurs, quelques courtes observations suffiront pour saire entendre celle que j'ai adoptée, en même temps que je rappellerai ces objets pour en indiquer l'usage.

Cette seconde boîte renferme donc:

1°. Le chalumeau qui sert à éprouver tous les minéraux, soit seuls, soit avec un des trois flux dont il sera parlé ci-après, & à les faire reconnoître par la maniere dont ils se com-

167

portent seuls & avec ces fondans, sur la cuiller, ou sur un charbon. Il est placé dans une gouttiere pratiquée le long d'un des grands côtés de la boite.

20. Des brusselles, ou petites pinces à ressort, pour prendre les fragmens de matieres à

estaver.

3<sup>6</sup>. La petite cuiller de platine, d'or, d'argent doublé d'or, ou même d'argent.

4°. Le petit barreau aimanté, avec son

pivot, pour éprouver le magnétisme.

5°. Un briquet formé d'une seule lame d'acier un peu large, pour essayer la dureté.

Ces quatre derniers articles se rangent trèsbien sous la gouttiere qui porte le chalumeau.

6°. Le premier flux, c'est-à-dire, du phosphate natif, ou phosphate ammoniacal natif de l'urine, aussi connu sous les noms de sel

microcosmique, de sel susible natis.

Ce flux, ainsi que les deux suivans, servent à faire connoître les métaux par leurs régules, lorsqu'on les emploie comme réductifs sur le charbon, ou à la pointe bleue de la flamme; ils sont connoître les chaux métalliques, par la couleur propre qu'elles communiquent au globule vitreux dans la cuiller; ils indiquent la nature & la composition des terres & pierres, par des phénomenes tout aussi sûrs, mais qui sont un peu moins sensibles, & sur-tout beaucoup plus multipliés; ce qui me détermine à placer à la suite de cette description, un tableau des principaux

résultats des essais des terres & pierres au chalumeau, seules & avec ces trois flux.

7°. Le fecond flux, qui est de la soude, ou alkali minéral crystallisé, & que l'on a laissé tomber en essorescence à l'air.

8°. Le troisseme flux, qui est du borax que l'on a calciné pour lui enlever toute son eau

de crystallisation.

Ces trois flux, ainfi que les quatre articles dont il va être question, comme servant à compléter les réactifs, sont tout simplement ensermés dans de très-petites fioles de verre, bouchées avec du liége, & distribuées dans sept cases; savoir, cinq à peu près pareilles à celles des flacons (figure Ire.), mais qui n'occupent que les deux tiers du même espace en hauteur, & les deux autres prises sur la longueur, parallelement à la gouttiere du chalumeau.

9°. Du vitriol de Mars en crystaux bien nets, & non effleuris.

Il sert à reconnoître, dans les eaux, la présence de l'air pur qui décompose ce sel & précipite la terre du ser.

10°. Des fragmens de crystaux d'alun.

Il est utile pour distinguer les eaux séléniteuses qu'il ne trouble pas, des eaux chargées de terre calcaire tenue en dissolution par l'acide méphitique, dans lesquelles il produit une zone blanche sloconneuse.

11°. De l'eau de chaux.

Pour éprouver les eaux qu'on soupçonne gaseuses, & les dissolutions métalliques.

12°. Le prussite de potasse, ou alkali phlo-

gistiqué en liqueur.

Il démasque le ser dans les eaux, par la nuance bleue qu'il leur communique; il précipite les terres métalliques de leurs dissolutions, & les sait reconnoître à la couleur de leurs précipités.

13°. L'alcohol gallique, ou teinture spiritueuse

de noix de galle.

Cette liqueur a la propriété de manifester les plus petites parties de fer, par la couleur pourpre qu'elle donne à ses dissolutions les plus soibles.

14°. Du papier teint en bleu par l'infusion.

de tournesol.

Il sert à manifester la présence des acides

qui le font passer au rouge.

15°. Du papier teint en jaune par l'infusion

de curcuma, ou terra-mérita.

Il annonce la présence des alkalis qui le rougissent; l'eau de chaux l'altere aussi, mais plus soiblement.

16°. Du papier teint en rouge par l'infusion

de fernambouc.

Il sert de même à manifester les alkalis, libres, mais il est encore plus sensible que le précédent; l'altération est du rouge au violet bleu.

Ces trois papiers réactifs se mettent dans une espèce de porte-seuille de carton qui sa pose sur les cases, & contribue encore à contenir les sioles. On acheve de remplir ca porte-seuille de quarrés de papier sans colle,

qui se placent en forme de cornets év sur des verres, lorsqu'on a des liqueu filtrer.


170

On peut ajouter enfin dans cette boîte petit tuyau de verre pour agiter les mêlan & en le courbant légérement à ses deux trêmités, il servira, dans l'occasion, à cueillir les gas, on n'aura plus qu'à l'ada au bouchon d'une bouteille ordinaire.

On voit clairement qu'avec ces deux bo & en faisant ressource des vaisseaux & trumens qui se trouvent par-tout, il est d'objets sur lesquels le voyageur Chym ou Minéralogiste, ne puisse ébaucher analyse, ou satisfaire au moins le pre appétit de sa curiosité : elles méritent ele titre que je leur ai donné de néce chymique.

Il ne me reste plus qu'à réunir ici dan seul Tableau, comme je l'ai promis principales notions, que l'on doit a toujours présentes à l'esprit, en procé à l'essai des minéraux, pour en juger s

ment les résultats.



: 

#### S. II.

M. le P. de Virly m'ayant écrit d'Upsal, au mois de Mars 1782, que le célèbre Bergman faisoit quelquesois usage, pour ses essais, de petites cornues qui n'avoient guere plus d'un pouce de diametre, je ne tardai pas à comprendre combien cette méthode étoit avantageuse; que si elle n'étoit pas toujours suffisante pour assurer les résultats, elle servoit du moins à diriger l'opération, à guider l'observation, à épargner ensin bien des tâtonnemens, lorsqu'on vouloit ensuite travailler plus en grand, & qu'elle devoit ainsi favoriser les recherches, & faciliter les moyens de multiplier les tentatives de tout genre sur toutes matieres.

Pour m'approprier cette méthode, je crus d'abord pouvoir employer ces petites cornues à long col, qui n'ont en effet guere plus d'un pouce de diametre, & qui se trouvent chez les Marchands Verriers depuis quelques années, à raison du grand usage que l'on en a fait dans le commencement pour les gas: je sus bientôt obligé d'y renoncer; elles s'échaus-foient difficilement, elles ne soutenoient pas le seu à siccité, & la plus légere variation de température les faisoit éclater. J'essayai, d'autre part, le seu de lampe entretenu par divers combustibles, je variai la maniere de l'appliquer; je persectionnai de même les supports des vaisseaux, & les autres parties

de l'appareil, à mesure que la pratique m'e fit découvrir les inconvéniens. Tous les détails de ces corrections progressives, seroier ici superflus; je passe tout de suite à la decription de l'appareil, qui a ensin rempli mobjet, & qui me paroît réunir, autant qu'est possible, la célérité, la commodité & l'aconomie.

AB (figure 2), est un plateau de ser à huit pouces de longueur, de cinq pouce de largeur, & de dix-huit lignes d'épaisseur duquel s'éleve perpendiculairement le mon tant de bois CD de dix pouces de hauteur Ce montant peut être assemblé à queut d'aronde, & simplement sixé par une vis, pour donner la facilité de le démonter, dans le cas où on voudroit rendre cet appareil portatif.

Sur le bord, à droite du plateau en e, est attachée une pièce de métal composée de la fourchette f, de la vis g, & de son écrou n lequel se prolonge au delà de la fourchette & forme une patte pour recevoir la tablette 1 K. L'extrêmité de la vis étant retenue dans un collet h qui se trouve au bas de la fourchette en retour d'équerre, c'est l'écrou qu devient mobile, & qui, glissant facilement dans la fourchette f sur une longueur de deu pouces  $\frac{1}{2}$ , sert à élever ou à abaisser à vo lonté la tablette 1 K qui porte la lampe.

Au milieu du plateau, vers l'autre bout est une vis aussi de métal m, qui sert : placer le support OP à la hauteur que l'or

#### DE DIJON, 1783. 179

desire. Ce support est un morceau de bois creusé dans son milieu pour assurer le récipient, ou encore mieux, garni d'un rond de natte attaché sur l'arrête par un lacet.

Sur le montant de bois CD, est une lame de métal q, mobile sur toute la longueur de la rainure r, autour d'une vis à tête quarrés f, dont on augmente à volonté la pression par le moyen d'un écrou à oreilles; cette coulisse porte, à son extrémité, un bras e, de sert à le fixer de tel côté de à telle hauteur que l'on desire. Sur ce bras glisse de même, en avant ou en arrière, le crochet x, que l'on arrête aussi en serrant sa vis v, de sorte que l'anneau y, destiné à recevoir le col de la cornue, peut être placé sur le champ au point convenable.

Lorsqu'on veut se servir de cet appareis pour la distillation, on met dans la cornue FI les matieres; on introduit le col dans l'anneau y, on l'ajuste ensuite dans le col du petit ballon GI qui sert de récipient; & en faisant jouer la coulisse q & le crochet x, on donne à la cornue la situation & l'inclinaison

que l'on juge à propos.

Tout étant ainsi disposé, on place sur la tablette la lampe H, de maniere que la mêche allumée soit immédiatement sous la cornue; on éleve ou on abaisse la tablette IK, en tournant la vis g, suivant que l'on veut donner plus ou moins de seu, & on conduit, au surplus, la distillation comme à l'ordinaire, Les cornues dont je me sers, sont des cor-

174

nues soufflées très-minces à la lampes d'Email leur, qui ont depuis quinze jusqu'à vingt deux lignes de diametre; ce sont les seule qui m'ont permis de pousser les opérations jusqu'à en faire rougir le fond; elles on d'ailleurs l'avantage de résister aux alternative les plus subites de chaud & de froid, ce qu donne beaucoup de facilité pour gouverne le feu, en retirant la lampe, lorsqu'il y danger que le bouillon ne s'éleve au col d la cornue, & la replaçant ensuite sans avo-

besoin d'échauffer par degrés.

· Le choix des ballons exige moins de pre caution: les petits matras foufflés dans le Verreries, sont excellens pour cet usage; us fiole à médecine, ou toute autre petite bo1 teille, en serviroit dans le besoin. On lus les jointures comme à l'ordinaire; & si « traite des substances qui fournissent beauco de vapeurs, on pratique de même à la pars supérieure en a, un petit trou que l'on co vre avec du lut. J'ai quelquefois introdu dans cette tubulure, un petit siphon recour pour recueillir les gas fous une cloche verre renversée, que je plaçois à côté 4 ballon, & je n'ai pas éprouvé plus de diff culté que par tout autre appareil.

La lampe H est absolument semblable celle des réchauts de table ordinaires à espri de-vin, excepté que les trois porte-mêch sont de différentes grosseurs pour diminu & augmenter le volume de la flamme, auta que l'exigent la forme des vaisseaux & l'obj

#### DIJON, 1783.

175

de l'opération. On peut encore en varier l'étendue, en élevant ou abaissant la mêche par le moyen d'une petite pince. L'esprit-devin est préférable à tous égards, il ne donne ni odeur, ni fumée; il ne porte pas, comme l'huile fur les vaisseaux, un enduit fuligineux très-désagréable, il donne une flamme séche, beaucoup plus active, &, épreuve faite, ce qu'il coûte de plus est avantageusement compensé par le temps qu'il épargne. J'ai souvent fait en huit ou dix minutes, avec cet appareil. pour deux sols d'esprit-de-vin, des dissolutions, évaporations, &c. &c. qui m'auroient pris trois heures, & consumé pour dix-huit deniers de charbon, sans augmenter les quantités.

L'anneau de laiton E est précisément adapté à cet appareil, pour recevoir les matras de digestion, & les capsules à évaporer; il est porté horizontalement par une tige de même métal, qui est courbée en équerre pour entrer dans les deux petites vervelles bb; & comme elle est pressée par un ressort, elle maintient l'anneau où on le place. Cet anneau mobile est écarté quand on opere à la corpue; on le ramene au dessus de la lampe pour les digestions, & alors la coulisse q peut servir 'à assujettir le matras, dans le cas où on auroit à se mettre en garde contre des soubresauts dans la liqueur, capables de renverser ce vaisseau; ce qui arrive assez fréquemment. Enfin, la figure 3 représente le couverçle

que l'on met sur la lampe pour l'éteindre, &



empêcher l'évaporation de l'esprit-de-vin;

lorsqu'elle n'est pas allumée.

Ainfi, avec ce seul petit appareil, on pourra faire, sans embarras, en très-peu de temps, avec très-peu de dépense, des distillations qui exigeoient le fourneau à réverbere; des dissolutions, des digestions, des évaporations que l'on n'osoit confier qu'au feu de sable, à cause de la fragilité des vaisseaux de verre: on pourra varier les expériences, multiplier les tentatives, apprécier sur le champ un grand nombre d'idées de recherches, dont on ne fait d'abord que différer l'examen, à cause des longues préparations, & que l'on finit par oublier; on sera plus hardi pour tâter les matieres précieuses; on aura, comme dans les essais au chalumeau, l'avantage de voir de plus près les plus légers changemens, d'arrêter à volonté les opérations pour en observer les progrès, sans courir le risque d'être incommodé par la chaleur. Les résultats seront rarement équivoques, quand ces expériences seront dirigées par un Chymiste instruit des principales propriétés des subftances qu'il emploie, exercé à saisir les phénomenes par les signes les moins apparens, en possession de tous les moyens de détruire, ou de confirmer ses premiers jugemens : ces essais ne seront du moins jamais infructueux, puisqu'ils serviront à guider le travail sur des quantités plus considérables. C'en est assez sans doute pour recommander l'usage de cet instrument.

**ESSAI** 

## ESSAI

SUR la durée & les probabilités de la vie, calculées pour la Ville de Dijon, d'après les registres mortuaires.

#### PAR M. MARET.

Le travail que j'ai fait pour estimer la salubrité du séjour de ma Patrie, & pour arriver à la découverte des moyens de l'augmenter encore, m'a mis dans le cas de consulter les registres mortuaires. Le relevé que j'en ai fait, a donné lieu aux observations, aux réslexions qui composent cet essai.

C'est sur les dix années qui se sont écoulées depuis 1770 jusqu'en 1779 inclusivement, que j'ai porté mes recherches. Elles m'ont appris que dans cet espace de temps, il est mort en cette Ville 6928 personnes, dont 3505 mâles, & 3423 semelles. Cette dissérence m'avoit paru d'abord mériter peu d'attention, & être un esset nécessaire de la plus grande quantité de mâles, vû qu'il en doit mourir un plus grand nombre, puisqu'il en naît davantage que de semelles.

Mais si cette différence n'eut point eu d'autre cause, le nombre des morts eût dû se trouver toujours dans la même propore

178

tion, & je ne tardai pas à m'appercevoir qu'elle devoit être attribuée à la plus grande vitalité des personnes du sexe, déjà reconnue & prouvée par les calculs de MM. Kerseboom & de Parcieux, & par le relevé des registres de la Paroisse St. Sulpice de Paris.

Je vis en effet que le nombre des morts. dans l'un & dans l'autre sexe, n'étoit jamais proportionnel au nombre des naissances; qu'à la fin de la cinquieme année, il étoit mort 1290 mâles, & seulement 1168 femelles. tandis que le nombre des naissances des mâles, étant à celui des femelles comme 13:12, le nombre des morts de celles-ci eût dû être de 1190; qu'en partant de cette époque, on trouvoit toujours beaucoup plus de femelles que de mâles dans le nombre des vivans, & que parmi les morts, il y avoit jusqu'à soixante-cinq ans, toujours plus de mâles que de femelles; que si au delà de ce terme, il mouroit plus de celles-ci que de mâles, c'étoit visiblement parce que le nombre de ceux-ci étoit plus petit, & que la proportion des morts aux vivans étoit, même dans ces circonstances, toujours défavorable aux mâles. Je vis enfin qu'à quatre-vingts ans, le nombre des mâles vivans n'étoit que de 166, tandis que celui des femelles étoit de 290, & qu'à quatre-vingt-dix, ce nombre n'étoit plus que 13, & celui des femelles 36.

Ces remarques me firent penser qu'il seroit au moins curieux de connoître le risque de

mourir que court à différens âges chaque personne de différent sexe, & que ce travail pourroit même être intéressant, en mettant sur la voie, pour s'élever à la connoissance des causes de ses dangers.

D'après cette idée, je me suis occupé à tracer un tableau, sur lequel je pus, en opposant le nombre des morts à celui des vivans, évaluer le risque de mourir que courent, aux mêmes âges, les personnes de l'un & de l'autre sexe.

Les Tables de M. Dupré de Saint-Maure, que M. de Busson a insérées dans le quatrieme volume de son Histoire Naturelle, m'ont servi de modele; & j'ai supposé, avec ce Philosophe, le nombre des naissances égal à celui des morts.

L'immensité du travail qu'auroit exigé le dénombrement des uns & des autres par chaque année, m'a forcé à en réunir cinq; & comme au delà de quatre-vingt-dix ans, le nombre des vivans & des morts est peu considérable, j'ai cru pouvoir me borner à former mon tableau de dix-neus cases ou colonnes horizontales, comprenant, dans les dix-huit premieres, les vivans & les morts pendant un lustre, & rassemblant, dans la derniere, tous ceux qui ont vécu & qui sont morts au delà de quatre-vingt-dix ans.

Trois colonnes verticales recoupent les horizontales. La premiere porte en tête, indication de l'âge; la seconde, détails relatifs aux

#### 180 À CADÉMIE

mâles; & la troisieme, détails relatifs aux fe-

Chacune de celles-ci est sous-divisée en trois autres colonnes, dont la premiere contient le nombre des individus vivans, à l'époque désignée; la seconde, celui des morts dans le même espace de temps; & la troisieme, le rapport de ce nombre à celui des vivans, d'après lequel on peut estimer le danger qu'ont

couru ceux qui vivoient.

Pour rendre sensible la différence de ce danger, relativement aux individus de l'un & de l'autre sexe, j'ai employé, dans les évaluations respectives de ce danger, les mêmes nombres pour le premier terme du rapport, en négligeant à cet effet les fractions; & la dix-huitieme case de la colonne qui concerne les semelles, est la seule où je me suis vu sorcé d'intervertir cet ordre, mais sans que la différence des rapports soit moins facile à saisir, parce que j'ai donné, pour second terme, celui qui se trouve dans la case correspondante de la colonne des mâles.





OF.

On voit, par ce tableau, comme je l'ai déjà annoncé, que la durée de la vie des femelles est plus grande que celle des mâles, & qu'à tout âge le danger de mourir est plus grand pour ceux-ci que pour celles-là; que cependant, de 5 à 10, de 50 à 55, de 75 à 80, & de 80 à 85, il est à peu près égal; que pour l'un & l'autre sexe, le premier lustre est un des plus dangereux, presqu'autant que celui de 70 à 75, & guere moins que celui de 75 à 80 : enfin, que la moitié des mâles est morte avant 26 ans, & la moitié des femelles seulement avant 35; que les deux tiers des premiers sont morts avant 50, & les deux tiers des autres seulement avant 60; les trois quarts de celles-ci feulement avant 70, & les trois quarts de ceux-là avant 60.

Si de l'observation de ces faits, on vouloit s'élever à la connoissance de leurs causes, on verroit que la différence observée entre la longævité des femmes & des hommes, dépend de la différence de leurs constitutions, de la diversité de leurs occupations & de leurs mœurs; que si le risque de mourir est à tout âge plus grand pour ceux-ci que pour celles-là, quoique depuis l'âge de 14 ans jusqu'à celui de 50 & au-delà, les femmes soient exposées à des dangers que les hommes ne partagent pas, c'est que ce désavantage est amplement compensé par les avantages particuliers qu'elles tiennent de la nature, Miij

des institutions sociales, & de leur tempérance.

La mort, lorsqu'elle n'est pas prématurée, est l'esset nécessaire de la rigidité de nos sibres & de l'oblitération de nos vaisseaux. Plus les progrès de la densité de nos humeurs & de nos solides, qui amene la rigidité, se sont rapidement, plus le dernier moment se

rapproche.

Or, ces progrès sont sensiblement plus rapides chez les mâles que chez les semelles, & d'autant plus, que par leur constitution originelle, les sibres de celles-ci sont beaucoup plus molles, beaucoup plus ductiles que celles des mâles. Cette considération suffiroit seule pour donner la solution du problème que présente la différence de longævité de l'un & de l'autre sexe; mais une soule d'autres causes contribuent encore à rendre la durée de la vie des hommes moindre que celle des femmes.

Celles-ci transpirent très-peu, & la diminution, la suppression de la transpiration étant une des causes les plus sécondes des maladies dangereuses ou mortelles, les semelles doivent nécessairement éprouver plus rarement ces sortes de maladies, & conséquemment courir moins souvent risque de perdre la vie.

Il est d'ailleurs un genre particulier de maladies, dont le danger est proportionné au peu de souplesse & de mollesse des sibres, ce sont les inflammatoires: les semmes y sont non-seulement moins exposées que les hommes, mais la facilité qu'ont leurs fibres de se prêter à l'expansion, favorise encore la résolution des engorgemens inflammatoires, tandis que la fermeté, l'excès de solidité de celles des hommes rendent cette résolution difficile.

Si l'on confidere ensuite que les occupations des hommes multiplient autour d'eux les causes de mort, que les excès auxquels ils se livrent dans tous les genres, ajoutent encore à la somme des dangers qui les environnent; que les femmes au contraire, renfermées pour la plupart dans leurs maisons, sont appliquées à des ouvrages qui exigent peu de force, & qui ne fatiguent ni le corps, ni l'esprit; que les semmes n'ont que bien rarement des excès de table à se reprocher; on ne peut s'empêcher de reconnoître que leur plus grande longævité dépend, non seulement de leur constitution particuliere, mais encore de l'avantage des circonstances dans lesquelles elles se trouvent, & de la qualité de leurs mœurs.

Pour se convaincre de la justesse de ces réslexions, il ne saut que jeter un coup d'œil sur les dissérentes classes de la société. Comme les hommes compris dans les dernieres, sont plus exposés que ceux des autres, aux excès d'intempérance, & aux travaux périlleux, on voit dans ces classes de Citoyens, beaucoup plus de semmes âgées que d'hommes, tandis que le nombre en est au moins égal dans les autres. Cette vérité pourroit être rigoureu-M iv

sement démontrée par un travail que le temps & mes occupations ne me permettent pas d'entreprendre, mais dont je vais donner une idée, pour mettre sur la voie ceux qui auroient le vouloir & la facilité de s'y livrer.

Il faudroit, après avoir divisé les Citoyens en cinq classes, plus ou moins, suivant la maniere de les envisager, distribuer les morts en autant de classes, &, selon toute apparence, on y trouveroit la preuve de ce que j'avance. On y verroit que si la nécessité impérieuse force la plupart des hommes à compromettre leur vie par des travaux dangereux, il en est beaucoup qui, par leurs excès, abrégent la durée de leur vie. Il est possible que cette vérité, présentée avec tout le développement dont elle est susceptible, ouvre les yeux de quelques Particuliers sur les dangers auxquels ils s'exposent volontairement; leur salut seroit une récompense bien satisfaisante des peines que l'on auroit prises.

Je terminerai cet essai par un calcul des probabilités de la vie pour les individus de l'un & de l'autre sexe. Un des plus célèbres de nos Philosophes, M. le Comte de Busson, a desiré qu'on multipliat ces sortes de calculs. C'est pour entrer dans ses vues, que je me suis occupé de cet objet. Les résultats peuvent d'ailleurs avoir un certain degré d'utilité, par l'usage qu'on en peut saire, pour évaluer le denier auquel on peut porter les rentes

٠.

## DE DIJON, 1783. 185 viageres sur les individus de l'un & de l'autre

sexe.

C'est d'après les détails du premier Tableau, & sur les principes de M. de Parcieux, que j'ai fait mes calculs. Ils seroient plus concluans & d'un plus grand usage, si les morts eussent été distribués par année, au lieu de l'être par lustre; mais je pense que malgré ce désaut, ils peuvent être de quelqu'utilité.

Il n'est pas nécessaire de répéter ce qu'ont dit tous les Savans qui se sont occupés du même objet, de dire que tous les individus vivans, à l'âge désigné, ne vivront pas nécessairement jusqu'à celui qu'on indique, & qu'on peut seulement parier un contre un qu'ils y arriveront.

	86 ACADÉMIE								
	Ages.	Vie moyenne des mâles.			Vie moyenne des femelles.				
	~	Ann.	Mois.	Jours.	Ann.	Mois.	Jours.		
	Naissance.	25	9		34	4	12		
	à 5 ans.	46	10	26	54	6	22		
	10	44	10	18	51	7	21	I	
	15	41	5	8	47	4	24		
	20	38	O	15	43	4	22		
	25	34	11	6	39	5	1		
	30	31	4	4	35	8	9		
Ž,	3 35	27	7	12	32	0	15	ថ្ក	
Ì	40	24	0	2	28	1	18	F	
	45	21	8	18	24	10	29		
	50	17	7	22	20	8	26		
	55	14	9	12	17	10	4	Ĭ	
	60	11	8	4	14	I	26	H	
	65	9	5	16	11	₹3	26	Į	
	70	7	0	8	8	<b>52</b>	14		
	75	5	5	10	5	9	15	l	
	80	3	8	3	3	9	24	Ĭ	
	85	3	4	29	3	10	27		
ķ	90	0	0	0	0	О	0	ş	
3									

## **OBSERVATION**

SUR l'Acéte de Bismuth, & la propriété de l'acide acéteux, d'empêcher la précipitation du nitre de Bismuth par l'eau pure.

#### PAR M. DE MORVEAU.

M. MONNET ayant observé que le vinaigre n'attaquoit ni le régule, ni la chaux de bismuth, j'ai essayé de faire réussir cette combinaison par double affinité, & j'ai obtenu de cette maniere, avec la plus grande facilité, un sel brillant talqueux, de couleur argentine, & qui n'a pas attiré l'humidité de l'air depuis un mois & plus que je le tiens exposé à l'air libre, dans la capsule même que je mets sous les yeux de l'Académie.

La Gazette salutaire de cette année, no. 6, nous ayant sait connoître, depuis quelques jours, un procédé absolument semblable pour la formation des sels acéteux, & singuliérement du sel acéteux de bismuth, par une notice d'un Mémoire de M. J. Scote, Chymiste d'Edimbourg, je me garderois bien de revenir sur cet objet, & d'en entretenir l'Académie, si les circonstances accessoires de mes expériences ne présentoient des saits peut-être

plus intéressans que la combinaison que M. Scote a produite avant moi, & qu'il n'a ni apperçus, ni expliqués; ce qui me détermine à rendre compte de la maniere dont j'ai opéré, & des phénomenes qui en ont résultés.

Ayant mêlé de la dissolution d'acéte de potasse, ou terre soliée (1), à la dissolution de nitre de bismuth, il y a eu d'abord un caillé blanc très-sensible, & ce caillé s'est redissous pour la plus grande partie: l'assuson de l'eau y a néanmoins occasionné un pré-

cipité très-abondant.

Je filtrai alors la liqueur, elle passa trèslimpide: je la mis évaporer an bain de sable; mais à peine la capsule ent-elle senti la chaleur, que la liqueur devint laiteuse; je la laissai cependant sur le seu, & je ne sus pas peu surpris de voir un instant après, que cette même liqueur s'étoit complétement éclaircie, & recouverte de petites lames salines brillantes talqueuses, comme le sel sédatif, & même un peu argentines. Plusieurs de ces crystaux s'étoient déjà précipités & rassemblés au fond de la capsule.

Lorsque tout le sel se sur réuni au sond, & qu'il cessa de s'en sormer de nouveau par les progrès de l'évaporation, je retirai la

<sup>(1)</sup> La notice des expériences de M. Scote, porate, tartre régénéré; mais on voir que c'est par erreur, & qu'il veut dire un sel sormé de l'acide du vinzigre, & de l'alkali fixe végétal.

189

capsule, & je l'inclinai pour faire écouler

la liqueur.

Jai produit la même combinaison par le mêlange de l'acéte calcaire & du nitre de bismuth; il y eut de même précipité blanc, & il disparut en entier par la seule agitation; mais ayant ajouté de la dissolution du premier, le précipité cette sois ne put être complétement repris. J'y ajoutai alors de l'eau, pour voir si elle troubleroit encore la liqueur; elle

devint en effet laiteuse épaisse.

La liqueur filtrée passa limpide, & fut encore blanchie par l'eau pure; j'imaginai en ce moment d'y verser du vinaigre distillé. c'est-à-dire, non concentré: quel sut mon -étonnement lorique je remarquai, non-seulement que la liqueur étoit redevenue limpide, mais même qu'elle avoit perdu la faculté d'être décomposée par l'eau pure! Que l'acide du vinaigre, quoique délayé, ait pu prendre. sans digestion au feu & sur le champ, la chaux de bismuth qui s'étoit précipitée; qu'il eût formé avec cette terre métallique, un sel non sujet à se décomposer par l'eau, ces faits ne contrarioient que les idées que j'avois prises de l'indissolubilité du bismuth, d'après les expériences des Chymistes: mais que le vinaigre eût fait perdre au nitre de bismuth gestant, la propriété de laisser aller sa base quand on le délaie, c'étoit un phénomene d'autant plus important, qu'on ne pouvoit imaginer que l'acide acéteux eût repris la serre métallique à l'acide nitreux.

Je m'attachai donc d'abord à confirmer ce phénomene, & l'expérience suivante ne laisse aucun doute. J'ai versé du vinaigre distillé simple, non concentré, & même très-soible, dans la dissolution nitreuse de bismuth; le précipité a paru, il a été repris sur le champ, & l'eau ajoutée, à quelque dose que ce sût,

n'a pas précipité le mêlange.

Ainsi, il est constant que le vinaigre ôte au nitre de bismuth, la propriété de se laisser décomposer par l'eau : cela viendroit-il de ce que l'acide nitreux se porte sur le phlogistique du vinaigre, & se trouve par-la tellement affoibli, que le vinaigre seul lui enleve sa base, ou du moins partie de sa base, par une sorte de double affinité? Cette explication, que je propose par sorme de conjecture, me paroit mériter attention.



## MÉMOIRE

Sur la sommation des suites dont les termes sont des puissances semblables de sinus ou de cosinus d'arcs qui forment une progression arithmétique.

Par M. L'ABBÉ BERTRAND, Professeur de Physique Expérimentale.

SOIT  $dx = \frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}$ , je transforme cette équation en celle-ci,  $-dx\sqrt{-1} = \frac{dy}{\sqrt{y^2-1}}$ , faisant ensuite  $\sqrt{y^2-1} = u + y$ , je trouve  $dy = -\frac{1}{2} du \left(\frac{u^2-1}{u^2}\right)$ , &  $dx\sqrt{-1} = \frac{du}{u}$ . L'intégrale complette de cette derniere équation est  $x\sqrt{-1} = \log C + \log (-y + \sqrt{y^2-1})$ ,  $= \log \left(\frac{-y + \sqrt{y^2-1}}{\sqrt{-1}}\right)$ ; d'où l'on tire, en appellant e le nombre dont le logarithme hyperbolique est  $1, y = \sin x = \frac{x\sqrt{-1} - x\sqrt{-1}}{2\sqrt{-1}}$ . L'équation  $dx = -\frac{dy}{\sqrt{1-y^2}}$  donneroit, en

fuivant le même procédé, cos.  $z = \frac{z}{c} + c$ 

mais il est plus simple d'obtenir cette valeur, en substituant dans  $\sqrt{1-\sin^2 x}$  l'expression de fin x déjà trouvée.

Cela posé, je vais donner une méthode simple & directe pour sommer une suite quelconque, dont les termes sont des puissances semblables de sinus ou cosinus d'arcs qui forment une progression arithmétique.

## PROBL. I.

Trouver la somme de la serie  $S = fin \ a + fin (a+b) + fin (a+2b) + fin (a+3b)$   $\cdot \cdot \cdot \cdot + fin (a+(n-1)b).$ 

Solut. Je change l'expression de la série proposée en celle-ci,  $S = \frac{1}{2^{n-1}} \binom{a^{n-1}}{e} + \binom{a+b}{-1} \binom{a+(n-1)b}{-1} \binom{a+(n-1)b}{-1} \binom{a+(n-1)b}{-1}$ , & je remarque aussi-tôt que les exponentielles positives se succédent en progression géométrique, aussi bien que les négatives.

La somme de la premiere progression est  $(a+nb)^{-1}$   $(a)^{-1}$ ; celle de la seconde est

DEDIJON, 1783.

193

- (a+nb) V-1 - aV-1

e - e On a donc . . . .

$$S = \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} (a+nb) & V-1 & a & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} (a+nb) & V-1 & a & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} aV-1 & -(a+nb) & V-1 & -(a-b) & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} aV-1 & -aV-1 & (a-b) & V-1 & -(a-b) & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} aV-1 & -aV-1 & (a-b) & V-1 & -(a-b) & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+(n-1)b & V-1 & +(a+(n-1)b) & V-1 \\ e & & & -e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a+nb) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{2V-1} \begin{pmatrix} a+nb & V-1 & -(a-b) & V-1 \\ e & & & +e \end{pmatrix}$$

Si l'on fait dans cette formule  $n = 5400 \, \&$  a = b = 1', on trouvera que la fomme de tous les finus des tables =  $\frac{1}{2} \left( \frac{fin \ 3c'' + cof \ 3c''}{fin \ 3c''} \right)$ =  $\frac{1}{2} \left( 1 + cot \ 3c'' \right) = 3438$ , 2467465438.

#### PROBL. II.

Sommer la fuite cof. a + cof(a+b) + cof(a+2b) ... + cof(a+(n-1)b)?Solut. Soit \$' la fomme cherchée, on aura  $S' = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a \sqrt{-1} & (a+b) \sqrt{-1} & (a+(n-1)b) \sqrt{-1} \\ e & + e & ... + e \end{pmatrix}$   $-a \sqrt{-1} - (a+b) \sqrt{-1} - (a+(n-1)b) \sqrt{-1}$   $\cdots + e & + e & ... + e$   $= \frac{1}{2} \begin{bmatrix} a \sqrt{-1} - a \sqrt{-1} & ((a-b) \sqrt{-1} - (a-b) \sqrt{-1} \\ e & + e & - e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $- \begin{pmatrix} (a+(n-1)b) \sqrt{-1} & - (a+(n-1)b) \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $- \begin{pmatrix} (a+nb) \sqrt{-1} & - (a+nb) \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$   $2 \begin{bmatrix} 1 - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} b \sqrt{-1} - b \sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$ 

D B D I J O N, 1783. 199
$$= \int \ln \left(a + nb - \frac{\pi}{2}b\right) - \int \ln \left(a - \frac{1}{2}b\right)$$

$$= \int \ln \frac{\pi}{2} \ln b \, cof\left(a + \frac{1}{2}\left(n-1\right)b\right).$$

$$\int \ln \frac{\pi}{2} b.$$

#### PROBL. III.

Quelle est la somme de la serie  $S = fix^2a$ +  $fin^2$  (a + b) ... +  $fin^2$  (a + (n-1)b)? Solue, puisque  $fin^2 x = \frac{1}{a} - \frac{1}{4} {2x\sqrt{-1} - 2x\sqrt{-1} \choose e}$ il est clair que l'on aura  $S = \frac{n}{2} - \frac{1}{4} {2a\sqrt{-1} \choose e}$   $(2a + 2b)\sqrt{-1}$   $(2a + 2(n-1)b)\sqrt{-1}$ + e ... + e-  $2a\sqrt{-1} - (2a + 2b)\sqrt{-1} - (2a + (n-1)b)\sqrt{-1}$ + e + e ... + e=  $\frac{n}{2} - \frac{1}{2} \frac{fin \ nb \ cof(2a + (n-1)b)}{fin \ b}$ =  $n \ fin \ b - fin \ nb \ cof(2a + (n-1)b)$ .

#### PROBL IV.

Trouver la fomme de la fuite  $S' = cof^2 a$ +  $cof^2 (a+b) \dots + cof^2 (a+(n-1)b)$ . Sotut.  $S = \frac{n}{2} + \frac{1}{4} {2a \sqrt{-1} (2a+2b) \sqrt{-1} + 6}$  $(2a+2(n-1)b) \sqrt{-1} - 2a \sqrt{-1}$  196 A C A D É M I R  $-(2a+2b)\sqrt{-1} - (2a+2(n-1)b)\sqrt{-1} + e \cdots + e$   $= n \int_{a}^{b} \int_{b}^{b} \int_{a}^{b} \int_{$ 

### PROBL. V.

#### PROBL. VI.

Quelle est la somme de la suite  $S' = cof^3$   $a + cof^3 (a + b) \cdot \cdot \cdot + cof^3 (a + (n-1)b)$ ? Solut.  $S' = \frac{1}{4} \left( \frac{3 \int_0^{1} \frac{1}{2} n b cof (a + \frac{1}{2} (n-1)b)}{\int_0^{1} \frac{1}{2} b} \right)$  $+ \int_0^{1} \frac{3}{2} n b cof (3 a + \frac{3}{2} (n-1)b)$ .

#### PROBL. VII.

Sommer la férie  $S = \int \ln a \cos a + \int \ln (a+b) \cos (a+b) \dots + \int \ln (a+(n-1)b) \cos (a+(n-1)b),$ Solut. Je change l'expression de la férie proposée en celle-ci,  $S = \frac{1}{4\sqrt{-1}} \begin{pmatrix} 2 & a & \sqrt{-1} \\ e & & & \\ & & & \\ & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & & & & \\ & &$ 

#### PROBL. VIII.

Solut. 
$$S = \frac{n}{8} - \frac{1}{16} \begin{pmatrix} 4a\sqrt{1-} & (4a+4b)\sqrt{-1} \\ e & + e \end{pmatrix}$$

$$(4a+4(a-1)b)\sqrt{-1} - 4a\sqrt{-1} - (4a+4b)\sqrt{-1} + e + e + e$$

$$- (4a+4(n-1)b)\sqrt{-1} + e$$

$$= \frac{1}{8} \begin{pmatrix} n & fin & 2b - fin & 2nb & cof(4a+2(n-1)b) \\ fin & 2b & b \end{pmatrix}.$$

#### PROBL. IX.

Sommer la fuite  $S = \int in^3 a \cos^3 a + \int in^5 (a+b) \cos^3 (a+b) \dots + \int in^3 (a+(n-1)b)$  $\int in^3 (a+(n-1)b) \cdot in^3 \cdot (a+(n-1)b) \cdot$ 

Solution. Puisque l'on a fin  $3 \times cos^3 \times \frac{1}{64\sqrt{-1}} \left( \frac{2 \times \sqrt{-1}}{3 \varepsilon} - \frac{2 \times \sqrt{-1}}{3 \varepsilon} - \frac{6 \times \sqrt{-1}}{2 \varepsilon} \right)$ 

$$-\frac{1}{64\sqrt{-1}}\left(\begin{matrix} 6x\sqrt{-1} & -6x\sqrt{-1} \\ e & -e \end{matrix}\right); l'expression$$

de la férie précédente se changera en celle-ci:

$$S = \frac{3}{64\sqrt{-1}} \left( \frac{2a\sqrt{-1}}{e} + \frac{(2a+2b)\sqrt{-1}}{e} \right)$$

$$(2a+2(n-1)b)\sqrt{-1}$$
  $-2a\sqrt{-1}$   $-(2a+2b)\sqrt{-1}$   
+  $e$  ... -  $e$  -  $e$ 

$$\frac{-(2a+2(n-1)b)\sqrt{-1}}{-64\sqrt{-1}}\left(\frac{6a\sqrt{-1}}{64\sqrt{-1}}\right)$$

$$(6a+6b)\sqrt{-1}(6a+6(n-1)b)\sqrt{-1}-6a\sqrt{-1}$$

DE DIJON, 1783: 199
$$= (6a+6b)\sqrt{-1} - (6a+6(n-1)b)\sqrt{-1}$$

$$= \frac{3}{3^2} \left( \frac{fin \ nb \ fin \ (2a+(n-1)b)}{fin \ b} \right)$$

$$= \frac{1}{3^2} \left( \frac{fin \ 3 \ nb \ fin \ (6a+3(n-1)b)}{fin \ 3b} \right)$$

$$= \frac{1}{3^2} \left( \frac{3 \ fin \ nb \ fin \ (2a+(n-1)b)}{fin \ b} \right)$$

$$= \frac{fin \ 3 \ nb \ fin \ (6a+3(n-1)b)}{fin \ 3b}$$

#### PROBL. X.



200 A C A D É M I E
$$= \frac{1}{4} \left( \frac{\int \ln \frac{1}{2} nb \cos \left( a + \frac{1}{2} (n-1) b \right)}{\int \ln \frac{1}{2} b} ... \right)$$

$$- \int \ln \frac{1}{2} nb \cos \left( 3 a + \frac{3}{2} (n-1) b \right)$$

$$\int \ln \frac{1}{2} b.$$
PROBL. XI.

• Sommer la fuite  $S = \int \ln a \cos^2 a + \int \ln (a+b) \cos^2 (a+b) \cdot \cdot \cdot \cdot + \int \ln (a+(n-1)b) \cos (a+(n-1)b)$ .

 $+\frac{\int \ln \frac{3}{a} \, n \, b \, \int \ln \left(3 \, a + \frac{3}{a} \, (n-1) \, b\right)}{\int \ln \frac{3}{a} \, b}.$ PROBL

# DE DIJON, 1783. 201. PROBL. XII.

#### PROBL. XIII.

Sommer la série 
$$S = fin \ a \ cos^3 \ a + fin \ (a+b)$$
 $cos^3 \ (a+b) \cdot \cdot \cdot \cdot + fin \ (a+(n-1)b)$ 
 $cos^3 \ (a+(n-1)b)$ .

Solue. Puisque  $fin \ x \ cos^3 \ x = \frac{1}{8\sqrt{-1}} \binom{2 \ x \sqrt{-1}}{e}$ 
 $-2 \ x \sqrt{-1}$ 
 $+ \frac{1}{16\sqrt{-1}} \binom{4 \ x \sqrt{-1}}{e} - 4 \ x \sqrt{-1}$ 

il s'ensuit que  $\cdot \cdot = e$ 
 $(2 \ a + 2 \ b) \sqrt{-1} \ (2 \ a + 2 \ (n-1)b) \sqrt{-1} - 2 \ a \sqrt{-1}$ 
 $+ e \cdot \cdot \cdot \cdot + e \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot - e$ 
 $-(2 \ a + 2 \ b) \sqrt{-1} \ (2 \ a + 2 \ (n-1)b) \sqrt{-1}$ 
 $- e \cdot \cdot \cdot \cdot - e$ 
 $+ \frac{1}{16\sqrt{-1}} \binom{4 \ a \sqrt{-1}}{e} + 2 \binom{4 \ a + 4 \ b) \sqrt{-1}}{e}$ 
 $+ e \cdot \cdot \cdot \cdot - e$ 
 $-(4 \ a + 4 \ (n-1)b) \sqrt{-1} - 4 \ a \sqrt{-1} - (4 \ a + 4 \ b) \sqrt{-1}$ 
 $- e \cdot \cdot \cdot - e$ 
 $- \binom{4 \ a + 4 \ (n-1)b}{sin \ b} \sqrt{-1}$ 
 $- e \cdot \cdot \cdot \cdot - e$ 
 $- \binom{4 \ a + 4 \ (n-1)b}{sin \ b} \sqrt{-1}$ 
 $- \binom{6 \ n \ 2 \ n \ b}{sin \ 2 \ b} (3 \ a + 2 \ (n-1)b)$ 
 $+ \binom{6 \ n \ 2 \ n \ b}{sin \ 2 \ b} (3 \ a + 2 \ (n-1)b)$ 
 $+ \binom{6 \ n \ 2 \ n \ b}{sin \ 2 \ b} (3 \ a + 2 \ (n-1)b)$ 
 $+ \binom{6 \ n \ 2 \ n \ b}{sin \ 2 \ b} (3 \ a + 2 \ (n-1)b)$ 

Les puissances supérieures des sinus & des cosinus se sommeront de la même manière: mais on s'épargnera la monotonie de ce calcul, en généralifant la folution des problèmes précédens.

#### REMARQUE I.

On peut faire dépendre la fommation des cosinus de celle des sinus; il suffit pour cela de se rappeller que  $cos = sin(90^\circ-a)$ . Soit donc proposé de sommer la série, cos = a + cos.  $(a+b) \cdot \cdot \cdot \cdot + cos (a+(n-1)b)$ ; on transformera cette série en la suivante, sen  $(90^\circ-a) + sin(90^\circ-(a+b)) \cdot \cdot \cdot \cdot \cdot + sin(90^\circ-(a+(n-1)b))$ ; substituant ensuite dans la somme des sinus,  $90^\circ-a$ , à la place de a & -b à la place de b, on aura

$$S' = \frac{- \int \ln \frac{1}{2} nb \int \ln \left( 90^{\circ} - \left( a + \frac{1}{2} (n-1) b \right) - \int \ln \frac{1}{2} b.$$

$$= \frac{\int \ln \frac{1}{2} \, n \, b \, \cos \left( \, a + \frac{1}{2} \, \left( \, n - 1 \, \right) \, b \, \right)}{\int \ln \frac{1}{2} \, b}; \text{ comme}$$

nous l'avons trouvé, &c. &c.

#### REMARQUE II.

$$S = \frac{\int \ln \frac{1}{a} n b \int \ln \left(a + \frac{1}{a} (n-1) b\right)}{\int \ln \frac{1}{a} b} = 0$$

. Il est clair cependant que n fin a est, dans ce

204

cas, la valeur de S. Pour trouver cette valeur, on différenciera séparément le numérateur & le dénominateur de la fraction  $\sin \frac{1}{2} nb cos (a + \frac{1}{2} (n-1) b)$ 

 $\frac{\sin \frac{1}{2} n b \cos (a + \frac{1}{2} (n-1) b)}{\sin \frac{1}{2} b}$ , en regar-

dant a comme constant; & cette fraction deviendra  $\frac{\frac{1}{2} n db cof \frac{1}{2} nb fin (a + \frac{1}{2} (s-t) b)}{\frac{1}{2} db cof \frac{1}{2} b}$ 

 $\frac{+\frac{1}{6}(n-1) \ db \ cof(a+(n-1)b) \ fin\frac{1}{2} \ nb.}{\frac{1}{6} \ db \ cof\frac{1}{2}b.}$ 

qui, en faisant b = 0, se réduit à n sin a, comme cela doit être.

Mrs. Euler & l'Abbé Bossue ont traité la matiere que je viens d'analyser. Mais la méthode du premier dépend d'une théorie étrangère; & celle du second, sondée sur des décompositions purement trigonométriques, n'a pas toute l'élégance qu'on pourroit desirer; c'est au Lecteur à comparer & à juger.

## HISTOIRE

MÉTÉOROLOGIQUE

DE 1783.

PAR M. MARET.

E plan sur lequel j'ai donné l'histoire de 1782, n'ayant pas été désapprouvé, je crois devoir le suivre encore pour celle de cette année. Elle sera donc composée du même

#### DE DIJON, 1783.

105

nombre de tableaux, & d'une récapitulation pour chaque mois, & terminée par des résumés destinés, en rapprochant les objets, à faire saisir avec précision le caractere des saisons & de l'année entiere.

Les vents, les différens états du ciel, les différens météores y seront indiqués par les mêmes signes tracés dans le préambule de l'histoire de 1782, & qu'il me paroît inutile de retracer ici. Mais, l'Imprimeur s'étant procuré des caracteres différens pour défigner les différens degrés de force des vents, les différens états du ciel, la différente intensité de la pluie ou de la neige, il me semble nécessaire d'annoncer que

Le figne + placé devant les caracteres désignans les nuages, le brouillard, la pluie, la neige, indiquera que le premier de ces météores aura été confidérable; le second épais, les troisieme & quatrieme abondans.

Le figne — voudra dire que les nuages sont en petit nombre le brouillard peu épais, la pluie légere, la neige peu abondante.

Le x placé après le signe du vent, dira qu'il étoit vif. Le 🗶 qu'il étoit très-vif. Le

💥 qu'il étoit impétueux.

Comme j'ai noté sur mon registre la rosée, je la désigne dans les tableaux par la lettre R. On y trouvera encore la lettre v pour exprimer l'état vaporeux de l'air.

Souvent il a plu la nuit, & souvent la pluie a continué la matinée : dans le premier cas, après les lettres pl. je mets un n; & dans le second, j'ajoute encore un m.

OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. JANVIER.									
THERMOMETRE.	BAROMETRE.  MATIN. MIDI. SOIR.								
m. dég. 1. dég. 1. deg. 1.  1 0 1. 3 0  2 -1. 9 -0. 3 -1. 9  3 -3. 6 -1. 6 -1. 3  4 -0. 3 9 1  5 2 3 3. 9  7. 6 6. 6 5 3  9 5. 9 6. 9 5. 6  7 5. 6 6. 6 5 3  9 5. 9 6. 9 5. 6  10 5. 6 6. 6 5  11 7 7 6 6. 6  12 4. 6 7 7 6  13 6 4. 6 8  15 7. 9 6 6. 6  11 7 7 6 6. 6  12 1. 6 3 1  14 5 4. 6  15 7. 9 6 6  16 5. 6 3 6  17 3 4. 3 1. 6  18 1. 6 3 1  19 1 2 1. 6  20 6 2 2  21 2. 6 3. 6 2. 6  22 3 6 2. 6  23 -0. 6 2. 3  24 2. 6 3. 6 2. 6  27 1. 3 3. 6 3. 9  28 4 6 5 6  30 3 6 6  30 3 6 6  30 3 7 6 6  30 6 7 6  30 6 7 6  30 6 7 6  30 7 7 6  30 8 6  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9  30 9	po. l. \( \frac{1}{4} \) po. l. \( \frac{1}{4}								

_	J	ANVIER.	
jo. Iu m.	MATIN.	MIDI.	Soir.
2	Nx, fe. gg.	NO, -nu. gg. N×, fe. gg.	N×,-nu. gg. N, fe. gg.
6		E, nu. gg. E, co. dé. nf. S, co. bm. S, co. a. pl.	E, co. gg. ESEX, co. nf. S, co. pl. S, co. Bpl. v.
8	NX, co. bm.	NX, co. B. pl. S, co. bm. OSO X, nu. SX, copl.	N, nu. SSO X, co. bm. OSO X,-nu,-au. S X, co.
11	S, copl. S, nu. S×, copl.	SO, co. S, -nu. OX, nupl.	SSE, fe. SX, +nu.
15 16 17	SOX, co. pl.	\$\times, co. + pl. \$0\times, no. pl. \$0\times,+no.+pl. \$0\times,copl.	SO x, co. +pl. SO x, +nu. SO x, +nu. SO, nu.
119	SOX, to. np. SOX, to. np. SOX, nu. gg. SX, nu. B. gg.	SOX, +nu. SOX, co. S, co. nei. E, co. gg.	\$ \times , +nu, \$ \times , co. \$ \times , co. \$ \times , co. pl.
L.	OSO x, co. nf. pln. OSO, -nu. gg. Sx, co. gg. nei. Sx, nu. pln.	Ox, co. pl. O, co. S, co. plnei.	S, fe. gg. S, copl.
20	S, nu. S, co. B. S, co. pln. S, +nu. pl.	S, fe. OSO, nu. S, co. pl. SOX, nupl.	S, fe. ONO, fe. S, co. O, fe.
100.0	S, -nuB. 1 S, nu.	S‰, co. +pl. S, nu. S‰, co. pl.	Sx, co. S, +nu. S, -nu. +pl.

#### RECAPITULATION.

L'air a eu fréquemment très-peu de pefanteur & d'élasticité; & en général ces qualités n'ont pas passé le terme moyen.

Le mercure dans le barometre est souvent descendu au dessous de 27 pouces, mais de peu de lignes, & s'est rarement élevé au dessus de 27 pouces 4 lignes.

Sa plus grande élévation a été

de 27 p. 8 l. le 2.

La moindre de 26 p. 81. 3 14e. le 15.

Le balancement de . . . . . 11 l. 9<sup>12</sup>e.

L'élévation moyenne, dans tout le cours

du mois, de 27 p. 2 l. 11126.

Les vents du S & de l'O ont regné pendant tout le cours du mois, excepté dans les quatre premiers jours & dans le septième.

Ils ont presqué toujours soufslé avec vivacité, & très-souvent avec impétuosité.

Il n'y a eu que deux jours entiérement beaux; & à l'exception de la valeur de quatre jours, le ciel a été pendant tout le reste du mois nuageux ou couvert.

Il y a eu la valeur de dix jours de pluie & de plus de trois de neige, qui cependant n'ont donné qu'environ deux lignes. L'eau de la neige & de la pluie est montée dans l'eudiometre de 3 p. 2 l. 10<sup>12e</sup>.

Les hygrometres n'ont cependant montré

qu'une humidité moyenne.



#### DE DIJON, 1783.

209

Les rivieres ont été toujours très-pleines; & du 14 au 20, il y a eu une inondation trèsforte.

La température a été très-froide dans les quatre premiers jours, & du 20 au 24: mais peu froide dans le reste du mois; & celle du mois entier, prise collectivement, a été: + 4. 10: + 10. La plus grande élévation du mercure dans le thermometre a été.... de + 8 degrés.

La moindre de - 3. 6.

Ce qui donne + 4. 6. de différence de dilatation. Il y a eu trois jours entiers, cinq matinées, deux après-midi & une soirée de gelée à glace.

Il y a eu une foible aurore boréale le 9. La constitution du mois a été fraîche & un peu humide. La végétation qui s'étoit ranimée sur la fin de Décembre, & qui s'est ralentie dans les premiers jours du mois, a repris vigueur vers le milieu. Les bleds & les navettes étoient d'un beau verd, les lilacs ont commencé à sleurir, & l'on a vu des violettes sur la fin du mois.

Les terres ameublies par la pluie & par la neige ont commencé à la même époque à être labourées.

La constitution maladive a été catharrale. Il y a eu quelques rhumes, quelques fausses pleurésies, quelques maux de gorge, mais en général très-peu de malades.

#### OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. FÉVRIER. THERMOMETRE. BAROMETRE. SOIR. Midi. MATIN. MIDI. SOIR. deg. 12. deg. l. 12 deg. po. po. l. 12. 12 po. 6 6 6 9 8. 756 44.11.0.8 2. 4 3 3.4 7.8 6 5.6 5.5.3 4 . 5.6. I 66 335866 797666 5332134486 5.22 6866.432.8.9.43323676566552426.3 7766.44...10.8 11 5. 3 32 4 7 7.6. 56 5. 5 4 3. 3 3.6. 2 9 3.2. 3.6 5.6. 5 5.6 5.5.3.2. .. 00 . 1 3 48 3 1 0 .. 42 .0 46. 3 4 4 5 4 5 5 3 2 2 0 1 1 0 0 4 5 7 2 0 2 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 6 3 6 6 27. 3 26. 9 3 9 27. 6 9 6 3 6 6 9 3 666 36 3935 6 6 9 366399 3 9 3 9 3 6 3 6 3 3 9 6 6 6 9 3 9 6 6 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 6 6 9 3 3 9 6 3 93 6 6

1			
lu"	MATIN.	MIDI.	SOIR,
-			
1 2	5×, nupln. O, -nugg.	ONO, nu. S, nu.	ONO, fe. S, fe.
3	N× , -B. gg.	NX, fe. de.	Nx, fe.
41	S, nu. gg. B.	S, copl.	SOX, co. +p
5	SX, co. pl.	S, copl. O, +nupl.	S, copl. SO, nu.
_	$S \times$ , co. pl. $O$ , $+$ nu. $bm$ .	Sx, nu. pl.	S×, co.
8	SX, nu. or. T. n	. 5 × , -nu.	SX, +nu.
9	SO , co.	SSEX, co. pl.	$S \times$ , co. $+pl$ . $S \times$ , $+nu$ . $+pi$
13	5 × +nu.	SSEX, co.	$5\times$ , $+$ nu.
12	SX, nu.	3X, co.	SX, co. pl.
13	SO, co. plnm.	S, nu.	SX, co. pl.
15	S, co. br. NO X, -nugg	SSEX, nu.	SX, nu. NO X.copl.na
16	N X, cogg.	NX, -nu,	NO x, copl.ne N x, fe. gg.
17	NX, nu. +gg.	ITTIME SC, -nu.	NE X, ie. gg.
	Nx, fe. gg. Nx, +fe. gg.	NEX, fe. gg. NX, +fe.	NEX, +fe. g NX, +fe. gg.
10	NX, +fe. gg.	N×, -nu.	N, fegg.
21	O, co. Sx, co. bm.	O, co.	0, 00.
23	S×, copl.	SX, co. SO, x, co.	$S \times$ , co. pl. $SO \times$ , copl.
14	SOX, co. plnm.	OSOX, +nu.	Sx, fe.
25 26	O, nu.	1550 × , nu.	SSOX, co. nei
27	50×, fe. gg.	SO x, co. gg.	NO X, co. g
28	SX, co. nei. gg	SX, co. nei. pl.	Sx, co. pl.
29		1	

#### 212 ACADÉMIE

### RÉCAPITULATION.

La pesanteur & l'élassicité de l'air ont beaucoup varié dans le premier tiers du mois, & très-peu dans les deux derniers.

La plus grande élévation du mercure dans le barometre a été de 27 p. 8 l. les 1, 2 & 17; la moindre, de 26 p. 8 l. le 9.

de balancement.

L'élévation moyenne a été de 27. 3. 2. Les vents du S ont dominé dans le premier tiers du mois & dans le dernier. Ceux du N ont regné du 15 au 20 inclusivement.

Les hygrometres ont toujours marqué plus

de sécheresse que d'humidité.

Le ciel a plus souvent été ombragé de nuages & couvert, que serein. Il n'y a eu que cinq jours entiers de sereins, & en tout la valeur de huit jours.

Il a gelé à glace pendant sept jours entiers, deux fois fortement, & cinq fois le matin.

Il y a eu trois fois du brouillard; il a plu dix-fept fois, & il est tombé cinq fois de la neige, mais en peu d'abondance. La pluie & la neige ont donné I p. 7 l. 4<sup>36e</sup>.

Il s'est fait un orage avec tonnerre & forte

pluie, la nuit du 7 au 8.

La constitution a éte fraîche & humide dans le premier tiers du mois, froide & séche dans le second, froide & humide dans le troisieme.

#### DE DIJON, 1783.

218

La plus grande élévation du mercure dans le thermometre a été . . . . + 8. 6. le 23. La moindre . . . . . . . + 2. le 27.

La différence de dilatation +6. 6.

La température moyenne: +4. 11. :+10. La végétation a fait des progrès. Tous les arbres commençoient à pousser des boutons dès les premiers jours du mois, quelques abricotiers annonçoient leurs sleurs, heureusement que le froid qui a repris le 15, a tout arrêté.

Les rivieres ont toujours été très-pleines. La constitution maladive a été catharrale. On a observé toutes les maladies qui la caractérisem. Il y a eu, dans plusieurs villages de la montagne, des péripneumonies épidémiques putrides. Le nombre des malades a été peu considérable dans la Ville. On y a vu quelques sièvres rouges.

0	BSER	VATI(		ÉTÉORO R S.	)LOGIQ	UES.
T	HERM	MOME	TRE.	BAR	OME	TRE.
	MATIN.	MIDI.	Soir.	MATIN.	MIDI.	SOIR.
d, n	dég 1/2.	lég. 12.	deg:	po. 1. 1/4.	po. 1. ½.	po. l. 1/4.
1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28 25 26 27 28	3. 9 -1 2 1. 3. 5 -1 3. 5 -1 4. 6 -1 5. 6 -1 6. 6 -1 7. 7. 6 -1 7. 7. 6 -1 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7.	6. 6 9 6 3 3 6 6 6 6 6 7 7 6 2 2 4 4 4 5 6 7 7 8 9 0 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6 6 6 6 8 6	3 1. 3 6 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 8 5 4 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6	26. 11. 10. 3 8 27 3 26. 5. 3 7. 6. 6 27. 2. 3 26, 10. 6 7. 9. 3 10. 9 27. 1 3. 6. 6 4. 6 4. 6 4. 6 4. 6 4. 6 2. 3 26. 10. 6	10. 9 8 9 11. 9 27. 8. 9 26. 10 11. 3 27. 2 4. 6 7 8 7 4. 6 4. 9 4. 9 4. 9 4. 9 4. 9 4. 9 4. 9	26. 8. 6 27. 7 6 26. 8 6 27. 2 9 6 27. 2 9 6 27. 3 5 7 8 6 3 9 9 5 4 3 9 9 5 4 3

	VENTS ET ÉTAT DU CIEL. MARS.				
jo. Ju m.	MATIN.	Мірі.	SOIR.		
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16 27 28	O X, co. gg. S X, fe. gg. N, cogg. S, copl. S X, co. pln. SO X, co. pln. SO X, +nu. pl. S, +nu. bm. NO, -nu. S, co. B. plnm. NO X, co. pln. OSO X, co. +nein. SO, +nu. N, +nu. nei. N, co. N X, fe. gg. NNE, +fe. NNE, +fe. NNE, +fe. v. S X, -nu. S X, co. N, nupl. S X, nu. S O, co. pl. O, co. pl. N X, fe. gg.	OSO , co.+pl. SO , nu. +pl. SO , nu. NEX , +nu. pl. S , co. pl. O , co. pl. nei. O X , conei. SSE , co. NEX , fe. NNE , fe. NNE , fe. NEX , fe. SE X , fe. SE X , fe. SE X , +nu. E , +fe. SO X , +nu. E , +fe.	SOX, co.  S, co. +pl.  SEX, co. pl.  OSOX, co. nf.  N, co.  NEX, co.  NEX, co.  NEX, fe. éclipfe.  NNE X, fe.  NNE X, fe.  NNE X, fe.  SE, fe.  SE, fe.  SO, fe.  N, +fe.  SO, fe.  N, +fe.  SO, fe.  N, +fe.  SO, fe.  N, +fe.  SO, fe.  N, +fe.		

#### ACADÉMIE

#### RÉCAPITULATION.

216

La pesanteur & l'élassicité de l'air ont beaucoup varié, & souvent brusquement. Elles ont été en général peu considérables, surtout dans les premiers & les derniers jours du mois.

La plus grande élévation du mercure dans le barometre, a été le 18 de 27 p. 8 l.

La moindre le 27, de 26 p. 9 l. 9' e.

L'élévation moyenne du mois a été de 17 p. 1 l. 5<sup>126</sup>.

Les vents ont été peu constans, & ont presque aussi souvent soussilé du N que du S. Mais ceux du S & de l'O ont dominé dans le 1<sup>er</sup>. tiers du mois; ceux du N & de l'E dans le second. Le N & le S se sont, pour ainsi dire, partagés le troisseme. Ils ont été souvent viss, fréquemment très-viss, & plusieurs sois impétueux.

L'état du ciel a autant varié que les vents. Il y a eu six jours de suite où le ciel a été serein, six jours aussi de suite où il a été couvert. Le reste du mois le ciel a été presque alternativement serein, couvert ou nuageux.

Il a plu très-fréquemment, mais la pluie a été rarement abondante. Il y a eu 3 à 4 jours de neige, qui ont donné environ 3 lign. d'eau. La quantité d'eau fournie par la neige & par la pluie a été de 2 p. 7 l. 34<sup>16e</sup>.

On

On a essuyé un orage avec tonnerre & beaucoup de pluie, le 27. Il y a eu 3 jours de brouillards peu considérables. Quatre jours de gelée à glace dans les 1<sup>rs</sup>. & d<sup>rs</sup>. jours du mois; elle a été très-forte le 30. Il y a eu quelques matinées de légere gelée.

Les rivieres ont été toujours à pleins hords, & il y a eu une inondation considérable du

2 au 8.

Les hygrometres ont souvent marqué beaucoup da sécheresse, & quelquesois une humidité au dessous de la moyenne.

La plus grande élévation du mercure dans le thermometre a été le 24, . . de + 10. 6. La moindre, les 3 & 30, de . . . . . . 1.

Différence de dilatation . . . . + 9.6.

L'élévation moyenne de tout le mois a été de 4 d., & la température : + 4 : + 10.

La constitution du mois entier fraîche, &

plus séche qu'humide.

La végétation continue à se faire rapidement. Tous les abricotiers, & la plupart des pechers en espaliers, ont été en fleurs dès le 19. La gelée du 27 en a perdu la plus grande partie. Les semailles des mars ont commencé à se faire dès le 21. Mais la pluie, la neige & la gelée, les ralentissent sur la fin du mois.

La constitution catharrale a continué à être la dominante; elle se complique de la putride vermineuse. Les maladies catharrales ont regné dans tout le mois; il y a eu encore des siévres rouges, & la siévre tierce a commencé à paroitre vers le milieu du mois. Il y a eu quelques siévres malignes vermineuses. Le nombre des malades a été peu considérable.

OBSER	VATIO		ETÉORO	LOGIQ	UES.
THERN	10 M E	TRE.	BAR	OME	TRE.
jo. MATIN.	M 1 D 1.	SOIR.	MATIN.	M 1 D 1.	Soir.
m. deg. 12.	deg. 12.	deg. 12.	po. l. 12.	po. l. 12.	po. l. 12.
1 4 3 3 3 6 6 3 9 6 6 7 8 8 8 7 8 8 8 7 8 8 8 9 9 8 8 8 7 8 8 8 9 9 9 9	14. 6 10. 3 10. 10. 3 12. 6 12. 6 11. 3 10. 9 11. 3 10. 6 12. 14. 9 15. 10 7 8 8. 9 12 12. 9 13. 9 13. 9	10 6 6 8 9 10 10 6 6 10 10 10 6 6 9 9 10 10 6 6 6 9 9 10 10 6 6 6 9 3 6 6 6 9 3 6 6 7 9 6 7 9 6 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 1	78 98.8 8 76.6 3.3 5.6 5.7.7.7.6 5 3.6 3.9 3.6 3.9 3.6 3.9 3.6 3.9 3.6 3.9 3.9 3.0 3.9 3.0 3.9 3.0 3.9 3.0 3.9 3.0 3.9 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0 3.0	8 8 8 8 7 6 6 6 5 7 7 6 6 5 7 7 6 6 5 7 7 6 6 6 6	8 8. 3 3 3 9 6 3 9 6 3 9 6 5 5 6 5 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5 6

#### VENTS ET ÉTAT DU CIEL AVRIL. o. MATIN. SOIR. MIDI. ·lu m. O X, co. NE, +fe. NEX, +fe. NEX, +fe. NNE X, +fe. NOX, co. Ex, co. I N × , fe. N , fe. v. N × , fe. NNO × , fe. -v. NE ×, -nu. 2 NEX, se. 3 $E \times$ , +fe. 4 EX, +1e. NX, -nu. NX, -nu. N, +fe. SSE, +fe. S, fe. SOX, +nu. OSO, +nu. NX, fe. NX, +fe. <u>5</u> N × , fe. N× , +fe. N , +fe. E , fe. N×, +fe. N, +fe. *7* 8 S, +fe. S, fe. SEX, +fe. 9 N, se. v. 10 12 S X , co. 12 S , +nu. pla. 13 NNE , co. 14 NNE , c. S, nu. N, co. pl. N×, +se. N×, -nu. O, co. pl. NX, +fe. O, +nu. NNOX, +mu. NX, +fe. NEX, +fe. O, nu. 16 16 Ox, +nu. -pl. 17 Nx, fe. 18 NEx, +fe. 19 NNEx, +fe. 20 SSEx, v. $N \times$ , fe. NX, 1e. NX, +fe. NX, +fe. NX, +fe. SX, +nu. -pi. NOX, co. pi. EX, fe. NX, fe. NEx, +(e. O ×, co. SO ×, +nu. -pl. onox, +nu.gre.pl Ox, co. 21 OSOX,co.-nei.-pl. 22 Nx, co. $N \times$ , +nu. 23 SO, co. OSO, nu. gb. OX, co. ENE, -nu. $SO \times$ , fe. $N \times$ , fe. $NNE \times$ , +fe. OSO, nu. gb Nx, nu. 27 N, +fe. 28 N, fe. 29 ESEx, +fe. 30 Nx, +fe. 24 ENE X, fe. NE X, +fe. N X , +fe. E X , -nu. NE X , -nu. $N \times$ , fe. NE, +fe. S, -nu. N×, se.

### RECAPITULATION.

L'élasticité & la pesanteur de l'air ont été très-fortes dans les dix premiers jours, & du 14 au 20; toujours au dessus du terme moyen dans le reste du mois.

La plus grande élévation du mercure dans le barometre, a été le 3, de . . . 27 p. 9 L. La moindre, le 11, de . . . . 27 2.

L'élévation moyenne du mois entier a été de 27 p. 5 l. 7<sup>12</sup>.

Les vents du N & de l'E ont été les dominans dans tout le mois. Ils ont regné seuls dans les six premiers & les six derniers jours. Ceux du S & de l'O ont soufflé quelquesois du 8 au 25.

Tous ont été presque toujours viss, & ceux

du S & de l'O souvent très-viss.

Le ciel a presque toujours été serein ou peu chargé de nuages; il a été ombragé trois sois le matin par une légere vapeur.

Il n'est tombé qu'une fois de la neige, une fois du gresil, & neuf fois de la pluie, mais peu abondante. L'eau produite par la pluie & la neige, n'a donné dans l'eudiometre que 4 l. 19<sup>11e</sup>.

Il y a eu dans un village voisin, le 22, un orage avec tonnerre & grêle, qui a considérablement endommagé les vignes de cet endroit, & quelques-unes du finage de notre Ville,

La température a été presque toujours au

dessus de la moyenne, & souvent chaude. H n'y a eu qu'une seule sois de la gelée à blanc.

La plus grande élévation du mercure dans le thermometre, a été le 20 de . . + 15.

La moindre, les 6 & 23, de . . . + 4.

Différence de dilatation de . . . . + 11.

La température moyenne du mois : + 9.

Il y a eu une aurore boréale le 27 à dix heures du soir, mais blanchâtre, sans bandes flamboyantes.

La constitution a été tempérée & très-séche dans le commencement du mois, fraîche & un peu humide du 20 au 25; chaude & très-séche sur la fin.

La végétation a continué à être vigoureuse, & à se faire rapidement. Tous les arbres se sont couverts de fleurs & de feuilles dès les premiers jours du mois, & la plupart avoient passé fleurs le 27.

Les navettes sont entrées en fleurs dès le 9. La vigne a poussé ses bourjeons, les noyers leurs chatons, à la même époque.

La semaille des mars s'acheve dès les premiers jours, & les semences germent trèspromptement.

Les hirondelles font arrivées dés les premiers jours du mois. Les cailles aux environs du 22. Tous les oiseaux ont commencé à chanter vers le milieu du mois.

La constitution catharrale se soutient, la bilieuse s'y réunit. Il y a encore beaucoup de maladies catharrales. La sièvre rouge devient très-commune. Il y a beaucoup de sièvres éruptives & de sièvres tierces. Le nombre des malades est grand; il en meurt peu.

#### OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. MAI. THERMOMETRE. BAROMETRE. Midi. Soir. MIDI. Soir MATIN. !u deg. 12. 12 po. dég. 12 12. 12 1. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 25 29 31 1 6 12 27. 4. 2. 2. 2. 1. 2. 4. 4. 4. 4. 4. 2. 2. 2. 1. 26. 11. 27. . . 9. 9330 14. 9996696 421.2321.3442.34444431.21.2. 10. 8. 3 15. 10. 9 9 10 9 3 9 11 io. 11. 12. 14. 15. 10 12 3 12 6 3 6 10. 8 9 3 7 8. 6 9 3 9 3 9 3 11. 14 16. 15. 16. 19 17 13. 16. 19 16. 19 16. 19 16. 10. 13. 14. 13. 14. 13. 14. 12. 13. 14. 12. 9 9 6 3 9 3 9 9 3 9 3 6 9 939936 3 9 6 9 9 6 9 6 6 36 9 9 6 9 6 9 2 3 6 27 6 9 27. i. .. .. .. 3. 3 50000000 6 6 11 1. 2. 3. 6 9 .. 2. 2. 6 10 3 11 993 14. 6 9 3 10. 15 11. 14. ı. 11

	VENTS ET ÉTAT DU CIEL, MAI.					
jo. lu n.	MATIN.	MIDI.	Sorr,			
2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 12 13 14 25 16 16 17 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18	O, fe. O, -nu. O, +nu. pln. N × , +au, N × , nu. S × , + nu. E × , co. plnm. N × , co. pln. N × , co. pln. O, nu. R. O, -nu. R. N × , fe. R. O, +fe. R. SO , nupl. NNO , -n. R. N × , fe. R. O × , -nu. S × , co. O × , nu. N N , nu. S × , co. O × , nu. N , nu. S × , co. pln. N , nu. S × , co. pln. N , -nu. O × , -nu.	NE, -nu.  S, co. or. T. pl.  N, nu.  ENE, +nu,  Nx, nu. or. T. pl.  S, nu.  Nx, co. +pl.  NNOx, co. pl.  Nx, co.  ESEx, -nu.  E, +fe.  S, co. or. T. pl.  NNE, +nu.  Nx, fe.  NNEx, -nu.  SEx, co. T. pl.  Ox, +nu.  SEx, co. T. pl.  Ox, +nu.  SEx, -nu.  Sx, -nu.	N, fe. N, fe. N, fe. N, co. NE, +nu. S, co, NEX, -nu. NX, co. +pl. NNO, co. +pl. NX, fe. NEX, +fe, NX, fe. Ex, +fe. N, co. NO, +nu. +pl. NX, fe. NOX, co. OX, co. T. +pl. SOX, co. or. T. pl. SSEX, fe. OX, -nu. or. T. pl. SSEX, fe. OX, co. +pl. NOX, co. SX, fe. O, co. +pl. SX, fe. O, co. +pl. SX, fe.			

#### ACADÉMIE

124

### Ř E C A P İ T U L A T I O N.

La pesanteur & l'élasticité de l'air ont trèssouvent varié; ont été quelquesois très-soibles, & en général n'ont pas passé le terme moyen.

La plus grande élévation du mercure dans le barometre a été les 15 & 16, de

La moindre le 27, de . . 26. 11. 6

Balancement . . . . . . . . . . . 5. 3.

L'élévation moyenne du mois a été de 27 p. 2 l. 6<sup>12</sup>.

Les vents du N ont dominé pendant la premiere moitié du mois; ceux du S & de l'O pendant la seconde.

Tous ont été vifs, ceux du S & de l'O très-

fouvent impétueux.

Les hygrometres ont presque toujours dé-

figné une humidité moyenne.

Le ciel a été très-rarement serein, & prefque toujours nuageux ou couvert.

Il y a eu sept fois de la rosée.

Il est tombé très-souvent de la pluie, fréquemment très-abondante. Il y a eu 12 orages avec tonnerre & grande pluie : un d'entre eux a donné de la grêle.

Plusieurs villages dans la Province ont été dévastés par la grêle. Le tonnerie est tombé fréquemment, & a tué beaucoup de personnes. Notre Ville n'en a pas été francée.

Notre Ville n'en a pas été frappée.

L'eau de la pluie est montee dans l'eudiometre à 6 p. 21<sup>16c</sup>.

225

Il y a eu des inondations si fréquentes & d'une si grande durée, que les prairies basses & les vallons ont été presque toujours couverts d'eau.

La plus grande élevation da mercure dans le thermometre a été, les 17 & 22, de 19 d.

La moindre . . . . . . de 3 d. le 8.

La différence de dilatation . . de 16.

L'élévation moyenne du mois, de 12. 2'2e.

La constitution fraîche & humide dans le premier tiers du mois, a été chaude & humide pendant les deux autres tiers.

La température moyenne du mois a été

: + 12. 2<sup>12e</sup>.: + 10. La végétation a fait de grands progrès.

Les seigles sont entrés en fleurs aux environs du 11, & l'avoient passée le 23.

Les vignes ont commencé à fleurir sur la fin du mois. Les sureaux l'étoient dès le 26.

On a mis en vente dès le milieu du mois, des fraises, des cerises & des petits pois.

La constitution catharrale a regné encore, mais la bilieuse putride est devenue la dominante.

On a vu quelques fluxions de poitrine, quelques fiévres catharrales, quelques érésipelles.

Il y a eu encore des fiévres rouges; mais la maladie la plus répandue est la fiévre tierce. Elle céde plus difficilement aux remedes géméraux : le quinquina a du succès.

Le nombre des malades n'est pas considé-

gable,

OBSERVATIO	ONS MI	ÉTÉORO I N.	LOGIQ	UES.
THERMOME	TRE.	BAR	OME	TRE.
JO MATIN. MIDI.  du m.  10. 9 14. 9 16. 6 16. 9 13. 3 16 5 13. 9 16. 6 12. 9 13 7 10. 9 13 8 13. 6 16 9 12. 6 17 10 13 17. 3 11 13 15 12 12. 9 14. 9 13 13. 6 16. 6 14 15 14. 9 14 15 14. 9 15 14 15. 18. 6 17 11. 6 15. 18 18 11. 6 15 19 12. 6 13. 6 21 10 11. 6 22 11 13. 6 24 13. 3 17. 3	SOIR.  deg. 12.  11 13. 9 14. 6 13. 3 13. 9 12 12. 6 14. 3 13. 6 15. 9 12. 9 15. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6 11. 6	MATIN.  po. l. 12.  27. 3. 6  2. 3  3. 3  5. 9  4. 9  4. 6  2. 6  3. 9  3. 3  1. 3  1. 3  7  7	M 1 D 1.  27. 3. 3  3. 6  5. 9  4. 6  3. 6  20. II. 9  27. I	SOIE.  PO. 1. 12.  17. 2. 9.  2. 9.  3. 9.  4. 9.  2. 9.  3. 9.  4. 6.  7.  6. 9.  6. 9.  7.  7.  7.  7.  7.  7.  7.  7.  7.
25 14. 6 18. 6 26 15. 19 27 14. 9 19. 6 28 15. 19 5 25 15. 6 19. 6 35 15. 3 20	15. 9 15. 9 15. 6	6. 9 5. 9 5. 6 6 6. 6	\$. 9 \$. 6 5. 6 6. 6	\$ 5.50 5.50 6

jo. du m.	MATIN.	MIDI.	Soir.
2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 1 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 4 2 3 2 3 2 3	O × , -nu. R, O , nu. R. S × , -nu. S , nu. R. S × , nu. RB.	SX, nu.  SSE X, -nu.  OSOX, nu.  OSOX, nu.  OSOX, +nu.  NX, co. pl.  NX, copl.  NX, fe.  NX, -nu.  SSO, copl.  SX, copl.  SX, copl.  SSOX, copl.  SSOX, copl.  SX, copl.  SX, copl.  SX, copl.  NO, copl.  NO, copl.  NO, copl.  NO, copl.  NO, copl.  NOX, co.  NNE X, nu.  E X, -nu.  O X, nu.  NNE X, nu.  E X, -nu.  O X, nu.  NNE X, nu.  B.  NX, B.	N x, fe. Ex, fe. OSO x, fe. Sx, co. pl. SSEx, -nu. NNOx, co. pl. Nx, fe. Nx, fe. Nx, fe. Nx, fe. Sx, ru. Sx, co. SSO, +nupl. Sx, fe. Sx, co. Sx, co

#### RECAPITULATION.

L'élasticité & la pesanteur de l'air ont été au dessus du terme moyen dans le premier tiers du mois, n'ont passé ce terme que de très-peu dans le second, & ont été considérables dans le troisieme.

La plus grande élévation du mercure dans le barometre a été le 23 de 27 p. 7 l.

La moindre le 15, de 26 p. 11 l. 9<sup>12</sup>.

Le balancement de . . . . . 7 l. 3.

L'élévation moyenne du mois, de 27 p. 4 l.

Les vents du N & du S se sont, pour ainsi dire, partagés le premier tiers du mois. Ceux du S ont regné constamment pendant le second, & ceux du N ont dominé dans le reste du mois. Ceux du S ont souvent soussilé avec beaucoup d'impétuosité.

Les hygrometres ont presque toujours mar-

qué de la sécheresse.

Le ciel a été plus souvent nuageux ou couvert, que serein. Il a été ombragé sur la fin du mois par un brouillard très-extraordinaire, qui commença à paroître le 14 sous la forme d'une vapeur légere. Il disparut sur le midi: reparut le matin & le soir du 18, puis le 22 sur le soir, & depuis cette époque il n'a cessé de regner jusqu'à la fin du mois, excepté dans le temps des pluies & des orages.

Ce brouillard duroit tout le jour & bien

avant dans la nuit; mais se dissipoit après minuit, & reparoissoit au lever du soleil.

Il avoit l'apparence d'une fumée & étoit très-élevé, ce qui l'a fait regarder comme sec. Mais lorsqu'il descendoit pendant la nuit, il humectoit les végétaux.

Le foleil étoit dépouillé de ses rayons pendant le jour, on pouvoit le regarder fixément. Sa couleur étoit celle du badijon. La lune avoit la même couleur.

Il y a eu de la rosée presque tous les matins, à l'exception des jours de pluie.

Il est tombé souvent de la pluie, mais trèspeu abondante, & quelquesois inappréciable. Il y a eu trois orages, mais qui ont donné peu d'eau. Celle qui a été reçue dans l'eudiometre, a été de 1 p. 10 l. 21<sup>36e</sup>.

La plus grande élévation du mercure dans le thermometre a été le 30 de . . 20 d.

La moindre le 21 de . . . . . . 10.

La différence de dilatation de ... 10.

L'élévation moyenne pendant le mois, de 14 d. 212e.

La température moyenne :: +14. 2: +10. La constitution a été séche & chaude dans les deux premiers tiers du mois, fort chaude & fort séche sur la fin.

La végétation a continué à faire beaucoup de progrès. Mais la vigne a souffert, elle n'a pas passé fleurs uniformément. Plusieurs raisins étoient noués dès les premiers jours du mois, mais ils ne l'ont été tous qu'aux environs du 19. Les feuilles de plusieurs ceps one Jauni, & la plus grande partie des raifins rouges ont coulé.

Les bleds sont entrés en sleurs & les orges

en épis dès le milieu du mois,

La fauchaison des sainfoins a commencé dans les premiers jours, & la moisson des na-

vettes aux environs du 24.

La constitution bilieuse a été la dominante. On a vu encore quelques fiévres éruptives & quelques éruptions miliaires rouges, & des dartreules sans fiévre.

La maladie dominante est la sièvre tierce qui a totalement perdu le caractere de la printanniere, & contre laquelle on a recours avec succès au quinquina.

Le nombre des malades est peu considé-

rable.

#### APPROBATION.

NOUS soussignés Commissaires nommés par l'Académie de Dijon, en exécution des ordres de Mgv. le Garde des Sceaux, avons examiné un manuscrit ayant pour titre, nouveaux Mémoires de l'Académie de Dijon, pour la partic des Sciences & des Arts, premier Semestre de l'année 1983; & nous n'y avons rien trouvé qui nous ait paru devoir en empêcher l'impression. A Dijon ce 24 Janvier 1784. Signé, DE MORVEAU & MARET.

4 ...


### T A B L E

Des Articles contenus dans ce premier Sémestre.

Essas fur quelques phénomenes des dissolutions & précipitations des résines dans l'esprisde-vin; par M. TARTELIN. Pag. 1<sup>re</sup>.

- EXPÉRIENCES sur des combinaisons du mercure & de l'acide muriatique par affinité simple; par M. MARET.
- DISSERTATION sur l'origine des gouttes d'eau rensermées dans les crystaux de roche & autres corps; par M. LE CAMUS. 21.
- MÉMOIRE sur la blende artificielle ou combinaison du zinc & du soufre; par M. DE MORVEAU. 37.
- SUITE des observations d'histoire naturelle; par M. PAZUMOT. 49.
- OBSERVATIONS sur différences eumeurs polypeuses; par M. ENAUX. 64.
- OBSERVATIONS sur un charbon fossile incombustible, trouvé à Rive-de-Gier, & sur les propriétés de quelques matieres passées à l'état de plombagine; par M. DE MORVEAU. 76.

- Mémoire sur les plantes astringentes indigents; par M. Durande. 87.
- DISSERTATION sur la situation la plus ordinaire de l'enfant dans la matrice pendant la grossesses par M. HOIN. 121.
- DESCRIPTION d'un météore observé à la Chartreuse de Dijon le 20 Juillet 1779; par M. MARET.
- DESCRIPTION & usage du nécessaire chymique & de l'appareil d'expériences sur le réchaux à esprit-de-vin; par M. DE MORVEAU. 159.
- Ess AI sur la durée & les probabilités de la vie de calculées pour la Ville de Dijon, d'après les registres mortuaires; par M. MARET. 1776
- OBSERVATIONS sur l'acète de bismuth & sur l'acète de bismuth & sur l'acète de propriété de l'acide acéteux d'empêcher la précipitation du nitre de bismuth par l'eau pure; par M. DE MORVEAU. 187.
- MÉMOIRE sur la sommation des suites dont les termes sont des puissances semblables de sinus ou de cosinus d'arcs qui forment une progression arithmétique; par M. L'ABBÉ BERTRAND. 191.
- HISTOIRE météorologique de 1783; par M. MARET. 204.







# N O U VEA U X

# MÉMOIRES

D E

L'ACADEMIE DE DIJON,

POUR LA PARTIE

DES SCIENCES ET ARTS.

SECOND SÉMESTRE 1783.



### A V I S.

CE Sémestre forme la quatrieme livraison des nouveaux Mémoires.

On souscrit en tout temps A DIJON chez Causse; Imprimeur de l'Academie, place saint Etienne.

A PARIS chez Didot le jeune & Théophile Barrois; Libraires, Quai des Augustins.

Le prix de la fouscription est de 6 liv. pour les deux Sémestres, & de 7 liv. 10 sous, francs de port par la poste.

Comme on ne tire qu'un petit nombre d'exemplaires au delà du nombre des Souscripteurs, ceux qui voudront souscrire, sont priés de faire prendre leur souscription avant le 1<sup>er</sup>. Octobre de chaque année.

Le second Sémestre de 1782 se trouvant épuisé, l'Académie a fait annoncer dans les Journaux, qu'elle le feroit réimprimer dès qu'il y auroit un certain nombre de demandes; elle invite ceux qui le desirent, soit séparément, soit avec les trois autres Cahiers, de se faire inscrire chez un des Libraires ci-dessus nommés.

On trouve aux mêmes adresses la Description de l'Aérostate l'Académie de Dijon, contenant le détail des procédés, la théorie des opérations, les dessins des machines, &c. vol. in-8°. fig. prix 3 liv. 12 s. broché.

# T A B L E

DES Ouvrages contenus dans le second Sémestre de 1783.

- MEMOIRE sur l'acide karabique, par M.
  DE MORVEAU. Pag. 1.
- OBSERVATIONS sur l'opération du bec de lievre, par M. ENAUX.
- MÉMOIRE sur le tremblement de terre de 1783; par M. MARET. 26.
- MÉMOIRE sur le pese-liqueur approprié à la cuite des sucres, par M. DE MORVEAU, 52.
- MÉMOIRE sur l'acide bombycin ou du ver-àsoie, par M. CHAUSSIER. 70.
- MÉMOIRE sur la pierre à chaux maigre de Brion, & la maniere de reconnoître cette qualité, par M. DE MORVEAU. 90.
- OBSERVATIONS sur le volcan de Drevin de Bourgogne, par M. L'ABBÉ SOULAVIE. 101.
- NOUVELLES OBSERVATIONS sur le même volcan, par MM. DE BRESSEY ET CHAMPY. 105.
- MÉMOIRE sur la maniere de perfectionner les aréometres, par M. GATTEY. 114.



MÉMOIRE contenant les opérations faites pour parvenir au projet du Canal de la Saone à la Loire, par M. GAUTHEY. 128.

MÉMOIRE sur l'incohérence des nouvelles maconneries, par M. AUBRY. 167.

MÉMOIRE sur la coralline articulée des boutiques, par M. DURANDE. 173.

Essal sur l'histoire naturelle du champignon vulgaire, par M. VILLEMET. 195.

SUITE de l'histoire météoro-noso-logique pour les six derniers mois de 1783, par M. MARET.

#### APPROBATION.

NOUS soussignés Commissaires nommés par l'Académie de Dijon, en exécution des ordres de Monfeigneur le Garde des Sceaux, avons examiné un manuscrit ayant pour titre: nouveaux Mémoires de l'Académie de Dijon pour la partie des Sciences & des Arts, second Sémestre de l'année 1783; & nous n'y avons rien trouvé qui nous ait paru devoir en empêcher l'impression. A Dijon ce 15 Juin 1784.—Signé, DE MORYEAU & MARET.

Le privilege se trouve à la sin du Sémestre de Juilles 1782.



## MÉMOIRES

DE

L'ACADÉMIE DE DIJON,

ANNÉE 1783.

SECOND SEMESTRE.

### MÉMOIRE

SUR L'ACIDE KARABIQUE.

PAR M. DE MORVEAU.



'EST ainsi que je crois devoir nommer l'acide concret, que l'on retire d'une substance appellée par les minéralogistes, ambre jaune,

karabé, fuccin, quoique cet acide soit déjà connu des Chymistes sous le nom de sel volatil de succin, parce que cette expression est tout à la sois plus juste & plus commode pour en sormer des dénominations de genre

1

& de composés, suivant les regles de la no-

menclature systèmatique (1).

Le succin étoit très-estimé des anciens; il n'y a pas même de substance sur laquelle l'imagination des Poëtes se soit autant exercée pour illustrer son origine. Sophocle avoit dit qu'il étoit formé dans l'Inde par les larmes des sœurs de Méleagre changées en oiseaux. & pleurant leur frere. Ovide le fit naître des larmes des sœurs de Phaëton changées en peupliers. Pline n'a pas dédaigné de rapporter toutes ces fables, & de les mêler à des traditions qui, pour être moins merveilleuses, ne lui paroissoient pas à la vérité plus dignes de foi. Ce Naturaliste regardoit comme trèscertain, qu'il couloit d'un arbre de l'espèce des pins, comme la gomme des cerisiers, qu'il se durcissoit pendant l'automne, & qu'après avoir été emporté par les eaux de l'océan dans lequel il tomboit, il étoit ensuite repoussé sur le rivage: on le recherchoit pour l'ornement à peu près comme les pierres précieuses. Callistrate lui attribue de grandes vertus en médecine; on le prenoit en poudre, ou broyé avec du miel, ou en boisson avec le massic; mais on n'avoit aucune connoissance de ses principes, ni même de ses vraies propriétés, excepté celle d'attirer les corps légers lorsqu'il étoit frotté.

<sup>(1)</sup> Mémoire sur les dénominations chymiques, &c. Sournal physique, tom. XIX, pag. 370,

Suivant Pline, le nom de succin lui sut donné, parce que c'étoit reellement un suc végétal. Tacite dit que les Germains l'appellerent glessus. Ce sont les Arabes qui l'ont fait connoître sous le nom de karabé.

On s'est borné long-temps à former des compositions avec le karabé pour la médecine, & pour les arts, sans examiner quels étoient ses principes; mais il paroit qu'avant Hoffman on en avoit tenté l'analyse par la distillation, puisque ce Médecin parle de son huile & de son sel volatil acide comme déjà connus; Neuman, Bourdelin & Neusorn l'ont soumis depuis à diverses expériences, pour déterminer la nature de ses parties constituantes; mais la dissertation du célèbre Pott est encore ce que nous avons de mieux sur ce sujet.

Pour obtenir l'acide karabique, il faut décomposer le karabé, & il sussit pour cela de le distiller.

On prend du karabé, ou ambre jaune, que l'on casse en petits morceaux; on en remplit à moitié une cornue; on met dessus un pouce d'épaisseur de sable pur bien séché; on lutte le récipient avec de la colle de farine, & on distille au seu de sable, en conduisant le seu avec attention, pour ne pas brûler le karabé, & pour arrêter l'huile qui, à un seu plus fort, dissoudroit la plus grande partie du sel. On ne doit pas même augmenter beaucoup le seu sur la fin, parce que l'huile noire épaisse couvriroit le sel, & en reprendroit encore une partie.

A ij



#### 4 ACADÉMIE

Dans cette opération il passe d'abord du phlegme tenant en dissolution une petite portion de sel acide, du sel acide concret qui s'attache au col de la cornue; ensin, une huile brune & épaisse, qui a une odeur acide.

Le flegme emporte avec lui un peu d'esprit recisié, que l'esprit-de-vin peut lui enlever. Suivant M. Roux, cet esprit recteur n'est pas le même que celui que le succin entier donne à l'esprit-de-vin, puisqu'il n'a pas la même odeur, & que si on le rectifie, il devient sétide. En distillant l'esprit-de-vin sur le flegme, l'huile qu'il contient, monte avec l'esprit, mais elle s'en sépare sur le champ, & tombe au sond du récipient.

Le sel concret retient toujours une portion d'huile à la premiere distillation; on le purisse en le sublimant de nouveau, après l'avoir encore mêlé avec du sable, & il est alors un peu moins jaune, en longues aiguilles dispo-

sées en forme de rayons.

Tel est le procédé indiqué par M. Scheffer dans ses leçons de chymie. M. Bergman, dans ses notes sur cet ouvrage, assure que la meilleure maniere de purisser ce sel, est de le mêler avec de l'argille blanche, exempte de toute matiere calcaire & bien séchée.

Les Chymistes Suédois ne sont pas les premiers qui aient imaginé d'ajouter d'autres matieres dans la distillation du karabé pour absorber l'huile. Hossman recommande précisément de mêler le karabé avec partie égale de sable. D'autres ont employé, dans les

3

mêmes vues, le résidu de la distillation de l'esprit de sel, du sel commun, de la corne de cerf brûlée, de la cendre lessivée, de la potasse, des os calcinés, de la brique pilée, ou de l'argille cuite & réduite en poudre. Pott fait très-bien sentir l'inconvénient de la plupart de ces additions, qui peuvent en effet retenir ou même décomposer le sel; il ajoute, " que la meilleure dépuration, où on perd » le moins, est celle qui se fait quand on le » dissout dans l'eau chaude, qu'on met d'abord » dans le filtre un peu de coton qui a été » légérement humecté avec l'huile de fuccin, » & qu'ensuite on s'en sert pour filtrer la so-» lution, parce qu'alors la plupart des par-" ties huileuses s'attachent au coton, & que " la folution passe plus pure à travers le " filtre, & qu'il n'y a plus qu'à faire éva-» porer la liqueur à un feu très-doux, pour " obtenir le sel en crystaux. »

Le même Chymiste dit encore avoir observé, qu'en distillant ce sel acide concret
avec l'acide muriatique, il se sublimoit d'un
beau blanc & pur, parce que la partie huileuse avoit été détruite par l'acide muriatique. C'est d'après cette observation que M.
Spielman croit devoir enseigner cette méthode
de rectisser le sel volatil de karabé. Mais quoique Pott assure qu'après cette opération il
ne précipite pas la dissolution de plomb, il
est bien dissicile que ce sel, s'élevant en même
temps que l'acide muriatique passe à la dis-

A iii

tillation, n'en reste pas plus ou moins im-

pregné.

Les lixiviations réitérées à la maniere de Pott, sont donc réellement ce qu'il y a de plus avantageux, puisqu'elles n'exigent d'autres précautions que d'évaporer les dissolutions à un feu très-doux, & que la négligence même de cette précaution n'occasionne que la perte d'un peu de sel. Au reste, je ne vois aucun inconvénient à ajonter du sable dans la distillation du karabé, lorsqu'on a principalement en vue de recueillir son sel acide, quoique les Auteurs françois les plus récens paroissent avoir abandonné absolument ce procédé; & comme l'argille, sur-tout lorsqu'elle n'est que séche & non cuite, paroît avoir tout à la fois beaucoup de disposition à s'unir aux matieres grasses, & très-peu d'affinité avec notre sel, elle réunit toutes les conditions nécessaires pour sa plus parfaite reclification.

Le produit de ces opérations varie beaucoup. Pott assure avoir obtenu, en poids de sel bien crystallisé & égoutté sur le papier gris, la trentieme partie du karabé qu'il avoit employé; mais les Chymistes sont d'accord que cela ne va le plus communément qu'au soixantieme.

Ce sel est préparé en grand à Konigsberg en Prusse, avec les rognures des morceaux de karabé ou ambre jaune que l'on y travaille; on les distille sans addition à seu nu; on change seulement le récipient sur la fin, pour n'avoir pas tant à féparor; le sel, qui est malgré cela encore très-chargé d'huile, est mis à égoutter sur du papier gris, qui en absorbe à la fin la plus grande partie, & laissé le sel assez sec; on exprime ensuite l'huilé de ces papiers pour la redistillér.

Comme le sel de karabé est sort cher, il est souvent sophistique; on empleie pour cela du sucre, du tarrre rassiné, de l'ammoniac de corne de cerf, du vitriol ammoniacal, à quelquesois un métange de tarrré de potasse ou sel végétal dissous dans l'esprit de karabé, & évaporé pour en obtenir consusément les

crystaux.

Ce n'est pas iei le sieu de rapporter toutes les observations des Naturalistes sur l'origine du karabé; les lieux où il se trouve, & les matieres qui l'environnent; cependant je ne donnerois qu'une connoissance imparfaite des produits chymiques de cetté substance, si je n'examinois à quel règné elle appartient réellement, & sur-tout quellé est la nature de son acide; je m'occuperai donc de ces deux questions avant que d'indiquer les caracteres de cet acide, son action & ses affinités.

I. A quel regne appartient le karabé? Pour décider cetté question, il faut d'abord savoir où & comment il se trouve. Or, tous les Naturalistes sont d'accord qu'il se trouvé en plusieurs endroits de la terre, & sur-tout dans la mer Baltique, jusqu'à la prosondeur de trente à quarante toiles, & sur les rives de A iv

cette mer qui appartiennent à la Prusse ducale. Aux endroits où on le rencontre, on voit d'abord à la surface de la terre une couche de fable, il vient ensuite une couche de glaise qui couvre une couche de bois résineux, presqu'entièrement pourri & réduit en terre. mais qui a encore la propriété de s'enflammer. Au dessous de ce bois se trouve une couche de terre alumineuse & vitriolique; enfin, on rencontre une nouvelle couche de sable où le karabé est répandu par masses détachées & en morceaux plus ou moins gros. M. Helwing qui a eu occasion d'observer par lui-même sa situation dans le sein de la terre, remarque. dans son ouvrage intitulé, Lithographia Anger-Brugica, que l'on trouve toujours du bois bitumineux, de la terre bitumineuse noire & du gravier, dans le voisinage du karabé, & que l'on y rencontre aussi du vitriol & du soufre; d'où il conclut que c'est un bois sossile & bitumineux, qui est la source du karabé tiré du fein de la terre.

Il est bien certain que le karabé que l'on trouve dans la mer, n'a pas une origine dissérente: il y est entraîné par les eaux, qui, poussées par les vents, ont miné le terrein des côtes; & ce qui le prouve, c'est que le karabé ne se trouve en abondance dans la mer, qu'à la suite des tempêtes qui ont porté les slots avec violence contre les couches de terre qui receloient cette substance.

Le karabé se trouve aussi sur les bords de la mer, près de Birkioe en Suede, en Sibérie, & dans les montagnes de Provence: M. Georgi indique encore, dans ses notes sur la Minéralogie de Brunnich, les côtes de la mer gla-

ciale, Camenskoi & Jenisey.

L'observation la plus détaillée à ce sujet, est celle qui a été publiée par extrait à la suite de la traduction françoise de la Pyritologie d'Henkel, & qui est tirée du Recueil des curieux de la nature : elle nous apprend qu'en 1731, on découvrit une mine de karabé en Saxe, dans le voisinage de Pretsch: le terrein où l'on fit cette découverte étoit affez uni, quoiqu'il s'y rencontrât quelques inégalités; il étoit composé d'un sable rougeâtre mêlé de cailloux & de galets. Le sable avoit environ deux toises d'épaisseur, & couvroit une couche de terre noire, qui étoit ellemême composée de deux bancs; le premier étoit un limon mêlé de sable & de parties talqueuses, il avoit un goût de vitriol, il donnoit sur le seu une sumée épaisse & une odeur de bitume; le second banc étoit une glaise grise, dans laquelle on appercevoit des morceaux de bois & des racines; elle étoit aussi vitriolique, mais moins que le banc précédent. Le karabé se trouvoit à la partie supérieure du banc noir, qui renfermoit aussi une substance semblable à du jayet, & différentes espèces de bois bitumineux.

J'ajouterai à ces descriptions une observation encore plus décisive, & qui m'a été certifiée par un Minéralogiste Allemand trèsinstruit, c'est que l'on a vu dans le cabinet de M. Veltheim, Conseiller des mines de Prusse, un morceau de karabé dans une hé-

matite qui venoit de Silésie.

Il est donc démontré par tous ces faits. que le karabé se trouve dans le regne minéral: cela ne suffit pas sans doute pour décider la classe, s'il n'est reçu dans l'intérieur de la terre que comme un fruit qui est tombé de l'arbre, & qui a été recouvert par le fable: que le karabé vienne originairement d'un végétal, c'est ce dont il n'est pas possible non plus de douter, lorsqu'on voit dans les cabinets des amateurs, des morceaux qui renferment des mouches, des araignées & autres insedes: lorsqu'on remarque que toute leurs parties s'y trouvent développées, presque comme dans l'animal vivant; & qu'ainsi ils n'ont pu être surpris que par une substance actuellement fluide, comme il arrive tous les jours aux insectes qui s'attachent aux arbres d'où il découle des gommes ou des réfines. Mais l'origine végétale ne décide encore rien; autrement tous les bitumes devroient aussi, par la même raison, être retranchés du systême minéral. Le corps végétal a-t-il reçu dans la terre quelqu'altération? est -, il minéralisé? Voilà le seul point à considérer, & j'avoue que les observations ne sont pas suffisantes pour lever ici tous les doutes.

D'un côté, il paroit difficile de concevoir que le karabé ait éprouvé une sorte de minéralisation, sans avoir été ni ramolli, ni même comminué, au point que les insectes qui y ont été pris pendant l'exudation végétale, aient été aussi bien conservés. Quel seroit donc le principe minéralisant, qui, en pénétrant la masse sans la désormer, auroit encore

respecté ces parties animales?

D'autre part, il n'est pas plus aisé d'imaginer que le karabé ait pu rester si long-temps dans le sein de la terre, environné de matieres pyriteuses, sur lesquelles l'eau, l'air, les gas & les émanations phlogistiques travaillent sans cesse, & qui, dans leurs dissérens passages, travaillent à leur tour sur tout ce qui les touche, avec une force que la durée rend presqu'infinie comme elle. Quelle seroit donc la nature de cette résine qui résisteroit si longtemps à de tels agens, qui se maintiendroit si constamment au milieu d'eux avec sa forme & même sa couleur primitives?

Telles sont les raisons qui peuvent appuyer les deux sentimens opposés; mais, dans la nécessité de choisir, je n'hésite pas de dire que le karabé appartient au regne minéral. Cette conclusion est fondée, 1°. sur ce que les produits de son analyse le rapprochent très-certainement de tous les bitumes: 2°. sur ce qu'on n'a pu trouver encore aucune gomme, aucune résine, aucun baume qui présentât les mêmes caracteres. C'est là probablement ce qui a aussi déterminé les plus célebres Minéralogistes, & en dernier lieu M. Bergman, dans sa Sciagraphie, à placer le karabé parmi les minéraux, du moins jusqu'à ce que l'on eût acquis de nouvelles lumieres. Pour ex-

pliquer l'état des insectes enfermés dans-le karabé, je ne serois pas éloigné d'admettre avec Fréderic Hoffman, l'exudation de cette matiere sous forme fluide, postérieurement à l'époque où les bois enfouis, auroient commencé de passer à l'état de bitume : alors la nature particuliere de l'arbre qui l'auroit originairement produit, suffiroit pour rendre raison des caracteres qui distinguent le karabé des autres bitumes, foit que l'espèce de ces arbres n'existe plus, soit que l'altération minérale ne nous permette plus de la reconnoître par la ressemblance de ses produits. En un mot, ces exudations n'ayant pu se faire que dans des cavités sonterreines, il ne seroit pas étonnant que des insectes, qui sont si uni versellement répandus, qui peuplent tous les espaces où l'air peut pénétrer, eussent été quelquefois surpris & enveloppés dans ce fluide. L'observation que j'ai donnée dans mes digressions académiques (1), d'un guhr bitumineux que j'avois moi-même recueilli en état de pâte, d'un gris blanc & très -mol, dans des mines de charbon, & qui est devenu dans mon cabinet un bitume sec d'un noir jaunâtre demi-transparent, me paroît trèspropre à confirmer ces probabilités.

II. Quelle est la nature de l'acide karabique? Les opinions que l'on en a prises en différens

<sup>(1)</sup> Pag. 378.

temps, n'ont pas été exemptes de l'influence du systême d'un acide universel. M. Hoffman a cru que ce n'étoit qu'une huile condensée en masse résineuse par l'acide vitriolique. Bourdelin a publié dans le Recueil de l'Académie des Sciences de 1742, plusieurs expériences, d'après lesquelles on a tenu assez long-temps pour démontré que c'étoit l'acide muriatique: cette conclusion étoit fondée sur ce que le karabé se trouvoit près de la mer, sur ce qu'après avoir été complétement privé de son huile par sa détonnation avec le nitre, il formoit avec sa base un sel, dont la crystallisation étoit presque cubique, qui décrépitoit sur les charbons, qui donnoit des vapeurs grises par l'addition de l'acide vitriolique concentré, & qui précipitoit en blanc l'argent & le mercure de leur dissolution nitreuse. C'en étoit assez sans doute pour en imposer du temps de cet Auteur; mais il n'est personne aujourd'hui qui ne juge ces preuves insuffisantes, pour établir une identité parfaite. Si au lieu de s'en tenir à des apparences trompeuses, à de simples expériences par les réactifs, encore mal ordonnées, Bourdelin se fût appliqué à purifier d'abord ses matieres de tout mêlange accidentel, & à en déterminer ensuite la nature par les vrais procédés, il auroit bientôt reconnu que cet acide, même uni à la potasse pendant la détonnation du nitre, ne formoit point d'eau régale avec l'acide nitreux; que cet acide ne décomposoit pas le nitre d'argent par lui-même, mais

#### ACADÉMIE

feulement lorsqu'il étoit porté dans sa dissolution en l'état de sel neutre, & à raison d'une double affinité; qu'il précipitoit seus le plomb de l'acide acéteux, mais que le précipité n'étoit pas du muriate de plomb; il eût découvert bien d'autres différences aussi décisives, s'il eût examiné avec un pen de soin les sels résultant de l'union de cet acida

avec les principales bases.

Suivant M. Bergman dans ses notes sur la chymie de Scheffer, M. Schéele a observé que la liqueur qui s'élevoit pendant la diffillation du karabé, se comportoit absolument comme le vinaigre, ce qui le porte à penser que son origine est végétale. La méthode exacte de ce célèbre Chymiste, ne permet pas de soupçonner qu'il ait annoncé cette ressemblance avant que de s'en être bien asfuré par toutes les épreuves convenables. Je n'ai nulle connoissance de ce qu'il a pu écrire à ce sujet; mais si le fait est prouvé, il faut que la liqueur qui passe dans la distillation du karabé, ne soit plus simplement, comme on l'a cru, un flegme chargé d'une portion de son sel acide concret; il faut, ou que le karabé fournisse deux acides dissérens, ou que son acide puisse être réduit par décomposition à un état qui produise cette identité avec le vinaigre; car il n'y a peut-être pas deux acides plus différens entr'eux que l'acide acéteux & celui dont il a été jusqu'à présent question dans cet article. Le premier se détruit au feu plutôt que de prendre la forme séche, & le second est naturellement concret. Le premier ne supporte pas même le feu de distillation, quand il est fixé par un alkali; le second résiste à l'action du nitre en susion, il ne lui céde que la portion de phlogistique qui ne lui est pas essentielle, & neutralise sa base au seu de détonnation. Remarquons en passant que cette fixité seroit bien étonnante dans un végétal qui n'auroit pas subi l'altération minérale. Enfin, M. Bergman affure lui-même, que l'acide du karabé précipite la dissolution acéteuse de plomb : or, il est impossible qu'une dissolution soit décomposée par son propre acide; & ce seroit méconnoître les principes du favant Professeur d'Upfal, que de lui prêter une semblable opinion. Il faut donc tenir pour constant que le sel concret volatil du karabé, tel que nous le connoissons & avant qu'il soit réduit à un état plus simple, supposé que cela soit possible, est un acide propre de son genre; cette conclusion sera confirmée par l'examen de ses combinaisons, & elle ne peut plus étonner ceux qui auront adopté les principes que nous exposons présentement dans les Cours de l'Académie, sur la nature des acides en général; ils comprendront aisément que le principe acidifiant commun peut trouver une substance huileuse de la nature du pétrole, qu'il prend comme base acidifiable; & peutêtre qu'une analyse plus exacte de tous les bitumes, nous y découvriroit une partie composante, sinon absolument identique, du moins

fort analogue. L'existence de l'air, principe acidissant, est vérissée ici par l'observation de Pott, que cet acide saturé de potasse, se détruit pendant la distillation, & laisse un alkali effervescent.

Le célèbre Chymiste de Berlin a traité cet acide concret à la distillation avec les acides vitriolique, nitreux & muriatique. Le second a bien produit quelques vapeurs rouges, mais il s'est encore sublimé un peu de sel non altéré, & les deux autres n'ont fait que retenir son huile surabondante sans le décomposer, ce qui annonce que le phlogistique huileux y est assez fortement combiné.

L'acide karabique a un goût piquant fans être corross, & quelque chose d'huileux lors même qu'il est le plus rectifié & le plus blanc. Il n'altere que soiblement le sirop violat, mais il rougit le tournesol, & restitue les nuances

altérées par les alkalis.

Il est volatil, mais ce n'est qu'à un degré de chaleur assez considérable; il ne s'éleve pas à la chaleur du bain-marie, ce qui donne, comme ledit Pott, un très-bon moyen de le purisser, sans en rien perdre. Si on l'expose au seu de sable, il coule d'abord comme une huile, il monte un peu d'acide huileux, le sel concret se sublime ensin & se condense dans la partie supérieure des vaisseaux, partie sous l'apparence d'une matiere butireuse jaunâtre, partie en sorme de plumes, & le charbon qui reste, prouve qu'une portion du sel a été détruite par l'action du seu.

Cet

Cet acide se dissout très-difficilement dans l'eau froide, puisqu'il en faut 24 parties pour dissoudre une partie de ce sel, au lieu qu'il ne faut que deux parties d'eau bouillante; mais à mesure que l'eau refroidit, la plus grande partie s'évapore. M. Roux assure cependant qu'il en reste plus en dissolution que l'eau froide n'en auroit pu dissoudre. Si on fait évaporer une dissolution bien chargée de cet acide, il se crystallise en prismes triangulaires dont les pointes sont tronquées.

L'acide karabique s'unit aux terres, aux alkalis & aux substances métalliques; il résulte de ces combinaitons des sels que je serai connoître plus particuliérement dans un autre mémoire; je les distinguerai par la dénomination générique de karabites, avec l'expression de la base, d'où il résultera karabite de potasse, karabite calcaire, &c. suivant la méthode que j'ai adoptée pour tous les sels.

On a donné jusqu'à ce jour peu d'attention aux affinités particulieres de cet acide; ce qui est d'autant plus étonnant, que Barchusen & Boulduc ont démontré depuis long-temps, qu'il appartenoit à cette classe, & que personne n'en a douté depuis. Cependant M. Bergman ne l'a pas compris dans sa Table (1), & M. Wenzel ne s'est attaché qu'à déterminer les proportions de composition de ses sels, suivant le plan de son ouvrage.

<sup>(1)</sup> Journ. Phys. tom. XIII, suppl. pag. 298.

J'ai essayé d'y suppléer, du moins pour quelques points principaux; j'ai observé que le barote devoit occaper la premiere place, ensuite le calce; que les trois alkalis précédoient la magnéfie qui étoit précipitée de cet acide même, par l'ammoniac caustique; ensin, que la magnéfie pouvoit être placée dans le fixieme ordre, du moins jusqu'à ce que l'en eût décidé son rang, par des expériences directes, peut-être même à l'égard de quelques substances métalliques qui pourroient lui calever cet acide.

On savoit déjà que cet acide cédoit les terres & les alkalis à l'acide vitriolique; il est sûr encore que l'acide saccharin lui reprend la terre calcaire, mais il le reprend à son tour à l'acide acéteux, & le karabite calcaire ne se laisse pas même décomposer par l'acide muriatique.

Il ne précipite ni le mercure, ni l'argent

de l'acide nitreux.

Il décompose & précipite l'acéte de plomb, je ne puis imaginer comment cette précipitation a pu échapper à Pott, qui assure précisément le contraire.

Suivant les expériences du même Chymiste, cet acide dégage l'acide du muriate ammoniacal pendant la distillation, c'est-àdire par la voie séche. M. Stockar est même parvenu à décomposer toute une quantité donnée de muriate ammoniacal, en ajoutant successivement de nouvel acide karabique. Il semble qu'il décomposeroit également le nitre par cette voie, puisque Pott rapporte qu'il s'éleva des vapeurs rouges; mais la détonnation qui eut lieu par le contact de la matiere huileuse de l'acide, brisa les vaisseaux, & ne permit pas d'achever l'opération.

Cet acide refuse de s'unir à l'huile de térébenthine; il ne se dissout qu'en très-petite quantité dans l'esprit-de-vin, s'il n'est aidé de la chaleur, & la portion qu'il abandonne en refroidissant, est encore sensiblement jaune.

## **OBSERVATIONS**

SUR L'OPERATION DU BEC DE LIEVRE.

#### PAR M. ENAUX.

L A division de la levre supérieure que quelques enfans apportent en naissant, est connue sous le nom de bec de lievre.

Je distingue trois espèces de becs de lievre. Un simple, un composé, & un compliqué.

Le bec de lievre simple n'a qu'une seule division.

Le composé est celui où la division est double.

Le compliqué est avec séparation de la machoire supérieure. Quelquesois il n'y a qu'un seul écartement de la machoire. Chez d'autres l'écartement présente deux sentes, parce que la cloison des narines est isolée,

Bij

ainsi que la portion alvéolaire qui foutient les deux dents moyennes incisives; c'est cette espèce de bec de lievre qui mérite le nom de compliqué, puisque l'on doit avoir recours à une autre opération, avant que de venir

à celle du bec de lievre ordinaire.

Quel que foit le bec de lievre, on ne peut remédier au vice de conformation qu'il préfente, qu'en réunissant les parties molles divisées; & les moyens qui paroissent simples, offrent néanmoins des difficultés qui ont fait varier la méthode d'opérer. Il est très-difficile de maintenir la levre de façon que celui qui opere, puisse retrancher ce qui est nécessaire pour former une plaie fraîche, dont les parties rapprochées & maintenues assurent une

prompte réunion.

Je n'entrerai pas dans tous les détails sur les différens instrumens qui ont été employés, cette partie a été suffisamment discutée dans différens Mémoires à ce sujet. Je dirai seulement, en rejetant tous les instrumens qui peuvent occasionner une contusion fur les levres de la plaie, tels que les cifeaux & les pinces, que le bistouri est l'instrument qui doit être préféré; mais comme la difficulté de maintenir la levre est le principal objet dans cette opération pour faire promptement une coupe réguliere, j'ajouterai que la palette de carton proposée pour assujettir la levre, ne m'a pas paru suffisante chez les enfans qui sont le plus exposés à cette opération, à raison des cris & des mouvemens répétés.

J'ai tenté plusieurs fois l'usage de la palette de bois ou de carton, mais quelque précaution que j'aie apportée pour assujettir la levre, les cris & les mouvemens du malade me mettoient dans la nécessité de revenir sur mes pas pour obtenir une coupe réguliere. C'est d'après tous ces obstacles que j'imaginai de fixer tellement la levre, que quelques mouvemens que fit le malade, je fusse assuré de déterminer une ligne que je pouvois suivre pour retrancher avec aisance la portion de la levre. Pour cet effet je préparai deux portions de liege de la longueur d'un pouce & demi sur un travers de doigt de largeur. Le malade dans une situation commode pour être opéré, la tête maintenue par un aide; je plaçai une piece de liege sur un des bords du bec de lievre, en dirigeant la longueur du liege fur la longueur de la partie qui devoit être retranchée; j'ens soin d'examiner le bord inférieur, coloré & arrondi, qui doit être retranché, cette attention est essentielle, pour éviter la difformité. C'est sur ce point inférieur que je place une épingle qui traverse la levre & le liege, comme on enfonce une épingle dans une pelotte. Je dispose pareillement une autre épingle à la partie supérieure proche la commissure du bec de lievre. Ce que j'ai fait d'un côté, je le répéte sur l'autre. Alors je saisis avec deux doigts la levre & le liege tout à la fois; je commence par diviser la commissure, & de suite je suis la ligne tracée par les épingles, en faisant Biij

une coupe qui leur foit extérieure : par-là la levre est coupée d'un seul trait ; la portion retranchée reste attachée au liege avec les épingles ; les bords de la plaie sont bien équarris & coupés très-promptement. Je passe de suite à l'autre partie du bec de lievre qui est assujettie, comme je l'ai dit plus haut, & l'opération est très-prompte. Je rapproche ensuite les parties, & je les maintiens par des moyens dissérens, selon les circonstances.

Les moyens de réunion ont également varié. Les inconvéniens attachés aux futures, dans des circonstances qui leur étoient peu favorables, les ont fait rejetter en entier, pour adopter, dans tous les cas, le bandage unissant. Il seroit à souhaiter que ce moyen fût toujours suffisant pour remplir l'indication qui se présente, qui est de favoriser une prompte réunion; mais j'ai trouvé que le bandage n'étoit pas toujours applicable à toute espèce de bec de lievre. J'en établirai la preuve dans les observations que je vais donner.

J'ai opéré des becs de lievre simples, où le bandage unissant a sussi. J'ai retranché la levre inférieure cancereuse, & je l'ai retranchée d'une commissure à l'autre chez un adulte: je ne me suis servis que du bandage unissant qui a rempli, sous peu de jours, l'indication desirable. Cependant j'ai été forcé de me servir de la suture dans d'autres circonstances où le bandage auroit été insussissant, comme dans la feconde observation, & inutile comme dans la troisieme.

#### PREMIERE OBSERVATION.

En 1776, on plaça à l'Hôpital général de cette Ville, un enfant âgé de quatre ans qui avoit un bec de lievre simple. La vivacité naturelle de cet enfant me fit craindre de ne pouvoir me rendre maître de la levre pour faire avec sûreté cette opération. J'étois dans l'usage de me servir d'une petite palette de sapin pour soutenir la levre que je devois couper. J'imaginai d'affujettir cette levre avec deux épingles; mais les épingles ne pénétrant pas assez avant dans le bois, au premier mouvement que fit l'enfant, les épingles quitterent prise, ce qui allongea beaucoup l'opération. Je réunis les parties, & je les maintins par le seul bandage unissant. Quatre jours après j'ôtai le bandage, & je plaçai au bord inférieur une languette de taffetas d'Angleterre, qui prévint l'écartement qui auroit pu se faire à la partie inférieure. Le petit malade sortit quelque temps après, parfaitement guéri.

#### SECONDE OBSERVATION.

En 1778, on conduisit à l'hôpital un enfant de la Ville de Beaune, âgé de six ans, pour y être taillé; cet enfant avoit un double bec de lievre.

Je l'opérai d'abord de la pierre; & lorsqu'il fut guéri, je m'occupai de lui ôter la difformité que lui occasionnoit ce bec de lievre.

ئ د

La portion mitoyenne qui séparoit chaque division, formoit un bouton arrondi & plus court que chaque côté de la levre.

Je préférai de faire l'opération en deux temps. Pour cet effet, au lieu de palette de bois, j'en formai une de liege, comme je l'ai décrit plus haut; je fixai folidement chaque bord que je devois retrancher: mais comme la portion moyenne étoit plus courte, il devoit nécessairement en résulter une échancrure dans le milieu après la réunion. Je préférai, en allongeant cette partie, de la traverser avec une épingle, de façon à égaliser la partie colorée de la levre que je traversai également avec la même épingle. Je plaçai une seconde épingle dans le haut. Je me servis de la suture entortillée, que j'ôtai le troisieme jour, n'ayant mis pour tout bandage, qu'une fronde & de la charpie, pour défendre les épingles des corps extérieurs.

Le malade n'eut aucun gonflement qui retardât la cicatrice; les parties réunies étoient parfaitement égales. Je me déterminai, trois femaines après, à la feconde opération par les mêmes moyens, suivis des mêmes succès.

#### TROISIEME OBSERVATION.

En 1780, une Religieuse de l'Hôpital, chargée du soin des filles de cette Maison, me consulta sur une dissormité qu'avoit une fille de douze ans. Cette fille avoit un double bec de lievre compliqué de la double sépa-

A SUNT

ration de la voûte, par la cloison des narines qui étoit isolée. Le bord alvéolaire, ainsi que les deux dents incisives moyennes, faisoient une saillie de plus d'un travers de

doigt au delà de la levre inférieure.

On ne pouvoit faire l'opération du bec de lievre qu'on ne retranchât cette portion de la mâchoire, ainsi que M. de la Faye & d'autres l'ont pratiqué. Je connoissois tous les inconvéniens attachés à la méthode d'opérer dans un seul temps; je présérai, comme dans l'observation précédente, de faire l'opé-

ration en deux temps.

Je commençai par détacher de la mâchoire la partie moyenne de la levre, que je laissai adhérente au cartilage de la cloison du nez. J'emportai avec des ciféaux cette portion de la mâchoire qui me parut mobile & facile à retrancher; je fus trompé par cette flexibilité apparente; la portion étoit osseuse & trèsdure, & je me repentis de ne m'être pas muni de cifailles conseillées en pareil cas. Enfin, après avoir emporté le bord alvéolaire avec les dents, je plaçai chaque piéce de liege sur chaque bord du bec de lievre, que j'assujettis avec des épingles : je me servis dans ce moment de la suture entortillée. comme dans l'observation précédente, & pac les mêmes raisons. J'ôtai, peu de jours après, la suture, & cet enfant desira avec empressement la seconde opération, que je sis un mois après. Je me servis de la même méthode, & c'est dans ce dernier cas où le bandage

### 26 ACADÉMIE

unissant n'étoit pas praticable, parce que ce bandage exige un point d'appui dans le lieu de la réunion; & dans ce cas particulier, le vuide qui restoit derriere la levre, soit par la portion alvéolaire retranchée, soit par l'écartement de la mâchoire, n'offrant pas de point d'appui, le bandage auroit produit, par la pression, un enfoncement sur la levre, auroit soutenu par là son écartement; par conséquent le bandage ne pouvoit pas être employé: mais la suture a procuré la réunion sans obstacle. J'ôtai de bonne heure, je veux dire au troisieme jour, l'épingle inférieure, & j'y substituai une languette de taffetas d'Angleterre, qui s'étendoit d'une paumette à l'autre en traversant la levre. Le lendemain j'en fis de même pour l'autre épingle; la cicatrice a été parfaite après peu de temps, & j'ai vu l'enfant six mois après ayant très-peu de difformité.

# MÉMOIRE

SUR le tremblement de terre arrivé le 6 Juillet 1783.

#### PAR M. MARET.

ES désastres causés en Scicile & en Calabre par les tremblemens de terre, étoient très-récens encore, lorsque notre sol a été agité le 6 du mois dernier par des secousses

du même genre.

Il étoit naturel qu'en pareilles circonstances on prît l'alarme. Elle a été vive dans la plus grande partie de la Province; & l'impression que cet événement a faite, n'est point esfacée. Plusieurs personnes redoutent qu'il n'ait été que le prélude d'une commotion plus sunesse, essayons de rétablir le calme dans les esprits par une histoire sidelle de ce phénomene, par des réslexions sur les causes de ceux du même genre, sur la nature & la rareté des tremblemens de terre observés dans notre Province & dans les voisines.

L'effroi qui grossit toujours les objets, n'auroit pas permis dans ces premiers momens d'écrire, sans crainte d'erreur, l'histoire de notre tremblement de terre. Il falloit, pour la rendre sidelle & complette, recueillir les faits par des relations sûres tirées de dissérens endroits; il falloit pouvoir juger de l'étendue de l'espace dans lequel l'agitation de la terre s'étoit rendue sensible.

L'Académie, qui ne laisse échapper aucune occasion d'être utile, s'est attachée à se procurer tous les éclaircissemens nécessaires; elle a pris le parti d'interroger tous ceux de ses correspondans que leur position mettoit dans le cas de seconder ses vues; elle a sollicité la bonne volonté de toutes les personnes dont elle espéroit pouvoir obtenir quelques lumieres.

C'est avec ces secours qu'elle peut donner

#### 28 ACADÉMIE

avec confiance l'histoire dont nous allons faire

Le brouillard extraordinaire & fingulier qui regnoit depuis le 14 Juin, avoit commencé à diminuer dans les premiers jours de Juillet. It avoit été très-peu sensible dans la matinée du 6, & le ciel, au moment du tremblement de terre, étoit très-pur & très-serein. Le vent fouffloit de l'ONO avec beaucoup de douceur. Le mercure qui dans le barometre avoit toujours été fort élevé (1), étoit au moment du tremblement de terre à un très-haut point d'élévation. Le thermometre marquoit une température très-chaude, & l'hygrometre une grande sécheresse (2).

Tout-à-coup se fait entendre un bruit considérable, mais sourd, semblable à celui que feroit un chariot roulant avec rapidité sur le pavé ou sur un grand chemin ferré; plusieurs personnes se persuadent qu'il est réellement l'effet du passage d'une de ces voitures; d'autres imaginent qu'un fardeau imprudemment jeté sur un étage supérieur, ou la chûte des

<sup>(1)</sup> Il étoit monté à 27 p. 8 l.  $\frac{\epsilon}{10}$  le 4, n'étoit pas descendu depuis le commencement du mois au dessous de 27 p. 6 l. 2, & au moment du tremblement étoit à 27 p. 7 lign. Il est descendu dans l'après midi d'une iligne.

<sup>(2)</sup> Le thermometre à 7 heures du matin étoit à 14 degrés  $\frac{8}{10}$ , il fut l'après midi à 20 degrés  $\frac{8}{10}$ , & il étoit monté les jours précédens à 22 degrés  $5\frac{1}{10}$ .

L'hygrometre à 61 degrés dans la journée marquoit

depuis plusieurs jours une grande sécheresse.

pieces de bois, d'une charpente désunie, l'ont occasionné; d'autres enfin qui se trouvoient en pleine campagne ou près de quelques puits, ont reconnu un bruit souterrein.

A ce bruit a succédé, dans le même instant, un balancement sensible en deux se-cousses, suivies d'une légere trépidation. Ces effets n'ont pas été par-tout également sensibles, mais des relations nombreuses que nous avons reçues de dissérens endroits de la Province, du Comté de Bourgogne & de la Bresse, il résulte que

Des murs ont été visiblement agités, & les boiseries qui les recouvroient, repoussées avec chûte de plâtras; que des plafonds ont été fendus; qu'une voûte en berceau, déja entr'ouverte dans sa longueur, est devenue momentanément plus béante, & que du mortier s'en est détaché.

Des tuiles, des faitieres surmontant des cheminées, ont été précipitées en terre, des meubles ébranlés, des livres placés sur des bureaux, renversés, des balances agitées, des malades dans leur lit, & des gens endormis couchés sur la terre, éveillés par un bercement.

L'eau de la Saone s'est élevée à Verdun contre le quai de l'hôtel de ville, à près de trois pouces au dessus du niveau, qu'elle a repris après la secousse. Cette même riviere à Seurre s'est portée sur ses bords à un pied de distance; & par les mesures prises pour estimer son élévation perpendiculaire, on a reconnu qu'elle avoit été de 2 po. 7 lign.

A Verdun, à Seurre & à St.-Jean-de-Lône, l'horloge a sonné un coup. Dans la premiere de ces Villes, les sonnettes de plusieurs maisons se sont fait entendre, un tourbillon de poussière (1) s'est élevé sur la seconde; & dans la prairie qui avoisine la dernière, les ouvriers employés au canal, & couchés par terre, ont été bercés, & le directeur des ouvrages qui arrivoit sur l'attelier, portant un sac d'argent pour le paiement de ces ouvriers, a senti la terre trembler sous lui, & a éprouvé une violente commotion.

Nous supprimons une infinité d'autres détails que l'imagination a pu enfanter. Mais, pour ne pas laisser le plus léger doute sur l'authenticité de ceux que nous avons rapportés, nous dirons que M. le Comte de Busson s'est senti bercé dans son fauteuil; que M. le Marquis de Courtivron, assis contre une boiserie, a eu son siège poussé en avant; que le même a vu la voûte de son cabinet s'entr'ouvrir plus qu'elle ne l'étoit, & de grosses balances suspendues dans un magasin, agitées plusieurs minutes après la cessation de la secousse.

Nous dirons encore que les faits observés à Verdun sont attestés par M. Perret; que nous tenons de M. Vernerd, Docteur en Mé-

<sup>(1)</sup> Le terrein qui avoisine cette Ville est un sable extrêmement sin, dont la couche très-prosonde savorise le desséchement,

decine, les détails relatifs à Seurre, & que nous avons vérifié par nous-mêmes ceux qui ont eu lieu à Saint-Jean-de-Lône.

Nous ajouterons que M. l'Abbé Giraud de Soulavie se trouvant à Dravin, a observé le mouvement sensible de deux monticules isolés, & très-peu distans l'un de l'autre.

C'est à 9 heures 56 à 57 minutes du matin. que le phénomene dont nous venons de donner la description, s'est manifesté; sa durée a été de deux à trois secondes. On ne doit pas être étonné si nous ne déterminons pas avec plus de précision l'époque de ce tremblement de terre & le temps de sa durée : l'événement étoit imprévu, il n'étoit pas possible d'apporter beaucoup d'exactitude dans l'obfervation. La marche des pendules & des montres est trop peu uniforme, pour qu'on ait pu tirer de leur indication une induction plus précise; & c'est en conciliant les différens rapports, que nous avons cru pouvoir fixer, & l'époque du tremblement de terre, & sa durée.

La direction de la secousse n'a pas été plus facile à déterminer. Le moment de l'obser; vation a été si rapide, qu'il a été difficile de juger cette direction. Aussi tous les récits offrent-ils à ce sujet des dissérences frappantes. Il n'est aucun point de l'horizon d'où l'on n'ait fait commencer l'agitation de la terre. D'ailleurs le balancement, la trépidation ont nécessairement dû faire naître des incertitudes, & ce qui paroît probable, est que la terre a été agité du NNE au SSO.

32 ACADÉMIE

La sérénité du ciel n'a pas été altérée à la suite de cette sécousse; il n'y a eu ni pluie, ni orage, ni vent impétueux qui lui aient succédé. L'athmosphere a continué à être chaud, sec & tranquille; le ciel a été serein jusqu'au 15, jour d'un orage considérable. Le brouillard n'a reparu que le 10, & seulement pendant quelques instans au lever & au coucher du soleil, & il n'a pas repris sa premiere densité. Aucun événement (1), aucune maladie extraordinaire n'ont précédé ni suivi le tremblement de terre; le nombre des malades étoit alors très-peu confidérable. Il n'a commencé à l'être que sur la fin du mois, & tous les Médécins de cette Province & des voisines, que nous avons consultés, ont fait la même remarque.

Les détails dans lesquels nous venons d'entrer, seroient sans doute suffisans pour satisfaire la curiosité. Mais la découverte du soyer de cette secousse de la terre, pouvoit offir quelques résultats plus intéressans; il falloit, pour y parvenir, connoître l'espace sur lequel ce phénomene avoit été observé. On n'avoit pas tardé à être instruit qu'il n'avoit pas été sensible par toute la France, ni même dans toute la Province, mais qu'on l'avoit

restanti

<sup>(1)</sup> Un terrein de 300 pieds de circonférence s'est enfoncé dans le territoire de Senney près Orgelet, dans la nuit du 8 au 9, mais les informations que nous avons prifes, nous ont convaincu que le tremblement de terre n'en étoit pas la cause.

essenti en Bresse & dans le Comté de Bourpgne. Le premier pas à faire étoit de s'assurer s points où il avoit cessé, & de circonscrire, ce moyen, l'espace cherché. Nos relations ont procuré cette connoissance; & nous ons dire que cet espace est compris dans gne qui partant au N, d'une lieue en e Langres, se dirigeant entre Aignay-& Châtillon, passant à l'O entre Noyers bard, enveloppant Semur, Vitteaux, Arnay-le-Duc, Autun, Couches, Villefranche, traversant la Dombes se en se portant jusqu'au Rhône, epliant pour longer la côte occiden-Mont-Jura, à trois ou quatre lieues à gelet, embrassant Pontarlier, & se encore depuis Lure pour suivre, au ul, la partie méridionale des Vosges; point d'où nous l'avons fait partir le Langres, en passant au delà de , & circonscrit l'espace dans lequel i le tremblement de terre d'une mauée.

PI

re

ar

pns d'une maniere marquée, parce encore en quelques endroits au tte ligne, dans le Bugey, dans le ex & dans celui de Vaux, mais ment, fans que le bruit y ait été eux qui en ont parlé ne l'ont fait réminiscence, & seulement après appris l'impression qu'il avoit faite

ous pouvons donc donner pour certain

que la ligne que nous venons de décrire; renferme tout l'espace où le tremblement de terre a été très-sensible. Cet espace a du NNE au SSO, de Lure à une lieue de Villestranche, cinquante-cinq lieues; de l'ESO au NNO, de deux lieues au delà d'Orgelet à deux lieues au delà de Montbard, quarante-trois lieues. Il comprend l'espèce de bassin formé au N de notre Ville par les Vosges, à l'O par la chaîne des montagnes de la haute Bourgogne, à l'E par le Mont-Jura, & ouvert au S pour le débouché des dissérentes rivieres qui vont se jeter dans le Rhône.

Cette observation topographique, en nous faisant connoître l'espace dans lequel l'agitation de la terre a été très-sensible, peut nous conduire à la découverte de la cause de ce phénomene; & s'il eût été possible de recueillir, avec plus de détails, tous les faits, peut-être nous eût-elle éclairé avec précision sur le soyer d'où est parti l'ébranlement. Mais nous ne pouvons hasarder à ce sujet que quelques conjectures, & avant de nous y livrer, il nous paroît convenable de fixer les idées

sur la nature de ce phénomene.

Un Savant digne de l'estime publique (1), a cru que tout dépendoit de l'action d'un tonnerre souterrein sur l'air très-chargé d'électricité; qu'il n'y avoit eu qu'une explosion électrique qui avoit ébranlé la terre. Il vou-

<sup>(1)</sup> M. de la Lande dans le Journal de Paris,

loit rassurer la portion du public déjà alarmée par la brume extraordinaire qui depuis long-temps ombrageoit le ciel. Nous applaudissons au motif de son assertion; mais nous présumons que s'il eût eu, de tous les faits, une connoissance aussi précise que nous, il auroit reconnu qu'une explosion électrique déterminée par l'athmosphere, n'a pas causé le bruit que nous avons entendu, la secousse que nous avons éprouvée.

Nous n'ignorons pas que la foudre, dont les roulemens & les effets portent par - tout l'effroi, part aussi souvent de la terre que du ciel, qu'elle est un phénomene de l'électricité, & qu'il y a des explosions électriques athmos-

phériques très-bruyantes.

Nous avons éprouvé en 1761 (1) une explosion de ce genre, qui produisit un bruit à peu près semblable à celui qui a accompagné le tremblement de terre dont nous donnons l'histoire. La description de ce phénomene a été insérée dans le premier volume de nos Mémoires. Mais ce météore, d'abord très-lumineux, lança, lors de son explosion, des slammeches qui embraserent des maisons. Le bruit que cette explosion sit entendre ne sut pas accompagné de l'agitation de la terre: la commotion de l'air sut suivie d'une petite

Cij

<sup>(1)</sup> Voy. le 1<sup>er</sup>. vol. de nos Mémoires publiés en 1769, pag. 42 de l'Histoire.



#### 36 ACADÉMIE

pluie, quoiqu'auparavant le ciel fût si serein;

qu'on n'appercevoit aucun nuage.

Il n'y a eu ici ni lumiere, ni flammeches incendiaires. La petite pluie qui suivit l'explosion, suffit seule pour empêcher d'assimiler, à ce phénomene, celui dont nous nous occupons. Cette pluie étoit un effet nécessaire de la prodigieuse commotion de l'air. On fait que ce fluide violemment comprimé. est forcé d'abandonner l'eau qu'il tient en dissolution, parce que le changement de sa densité diminue sa qualité dissolvante. Si une explosion analogue à celle-ci, eût été la cause de la secousse & du bruit observés le 6 Juillet, il seroit tombé au moins quelques gouttes d'eau, & il n'en est fait mention dans aucune des relations que nous avons sous les yeux. Toutes au contraire s'accordent sur la continuité de la sérénité du ciel & de la tranquillité de l'athmosphere.

Il suffiroit donc de comparer ces phénomenes entre eux, pour être autorisé à affirmer que celui du 6 Juillet n'étoit pas une commotion athmosphérique produite par l'électricité; & tout concourt à prouver qu'il étoit un tremblement de terre. Si quelqu'un pouvoit en douter, nous le prouverions par

différentes circonstances.

Le bruit qui l'a précédé étoit absolument semblable à celui qui a accompagné tous les tremblemens de terre dont l'histoire nous a été conservée. Nous avons parmi nos Académiciens un témoin de ceux qui bouleverferent l'isle St-Domingue en 1753, & qui l'agiterent encore en 1754 & 1755 (1): il a reconnu, dans le bruit qui s'est fait au moment de la secousse, une ressemblance parfaite avec ceux qu'il a entendus lors des tremblemens de terre à Saint-Domingue.

Pour être convaincu que nous avons réellement essuyé un tremblement de terre, il suffit de chercher à se rendre raison des principaux faits observés par des gens dignes de soi.

A quelle autre cause pourroit-on attribuer le mouvement sensible des murs, la chûte des tuiles, l'agitation des meubles & des balances, le renversement des livres, la sonnerie des horloges, l'élévation de l'eau des rivieres, son irruption sur ses bords pendant un calme parfait, enfin, le bercement des gens endormis & couchés sur la prairie à Saint-Jean-de-Lône?

Il est donc certain que l'événement arrivé le 6 Juillet dernier, a été un tremblement de terre; mais c'est sur cette vérité même que nous pouvons établir la sécurité de nos Provinces. L'exposition de la cause du tremblement de terre que nous avons éprouvé, fera voir que si nous pouvons encore sentir trembler sous nos pieds le sol que nous habitons, cette possibilité ne doit pas nous alarmer.

Il faut un concours de circonstances nécesfaires pour produire cette commotion, & ce concours aura très-rarement lieu; d'ailleurs

<sup>(1)</sup> M. Roger.

notre position, & la qualité du terrein de notre Province & des Provinces voisines, doivent nous rassurer. La nature nous a mis à l'abri des désastres que de pareilles secousses ont causés dans des pays moins heureusement situés.

Quoique la cause des tremblemens de terre foit encore le sujet d'un problème difficile à résoudre, l'observation & l'expérience ont sourni aux Physiciens des données, d'après lesquelles on peut hasarder des conjectures.

On fait que les pyrites humectées se décomposent, que le phlogistique alors abandonné de l'acide vitriolique & devenu libre, entre dans une nouvelle combinaison, & forme probablement de la matiere électrique.

On ne connoît pas encore avec précision quelle est la substance qui se combine alors au phlogistique; mais tout nous porte à croire avec M. le Comte de la Cepede, qu'il s'unit à l'eau (1).

Si dans le moment de cette opération chymique faite par la nature, des cavernes souterreines donnent à l'air un libre accès, il ya inflammation & éruption volcaniques; la matiere électriques'échappant par la bouche du volcan, borne ses effets à peu de distance du foyer.

Mais si l'air n'y aborde pas, ou s'il ne s'y trouve qu'en très-petite quantité, il n'y a point d'inslammation; & si des substances

<sup>(1)</sup> Essai sur l'électricité, tom. 2, pag. 53,

idio-électriques s'opposent au libre cours de la matiere qui vient d'être formée, les commotions qu'occasionne son explosion sont terribles, & proportionnées à la quantité de l'amas pyriteux, aux résistances que les minéraux opposent au jeu de l'électricité.

L'effet de cette décomposition des pyrites se rend alors sensible à des distances plus ou moins grandes de l'endroit où elle s'est faite, & la connoissance du jeu de l'électricité facilite l'explication des effets qui en sont le produit.

Il est encore une maniere dont les tremblemens de terre se manisestent dans des endroits très-éloignés, & presque instantanément.

Tout le monde sait avec quelle prodigieuse célérité la matiere électrique se propage, lorsqu'elle rencontre des substances capables de lui servir de conducteur; tout le monde sait qu'elle se porte à des distances infinies, tant que ces conducteurs ne lui manquent pas, & qu'elle sait explosion dès qu'ils sont interrompus.

On peut présumer que si son cours la dirige fur des pyrites déjà disposées par l'humidité à se décomposer, elle déterminera cette décomposition, multipliera les soyers, & grossira le courant de matiere électrique par celle qui se sera formée dans ceux-ci.

On peut se faire une idée de ce phénomene, en se représentant une trainée de poudre dont l'extrêmité est allumée par une étincelle.

C 17

L'inflammation successive & rapide de cette poudre, est une image sidelle de la propagation & des essets de la matiere électrique, dans la circonstance que nous supposons.

En partant de cette théorie appuyée sur les expériences électriques, & sur celle du volcan artificiel de Lémery, formé par un mêlange de soufre & de limaille de fer humectée, & ensoui dans la terre (1), on

Le temps & l'humidité portent probablement ce mêlange de Lémery à l'état pyriteux, du moins en partie, & les pyrites pénétrées par l'humidité, s'échauffent & s'enflamment; c'est une vérité de fait qui ne peut être contestée.

Or, ces phénomenes sont l'effet du phlogistique abandonné par l'acide vitriolique, qui se porte sur les chaux martiales comme sur le ser même; & pour que l'expérience de Lémery pût prêter aux conséqueuces qu'on en a déduites, il suffisoit qu'elle eût offert au source un moyen de décomposition, & au phlogis-

<sup>(1)</sup> M. Rouelle a élevé des doutes sur la légitimité des inductions qu'on a tirées du volcan artificiel de Lémery. Il a pensé que cet Auteur employant, dans son mêlange, du ser pourvu de son phlogistique, tandis que ce métal se trouve très-rarement en cet état dans les entrailles de la terre, & presque toujours en celui de chaux, cette différence devoit empêcher qu'on tirât, de son expérience, l'explication de la formation des volcans. Mais il est facile de résoudre l'objection de ce célèbre Chymiste.

fent pourquoi les tremblemens de terrefont quelquefois accompagnés d'éruptions volcaniques, & fouvent ne le font pas; pourquoi ils font tantôt de prodigieux ravages, & tantôt ne font qu'agiter & foulever plus ou moins le fol; pourquoi la fecousse se propage quelquefois à des distances considérables, semble souvent épargner des endroits particuliers, & finit toujours à des chaînes de montagnes. On voit enfin que les effets des tremblemens de terre sont toujours pro-

tique de cette substance, la facilité de se dégager de l'acide.

D'ailleurs il est très-rare que les chaux martiales naturelles soient absolument dépourvues de phlogistique plusieurs se rapprochent beaucoup de l'état métallique, & cette vérité de fait suffiroit pour anéantir l'objection de Rouelle.

Aussi, malgré les réslexions de ce Savant, auquel la Chymie doit une grande partie de ses progrès, des hommes d'un mérite universellement reconnu n'ont-ils pas hésité de citer l'expérience de Lémery, pour donner une idée de la formation des volcans. M. de Bussion en a fait usage, pag. 293 & 294 du second volume in-12 de son Histoire Naturelle; & M. Macquer, dans l'article pyrites de la nouvelle édit. in-4°. de son Dictionnaire de Chymie, tom. 2, pag. 309, ouvrage qui a paru en 1779, ans après la mort de Rouelle, dont ce célèbre Chymiste, ne pouvoit ignorer les opi-pions.

portionnés à l'intensité de leur cause, & que celle-ci suppose toujours un amas de matieres pyriteuses, & de l'eau à portée d'opérer la

décomposition des pyrites.

En effet, on ne trouve des volcans que dans le voifinage de la mer & dans les isles: ils se sont éteints par-tout, dès que la mer, en se retirant, a cessé de pouvoir les abreuver. Aussi passe-t-il pour constant que les volcans, pour brûler, doivent avoir le pied dans l'eau.

Nous voyons que tant qu'ils brûlent avec constance & avec liberté, la terre n'est point ébranlée, mais que si leur inflammation se ralentit, & si les circonstances dirigent dans leur voisinage ou dans leur soyer une grande quantité d'eau, tout le terrein éprouve des commotions violentes qui s'étendent au loin, & sont des ravages affreux.

Le sol des pays où ces volcans sont allumés, contient beaucoup de pyrites & de sousre; il y en a de très-grande quantité dans tous ceux où les tremblemens de terre sont fréquens & désastreux. La Calabre est remplie de terreins pyriteux & de sousrieres; on y en voit plusieurs qui sont toujours sumans.

Si l'on a quelquefois éprouvé des tremblemens de terre dans les pays méditerranés, ils ont été fouvent l'effet d'une communication d'ébranlement excité par l'explosion d'un foyer très-éloigné; &, lorsqu'ils ont été produits par une cause locale, des inondations considérables arrivées après des pluies abon-

43

dantes & des fontes de neige subites (1), les

ont toujours précédés.

Mais quelqu'ait été la cause de ceux que nous avons éprouvés dans notre Province, ils n'y ont jamais renversé d'édifices, & n'y ont jamais été désastreux. La raison en est que, si notre position ne nous met pas à l'abri des tremblemens de terre par communication d'ébranlement, cet esset doit nécessairement étre assoibli par la longueur du trajet; & que si des causes locales peuvent soulever, agiter le sol que nous habitons, la qualité de ce sol ne peut pas donner lieu à des explosions redoutables.

L'humidité portée à une grande profondeur, étant une des conditions nécessaires de la production des tremblemens de terre, elle doit rarement en déterminer dans nos Provinces.

(1) On trouve des preuves multipliées de cette vétité dans la liste des tremblemens de terre, des éruptions volcaniques, &c. &c. donnée par M. Guenaud de Montbeillard, & insérée dans le sixieme vol. de la collection académique, part, étrange, pag. 488 & suiv.

collection académique, part. étrange, pag. 488 & suiv. Ou y voit aussi que des tremblemens de terre produits, par ces causes, en différens cantons de la Suisse, ont été accompagnés de la ruine de plusieurs édifices, & l'on pourroit en tirer des conséquences peu savorables à ce que j'affirme, du peu de danger auquel expose ce phénomene dans les pays méditerranés. Mais on ne s'y croira pas autorisé, quand on considérera qu'en ces dissérens cantons les montagnes sont très-élevées, les vallons très-resserés, que les pyrites peuvent y être abondantes, & que l'eau y sorme en plusieurs endroits, des lacs très-considérables.



#### A A CADÉMIE

La mer la plus voisine de nous (la Méditerranée) est éloignée d'environ cent lieues, & nous sommes élevés au dessus du niveau de ses

eaux de près de sept cents pieds.

Les inondations seules peuvent donc nous exposer à des tremblemens de terre, mais il saut qu'elles soient continues & très-extraordinaires; il saut encore qu'elles soient suivies d'une sécheresse non moins rare. Les circonstances de celui que nous avons éprouvé en Juillet, en sournissent la preuve; d'ailleurs la nature du terrein de notre Province & de celles qui nous avoisinent, doit nous rassurer sur les esfets que ces agitations de la terre

iont capables de produire.

Il contient, il est vrai, des mines de charbon fossile & de dissérens métaux, notamment de fer; mais tous ces minéraux sont rarement dans l'état pyriteux : on ne trouve presque nulle part du soufre. Si dans les environs de Champlite il y a des pierres qui en contiennent, la gangue qui l'enveloppe, le défend de l'action des agens qui pourroient le décomposer; les alluvions continuelles des montagnes, peuvent avoir entraîné dans les grands valons une quantité considérable de mines de fer, dont une partie de la Province & du Comté de Bourgogne est converte, les avoir enfouies successivement à des profondeurs plus ou moins grandes, & les substances ferrugineuses mêlées, combinées avec du foufre, être passées à l'état pyriteux. La nature n'est jamais inactive dans fes grands atteliers; & suivant la belle remarque du Pline François, le temps est un de ces grands agens, dont les effets ne peuvent pas être compris par l'intelligence bornée de l'homme. Mais il n'y a nulle part d'amas confidérable de substances pyriteuses; mais celles qui par leur combinaison, ou faite, ou prochaine, ont pris ce caractere, sont éparses sur un très-grand espace dans des terres végétales, calcaires, argilleuses, mêlées à des comminutions quartzeuses placées en différens points sous des masses considérables de pierres calcaires, de schites, de granits. Les cavernes souterreines sont très-rares. On ne trouve dans celles qui font connues, que des spats calcaires; & de ces vérités de fait, on doit conclure que la qualité de notre terrein, si prodigieusement différente de celle des fols malheureux où brûlent les volcans, où la terre est si souvent agitée par de violentes secousses, ne doit pas nous faire craindre d'aussi funestes révolutions.

Ces substances susceptibles de l'effervescence volcanique, quelque peu abondantes, quelque éparses qu'elles soient, peuvent cependant l'éprouver, peuvent causer des tremblemens de terre; mais si elles étoient placées à peu de prosondeur, le fluide électrique développé par le mouvement intestin de leur décomposition, s'évaporeroit presqu'au moment de son développement à travers la couche terreuse peu épaisse. Pour que ce fluide puisse agiter sensiblement la terre, il faut que



les matieres d'où il émane, soient prosondément ensouies. Il faut encore que les dissérentes couches qui les recouvrent, aient perdu considérablement de leur propriété conductrice, soient devenues idio-éléctriques, & de ces deux conditions absolument nécessaires résulte la dissiculté de l'effervescence volcanique des substances qui s'en trouvent susceptibles dans nos Provinces; & la rareté des circonstances dans lesquelles les tremblemens de terre peuvent y avoir lieu.

Ces substances doivent être humecées, & l'eau pourra rarement parvenir jusqu'à elles. La couche terreuse qui les recouvre, doit être devenue idio-électrique, & la sécheresse excessive qui pourroit lui enlever sa qualité conductrice, est prodigieusement rare.

La pente énorme du terrein de nos Provinces jusqu'à la mer, facilite l'écoulement des eaux, s'oppose à ce qu'elles y soient souvent retenues assez long-temps sur sa surface pour y pénétrer à de très-grandes prosondeurs; la sécheresse y est trop rarement portée à l'excès pour que la couche extérieure de la terre devienne souvent idio-électrique. Les tremblemens de terre doivent donc être extrêmement rares dans nos Provinces méditerranées, & ne peuvent jamais y être désastreux. Celui que nous venons d'essuyer, consirme cette æthiologie, & caractérise les inductions que nous croyons pouvoir en tirer.

Considérons les circonstances dans lesquelles il s'est fait sentir, & les essets qu'il a pro-

duits, & nous conviendrons que tout le favorisoit, qu'il auroit été plus considérable s'il eût pu l'être, & que ne l'ayant pas été, nous n'avons absolument rien à redouter, dans nos Provinces, de ces phénomenes, si terribles pour les pays qui avoisinent les mers.

Les trois premiers mois de cette année avoient donné près de sept pouces & demi d'eau, tandis qu'année commune, ces mêmes mois n'en donnent qu'un peu plus de cinq pouces (1). Le mois d'Avril a été sec, mais celui de Mai a été si pluvieux, que lui seul a fourni six pouces deux tiers de ligne d'eau, tandis qu'il n'en tombe ordinairement que deux pouces dans le même espace de temps. Ajoutons à ces remarques, que les neiges avoient été très-abondantes dans les montagnes; que les chaleurs prématurées du mois d'Avril en avoient accéléré la fonte; que l'écoulement de cette énorme quantité d'eau n'a pu se faire promptement, & qu'il y a eu en Mai & en Juin des inondations confidérables & de longue durée.

L'eau long-temps arrêtée a dû nécessairement pénétrer la terre à de très-grandes profondeurs, a dû conséquemment humester les couches des substances susceptibles de l'effervescence volcanique, & développer une trèsgrande quantité de matiere électrique. La sécheresse de la fin de Juin & des premiers

<sup>(1)</sup> Voy. le second Sémestre de nos nouveaux Mémoires, pag. 195.

jours de Juillet, s'est opposée à l'évaporation successive & tranquille de ce sluide; en diminuant excessivement la qualité conductrice de la croûte superficielle de la terre.

Si l'on pouvoit résister à la force des inductions que nous nous croyons en droit de tirer de tous ces faits, nous pourrions dire

avec avantage.

Observez que les effets les plus sensibles du tremblement de terre se sont manifestés dans les environs des grandes rivieres, sur les bords de l'Ains, du Doubs & de la Saone, dans les bas fonds de ce bassin que nous avons décrit, où se rendent les eaux des montagnes qui le terminent, & où toutes ces eaux ont fait un très-long séjour; & vous conclurez avec nous, que tout se réunissoit pour déterminer la décomposition des couches pyriteuses, pour occasionner une production considérable de matiere électrique, pour la condenser dans la terre, & nécessiter une explosion de cette matiere, un tremblement de terre. Son foyer n'a pas été unique, il s'en est trouvé probablement dans chaque partie de ce bassin, où coulent les trois grandes rivieres que nous avons défignées. Si cette explosion n'a produit aucun bouleversement fâcheux, c'est que son énergie est toujours proportionnée à la quantité de substances effervescentes, & qu'elle est trop peu considérable dans nos provinces pour que le mouvement intestin de ces substances puisse donner lieu à une explosion plus énergique.

On demandera peut-être pourquoi les différens foyers que nous supposons, ont fait trembler la terre au même instant? Pourquoi la secousse s'est fait sentir à de très-grandes distances de ces soyers? Pourquoi sa direction a paru être du NNE au SSO?

Nous croyons pouvoir répondre à la premiere question, que l'uniformité de la durée du temps employé à préparer l'action des

du temps employé à préparer l'action des causes de ce phénomene, l'uniformité des circonstances dans lesquelles l'explosion s'est faite, a dû nécessairement en rendre les effets

fimultanés.

Les détails théoriques dans lesquels nous sommes entrés, doivent servir de réponse à la seconde : l'explosion d'un seul soyer a probablement déterminé celles des autres; la communication des conducteurs a probablement porté l'ébranlement à de très-grandes distances de ces soyers, & cette supposition nous paroît devoir être d'autant plus satisfaisante, qu'on a vu les secousses diminuer d'intensité à proportion de l'éloignement des soyers indiqués, & s'étendre insensiblement au delà de la ligne dont nous avons circonscrit l'espace, où le tremblement de terre s'est le plus vivement sait sentir.

Quant à la direction des secousses, nous pensons que pour en rendre raison, il suffit de considérer que le bassin où nous sommes autorisés à placer les soyers de ce tremble-

## SO ACADÉMIE

ment de terre, est ouvert dans la direction du NNE au SSO.

Il est donc certain que le phénomene du 6 suillet n'est point une simple commotion électrique de l'athmosphere, mais un vrai tremblement de terre.

Il n'est pas moins sûr que cette agitation du sol a été aussi considérable qu'il est possible qu'elle le soit jamais; que la situation de nos Provinces, la qualité de leur sol, nous mettent à l'abri des sunestes révolutions dont les isles & les pays voisins de la mer sont si souvent le théatre esfrayant. Qu'ainsi redouter un sort pareil à celui des infortunés habitans de ces contrées, c'est visiblement se frapper d'une terreur panique. Si les motifs de se rassurer, que nous venons de développer, ne nous rendoient pas la sécurité qu'ils doivent inspirer, l'histoire devroit achever de dissiper toutes nos craintes.

M. Guenaud de Montbeillard a donné (1) une liste chronologique des tremblemens de terre dont l'histoire a conservé le souvenir. Elle commence à l'an 2312 avant l'ere chrétienne, & finit en l'année 1760 de cette ere. On y trouve la notice de plusieurs milliers de phénomenes de cette espèce; & parmi ces notices il n'y en a que deux qui aient eu lieu dans notre Province; l'un en 1682, l'autre

<sup>(1)</sup> Collect. Acad. partie étrangère, tom. VI, p. 488 & suiv.

en 1755. Nous ignorons la cause du premier, mais le second parut être l'effet d'un soyer très-éloigné.

Nous pouvons y en ajouter un qu'on ne sentit que soiblement en 1780 dans cette ville, mais qui sut très-sensible dans nos montagnes au NO. Or, tous ces tremblemens n'ont pas occasionné le plus léger dérangement dans les édifices les plus ruineux.

Si nous rapprochons ces faits de tout ce que nous avons déjà exposé, quelle est la personne raisonnable qui ne dira pas avec nous: les tremblemens de terre doivent être très-rares dans nos Provinces; ils n'y ont jamais produit de désastre; on ne peut donc pas craindre qu'ils y en occasionnent dans la suite.

Cette opinion que nous desirons voir s'accréditer pour la tranquillité publique, est déjà très-anciennement établie. Paul Jove, qui écrivoit dans le commencement du seizieme siècle, conseilloit à ceux qui craignoient les tremblemens de terre, d'aller habiter les Gaules. Notre Province & les voisines en faisoient partie. L'opinion de cet Auteur ne pouvoit être née que de l'opinion générale, elle doit donc faire impression; & réunie à nos réslexions sur l'heureuse situation de nos contrées, elle doit rassurer nos concitoyens, & ne permettre à personne de redouter en ce pays-ci le sort des Messinois & des Calabrois.

# MEMOIRE SUR LE PESE-LIQUEUR

Approprié à la cuite du vin de cannes, & la maniere de s'en servir.

PAR M. DE MORVEAU.

JEUS occasion, il y quelques années, d'introduire l'usage du pese-liqueur dans une rafinerie de sucre (1). Les avantages soutenus de cette méthode l'ont fait passer dans d'autres établissemens du même genre, & on a pensé, d'après cela, que cet instrument pourroit être également utile & commode pour juger le degré de cuisson du vezout, ou vin de cannes. Dès que cette idée m'a été communiquée, je me suis engagé bien volontiers à seconder, de tout mon pouvoir, ces vues d'émulation, & à faire exécuter, sous mes yeux, les instrumens destinés aux premiers essais. La chymie tire sa principale gloire des lumieres qu'elle porte dans les atteliers des arts. J'espere que le travail que j'ai fait

<sup>(1)</sup> Voy. opuscules phys. & chym. de M. Bergman, édit. franç. tom. 1, pag. 332.

à ce sujet, pourra procurer quelqu'avantage aux estimables colons qui me l'ont demandé: pour qu'ils puissent en tirer tout le fruit que je me suis promis, je crois devoir exposer, 1°. les motifs qui me l'ont fait entreprendre; 2°. les principes que j'ai suivis pour la construction de cet instrument; 3°. la maniere d'en faire de tout semblables; 4°. la maniere de s'en servir.

# S. Ier.

Lorsque j'appropriai le pese-liqueur à une rafinerie, j'étois libre d'opérer dans la chaudiere même où l'on rafinoit; je n'avois alors d'autre objet que de tracer sur l'instrument le point où il se trouveroit enfoncé, au moment précis où le Maître Rafineur jugeroit. à sa maniere ordinaire, que la cuite étoit au degré; parce que ce moment ayant été une fois bien choisi, & ce choix vérisié par le produit de la cuite, l'instrument auquel ie l'avois confié ne pouvoit manquer de l'indiquer pour toutes les cuites successives, même en l'absence du Rafineur, & d'une maniere moins sujette à varier que les épreuves de la goutte filant sur l'ongle, puisque celle-ci est sujette à toutes les vicissitudes de l'athmosphere, telles que la pesanteur, la chaleur, la sécheresse, l'agitation, &c. au lieu que la premiere avoit pour base le degré de concentration de la liqueur, qui constituoit lui-



même, par défaut ou par excès, la bonne ou la mauvaise cuite.

Je n'eus donc autre chose à faire qu'à porter dans la chaudiere un pese-liqueur que je pus lester à volonté, pour qu'il se tint perpendiculairement sans tomber au fond, & néanmoins la boule enfoncée sous la surface du liquide, & à attendre l'événement de la cuite; l'objet du propriétaire de la manusacture étoit

rempli par ce simple tâtonnement.

Il n'en est pas de même par rapport au vin de cannes. Premierement, je ne suis pas à portée de suivre la même marche; en second lieu, quand je le pourrois, j'aurois toujours l'ambition de donner cette fois au pese-liqueur des sucres, une graduation réguliere assujettie à des principes; telle, en un mot, que l'étalon perdu, on pût le retrouver sans nouveaux tâtonnemens. Si les circonstances m'eussent décidé à travailler d'abord sur ce plan, je n'aurois pas eu à regretter aujourd'hui de ne pouvoir me procurer un seul de ces instrumens sur lesquels j'ai autrefois tracé la routine des Rafineurs; il n'en faut pas davantage pour en faire fentir l'utilité : il est aisé de concevoir enfin, que le pese-liqueur pour les sucres, une sois gradué méthodiquement, le fruit qu'on s'en promet fera plus affuré, plus général & plus communicable. Je passe à l'exposition des principes que j'ai suivis dans cette division.

#### S. I I.

1°. L'aréometre ou pese-liqueur est un instrument que les Physiciens ont imaginé pour connoître, d'une maniere prompte & assez exacte, le poids des liquides, suivant la loi de l'équilibre; il s'y ensonce d'autant plus, qu'il est plus léger, d'autant moins qu'il est plus pesant; il ne s'y arrête que quand il a déplacé un volume dont le poids est égal au sien.

2°. L'eau pure pese moins qu'une eau chargée d'un sel quelconque, & sa pesanteur croît en proportion de ce qu'elle en tient plus en dissolution: le pese-liqueur suivra nécessairement cette progression; il s'ensoncera plus dans une dissolution peu chargée, moins dans une dissolution très - chargée; il peut donc servir à juger la concentration, qui n'est ellemême physiquement qu'une différence de pesanteur spécifique, c'est-à-dire, une dissérence de rapport entre le poids & le volume.

3°. La cuisson d'une liqueur, quelle qu'elle soit, n'a d'autre objet, ne peut produire d'autre esset, ni physiquement, ni chymiquement, que de favoriser la dissolution, de procurer, par l'action de la chaleur, une réaction plus sorte des parties Jes unes sur les autres, d'obtenir des combinaisons, des mêlanges plus intimes, ou enfin, d'évaporer les parties volatiles pour rapprocher les parties les plus sixes. Or, dans tous ces cas, il y a changement de pesanteur spé-

D iv



cifique; la liqueur qui reste, étant plus concentrée, pese davantage sous un égal volume: le pese-liqueur peut donc servir à déterminer

le point de cuisson.

J'insiste sur ces notions préliminaires, parce qu'elles me serviront à lever un doute qui se présente tout naturellement, & qui m'a déjà été proposé; savoir, si la cuisson du vin de cannes peut être réglée par les mêmes principes & de la même maniere que la cuisson du sucre rafiné. On verra clairement dans la suite, que la méthode & l'instrument se prêtent très-bien à mettre la différence qui doit réellement exister entre les deux produits.

4°. Pour graduer réguliérement un peseliqueur pour les sels, on en fait dissoudre des quantités proportionnelles, comme des centiemes, dans une quantité donnée d'eau pure, à une température déterminée; on y plonge à chaque sois l'instrument, & on marque sur la tige, au point où il s'arrête, le nombre des parties de sel qui le soutiennent à ce degré d'élévation; tellement que le n°. I indique que sur 100 parties de liqueur, il y a 99 parties d'eau & 1 de sel; le n°. 12, qu'il y a 88 parties d'eau & 12 de sel, & ainsi des autres degrés. Voilà la méthode ordinaire, & qui remplit parsaitement l'objet qu'on se propose.

J'ai d'abord cherché à l'approprier aux sucres, & l'expérience m'a fait voir que cela étoit impossible. En esset, quoique le sucre soit un sel, il dissere, non-seulement des sels

proprement dits, mais même de plupart des sels essentiels ( qui est sa véritable classe), par la proprieté de se dissoudre à l'aide de la chaleur, par l'eau seule de sa crystallisation, c'est-à-dire, par celle qu'il retient lorsqu'il est sous forme concrete & solide; d'où il résulte, 1°. que le pese-liqueur donne une dissérence à chaud & à froid, qui n'a nul rapport avec celle des autres dissolutions. 2°. Qu'en l'appropriant à la cuite des sucres, il faudroit donner à cet instrument environ deux pieds de hauteur de tige, sans que sa pesanteur excédât une demi-livre, pour commencer la graduation par l'unité, ce qui deviendroit impraticable.

La raison qui me faisoit desirer de suivre la méthode ordinaire, est que le pese-liqueur ainsi gradué, auroit pu servir en même temps à estimer toute dissolution de sucre, quelque foible qu'elle pût être, & que, par ce moyen, on auroit pu l'appliquer à juger le vezout lui-même, au moment où il est exprimé de la canne, dont je ne connois point du tout le rapport de densité, mais qui doit être, à ce que je présume, comme tous les autres sucs végétaux, plus ou moins riche en sel, plus ou moins pauvre & aqueux dans les différentes récoltes, & suivant que les saisons ont été plus ou moins favorables à la végétation; ce qu'il seroit probablement utile de connoître avant de travailler cette matiere, & pour en diriger l'opération. Au reste, comme il ne s'agiroit ici que d'une simple comparaison,



elle peut se faire avec tout pese-liqueur qui se soutiendra dans ce sluide, & j'ai compris qu'il valoit mieux assurer l'usage de cet instrument pour l'objet principal, que de chercher à l'étendre.

5°. Après plusieurs essais saits par comparaison, tant sur le sucre brut que sur le sucre rafiné du commerce, dans des dissolutions plus ou moins chargées & poussées à dissérens degrés de cuite, j'ai reconnu qu'un pese-liqueur destiné à marquer le point de cuisson dans la chaudiere même, à un bouillon de 82 à 84 degrés de chaleur du thermometre de Réaumur, ne devoit pas s'y soutenir, à moins que le rapport du sel à l'eau ne sût à peu près de 75 à 25, c'est-à-dire, qu'il y eût 75 livres de sucre pour 25 livres d'eau de dissolution.

Delà j'ai conclu que le pese-liqueur des sucres devoit être gradue d'une maniere inverse des autres pese-liqueurs; que les nombres, pour plus de clarté, devoient indiquer les parties d'eau & non de sel; ensin, que le terme de zéro, ou de privation de toute eau de dissolution, comme extrême de cuisson, devoit être placé au bas de la tige, & tout près de la boule.

Cette premiere idée arrêtée, j'ai opéré avec le pese-liqueur destiné à servir d'étalon, tant sur le sucre brut & non terré, que sur le sucre rasiné du commerce : j'ai suivi les progrès de l'évaporation par l'ébullition, au moyen d'une chaudiere suspendue au sléau d'une balance, qui m'indiquoit de moment en moment la quantité d'eau qui étoit volatilisée, & celle qui restoit encore. J'ai forcé la cuite à 87 degrés du thermometre, & jusqu'à faire partir toute l'eau de dissolution, non du sucre rafiné, on verra que cela ne seroit pas possible, mais du sucre brut qui en retient un peu plus; & quand la pesée de tout l'appareil m'indiqua ce terme, je marquai tout de suite le point de zéro sur l'étalon; i'observerai qu'il me fut annoncé, d'une maniere très-sensible, par l'odeur forte de caramel qui s'exhala en même temps, & qui ne me permit pas de douter que le sucre commençoit à perdre une partie de son eau de crystallisation, & que la chaleur agissant sur son huile, en opéroit la décompolition.

Pour avoir l'autre terme extrême du peseliqueur, je préparai dans la même chaudiere portée par une balance, une dissolution dans laquelle cet instrument se précipitoit au sond par son poids, & je sis concentrer par l'ébullition, que je soutins entre 82 & 84 degrés du thermometre, jusqu'à ce qu'il se relevât de lui-même, & portât le bout de sa tige quelques lignes au dessus de la surface de la liqueur : dès qu'il sut sorti, je ne continuai plus l'évaporation que pour arriver, le plus près possible, à un poids qui se rapportât à un nombre commode pour la division de l'échelle; alors j'arrêtai tout de suite l'ébullition, en enle-



vant la chaudiere de dessus le seu & la couvrant. La pesée m'ayant indiqué avec assez de précision l'eau restante, dans le rapport de 25 pour 75 de sucre, ce nombre de 25 fut marqué sur l'étalon à l'endroit où il se

soutenoit au moment de la pesée.

On sait que les pese-liqueurs donnent des degrés différens, suivant la température, parce qu'elle change réellement le volume des liqueurs. J'avois dejà eu occasion de remarquer, dans quelques essais, que cette différence devoit être plus considérable dans la dissolution de sucre, que dans la dissolution d'aucun autre sel, sans doute par la facilité avec laquelle elle se gonfle & écume en bouillonnant; mais je ne fus pas moins surpris de la trouver aussi prodigieuse dans la liqueur dont je viens de parler, & qui m'avoit donné sur l'étalon le nombre 25: aussi-tôt qu'elle sut parsaitement refroidie à la température ( qui étoit, à la vérité, ce jour là à un demi-degré au dessus de zéro du thermometre), j'observai le pese-liqueur étalon que j'y avois laissé, je marquai le point auquel il s'étoit arrêté, & je trouvai qu'il répondoit exactement à  $\frac{13}{25}$  de l'espace renfermé entre les deux extrêmes zéro & 25, c'est-à-dire, qu'il étoit remonté de 12 degrés.

Je crus devoir profiter de cette circonstance pour assurer ce point de division sur les six pese-liqueurs que j'avois à graduer, en les plongeant successivement dans cette liqueur froide, comme ils l'avoient été dans les li-



#### DE DIJON, 1783.

61

queurs qui avoient donné les termes de zéro

& de 25.

Ainsi les pese-liqueurs gradués & divisés, suivant la méthode que je viens d'exposer, indiquent, par centiemes parties du tout, la quantité d'eau qui est actuellement dans une dissolution de sucre, à la chaleur de l'ébullition ou de 82 à 84 degrés du thermometre. Comme c'est l'eau & non le sucre qui diminue dans l'opération de la cuite, & que son succès dépend uniquement de la condition d'atteindre le juste point de cette diminution sans l'outre-passer; il m'a paru qu'en écrivant sur l'instrument les quantités progressives de cette diminution jusqu'à zero, ce seroit lui donner dans la forme la plus simple, la plus claire, la plus commode, toute l'expression dont il est susceptible.

La marche que j'ai suivie pour obtenir cette division, est sans doute embarrassante pour les appareils, longue par les tâtonnemens, & même difficile dans l'exécution; mais tout ce travail étoit indispensable pour connoître la nature particuliere des matieres, pour assure le jeu de l'instrument dans les mêmes circonstances où il doit servir; les principes mêmes qui sont établis par ces expériences, indiquent un procédé plus facile, & qui suffira désormais pour construire de semblables pese-liqueurs sans avoir besoin d'étalon, & à supposer qu'il sût perdu.

# S. III.

Maniere de construire les pese-liqueurs comparables pour la cuite des sucres.

On prépare un instrument dans la forme des pese-liqueurs ordinaires, seulement un peu plus gros, asin qu'on puisse lire plus commodément les divisions, lorsqu'il flotte dans la chaudiere, environné de vapeurs; je donne à la grosse boule environ 30 lignes de diametre, 14 à la petite, 5 lignes de diametre à la tige; cette tige a de longueur entre 6 pouces \( \frac{1}{3} \) & 7 pouces au dessus de la grande boule, \( \frac{1}{3} \) il y a un morceau de tige pareille de 1 pouce de longueur entre les deux boules.

Ce pese-liqueur doit être de métal pour résister à la chaleur de l'ébullition, & assez solide pour ne pas se bosseler trop facilement, ce qui en changeroit absolument le rapport.

La tige doit être bien calibrée, on peut la faire traverser la grosse boule, c'est même une très-bonne pratique pour être sûr qu'elle garde la ligne à plomb, ce qui est nécessaire, & que l'on a peine à obtenir autrement des ouvriers.

Une autre condition tout aussi essentielle, c'est que ce pese-liqueur ait un rapport de pesanteur avec son volume, sans quoi il seroit impossible de le graduer, sur-tout s'il étoit trop lourd, parce qu'il se précipiteroit dans les liqueurs où il doit se soutenir. On peut lui donner jusqu'à 8 onces environ de

poids dans les dimensions ci-dessus indiquées, au moyen desquelles il déplace un volume de liquide égal à 7 ½ pouces cubiques, ou à peu près 5 onces d'eau; mais il vaut bien mieux que le poids de la matiere de l'instrument soit réellement plus foible d'une once ou même d'une once & demie, parce que cela donne la facilité de le charger, au point qu'on le desire, avec de la cendrée de plomb que l'on introduit par le dessus de la tige, & que ce poids ajouté forme dans la boule insérieure un lest nécessaire, qui maintient l'instrument dans la situation perpendiculaire.

L'instrument ainsi préparé, on fait dissoudre à froid 75 parties, en poids, de sucre rafiné du commerce, dans 25 parties d'eau de pluie, à la température de 10 degrés. Cette dissolution se fait à froid, parce que la chaleur occasionneroit une évaporation qui changeroit le rapport, & mettroit dans la nécessité de recourir à l'appareil de la chaudiere-balance, aux tâtonnemens, aux calculs embarrassans, dont j'ai parlé plus haut. Cette disfolution se fait très-bien à l'aide du temps & d'un peu d'agitation dans une bouteille bouchée. On doit éviter de prendre du sucre forcé à la cuite de rafinerie, & le bas des pains qui est communément plus serré & plus dur à fondre.

On présente l'instrument dans cette liqueur, & s'il s'y soutient, en s'élevant seulement de 3 à 4 lignes au dessus de la surface, étant chargé de la piece qui doit sermer le bout de



la tige, il est lesté au point convenable; on soude alors cette piece, on replonge le peseliqueur, & le point où il s'arrête, donne le premier terme de l'échelle de division ou le 25°. degré.

Pour avoir le second terme, on prépare, de la même maniere, une dissolution de 88 parties, en poids, de même sucre, dans 12 parties d'eau de pluie. On y plonge le peseliqueur, & le point où il s'arrête, donne ce

second terme ou le 12°. degré.

Il ne reste donc plus qu'à diviser, en 12 parties égales, l'espace intermédiaire entre ces deux termes; ces parties donneront la valeur du degré que l'on reportera en descendant le long de la tige jusqu'à zero; & si cette tige est par-tout de la même grosseur, les degrés seront aussi justes qu'on peut le desirer.

Je fais écrire ces degrés à côté de la divifion, seulement de 5 en 5 dans la partie supérieure, & d'unité en unité pour les cinq inférieurs jusqu'à zero, parce que c'est là que l'on sera plus souvent dans le cas de les suivre & de les compter avec exactitude.

Si on craignoit que la différente qualité des sucres rafinés pût jeter quelqu'incertitude sur la graduation de ces pese-liqueurs, & qu'on ne sût pas à portée de les étalonner sur un autre, on pourroit y suppléer facilement par le pese-liqueur des sels de M. Baumé, dont les principes de division sont bien connus, & qui est aujourd'hui entre les mains de tout le

monde. J'ai observé que ce pese-liqueur des sels marquoit 33 degrés dans la liqueur qui donne le 25°, des sucres, & 37 dans la liqueur qui régle le second terme de notre division.

Cette observation fournit ici une nouvelle preuve bien frappante de ce que j'ai dit de l'abondance d'eau de crystallisation dans le sucre, & de la nécessité de trouver un système de graduation approprié à sa nature; car il est évident qu'il s'en faut près de moitié qu'il n'augmente la densité de l'eau qui le dissout dans la même proportion que les autres sels.

# S. I V.

DE la maniere d'employer ce pese-liqueur pour juger la cuite des sucres.

Il ne faut pas perdre de vue ce que j'ai précédemment établi.

1º. Que quel que soit l'effet de la cuisson des sucres, cet esset est toujours nécessairement dans une proportion qui correspond exactement à la concentration de la liqueur par l'évaporation de l'eau.

2°. Que le pese-liqueur indique d'une maniere constante & sans erreur, les progrès de cette évaporation, par la hauteur à laquelle il s'éleve en sortant du liquide, à mesure que sa densité augmente.

3°. Que les degrés du pese-liqueur appro-

prié au sucre, indiquent, par centiemes, l'eau qui existe dans une quantité quelconque de dissolution; c'est-à-dire, que si le pese-liqueur s'arrête, par exemple, à 15 degrés, on doit conclure que sur 100 parties du liquide, il y en a 85 de sucre & seulement 15 d'eau; que s'il s'arrête à 4 degrés, on conclura de même qu'il y a 96 parties de sucre, & seulement 4 d'eau; & ainsi de tous les autres degrés.

Il ne reste donc plus à présent qu'à déterminer quel est le degré de ce pese-liqueur que l'on doit prendre pour signe du meilleur point de cuisson; je me hasarderois de le sixer, si cela étoit nécessaire, d'après les seuls essais que j'ai en occasion de faire, & les vues de théorie qu'ils m'ont fournies, & je suis persuadé que je ne m'écarterois pas beaucoup de la vérité; cependant l'expérience peut le donner avec encore plus de certitude, il faut la laisser prononcer, & j'aime mieux me borner à la diriger: c'est ce que je ferai dans un instant, après avoir proposé une distinction essentielle entre la premiere cuite du sucre & la cuite du rasinage.

Cette distinction que j'ai annoncée dans la premiere partie de ce Mémoire, comme devant lever tous les doutes, que le même instrument pût servir à la cuite de la moscouade comme du sucre rafiné, est fondée sur une expérience bien simple. Que l'on fasse dissoudre dans la même quantité d'eau un poids égal de sucre brut & de sucre rafiné, & qu'on y plonge le pese-liqueur, il ne don-

nera pas le même degré, & la différence sera à peu près dans le rapport de 15 à 17, même en faisant état des impuretés que le sucre brut auroit pu contenir, & qui ne se seroient pas dissoutes. Il est donc certain que la premiere cuite doit laisser quelques parties d'eau de plus, & la derniere quelques parties de moins, ou, si l'on veut, que le premier bouillon doit retenir plus de parties moins denses que le sucre, qu'elles soient aqueuses ou d'autre nature. Or, puisque le pese-liqueur sert précisément à indiquer ces différentes proportions de densité, il doit donner, à des degrés différens, le juste point de l'une ou de l'antre cuite. Cette conclusion est absolument indépendante des questions de savoir si le vezout n'est au sortir de la canne, que du sucre crystallisable dissous dans l'eau, ou s'il faut en séparer quelques parties pour obtenir la crystallisation? s'il tient, ou non, un acide développé qu'il faille enchaîner? s'il y a quelque principe huileux que l'on soit obligé de porter à l'état de savon pour en débarrasser le sel essentiel? enfin, si ce que l'on nomme firop y existe naturellement, ou s'il n'est que le produit de l'altération du sucre même, par le feu? Tous ces problêmes intéressent l'art, sans doute, & je me propose de m'en occuper pour son utilité; mais leur résolution exige un autre travail; j'aurai, à ce qu'il me semble, rendu celui-ci aussi complet qu'il est possible, en dirigeant l'observation qui doit fixer irrévoçablement le point de cuisson du sucre brut.

La premiere fois que l'on voudra faire usage du pese-liqueur, on le plongera dans la derniere chaudiere appellée la batterie, & on conduira au surplus l'opération comme à l'ordinaire. Il pourra arriver que le pese-liqueur tombe au fond, sur-tout si on le place dès le commencement; mais on ne doit pas s'en inquiéter, il remontera de lui-même à mesure que la cuite avancera, & viendra flotter à la surface du bouillon. Le chef-ouvrier n'y fera pas attention, il poussera le seu, jettera la lessive, remuera, levera les écumes, prendra la cuite, fera, en un mot, tout ce qu'il a coutume de faire; mais au moment qu'il jugera la cuite à son point, on observera avec attention le degré d'enfoncement du pese-liqueur, c'est-à-dire, la division qui se trouvera répondre exactement à la surface de la liqueur, & on tiendra note du nombre de cette division.

Le bouillonnement continuel & violent pourra d'abord paroître un obstacle à ce que l'on saissiffe ce point avec précision; mais on s'appercevra bientôt que l'instrument ne varie pas sensiblement, & qu'il ne fait que suivre le mouvement de la surface; on acquerra donc sacilement, & en peu de temps, l'habitude de le juger, comme cela se pratique aujour-d'hui en France, dans les chaudieres de rafinerie où cette circonstance est absolument la même.

On aura attention de mettre séparément le produit de la cuite qui aura servi à cette

épreuve, pour examiner le sucre qu'elle donnera. Si la cuite avoit été mal jugée, que le sucre sût brûlé, ou qu'il y restât trop de sirop après le resroidissement, on conçoit que le nombre observé sur le pese-liqueur, ne seroit pas le point convenable; il faudroit donc recommencer ce tâtonnement jusqu'à ce que l'on eût observé & noté l'élévation de l'instrument dans une chaudiere dont la cuite se trouvât aussi parfaite qu'on peut le desirer.

Quand on y sera une fois parvenu, le peseliqueur sera réglé pour toujours, il suffira de retenir le nombre de sa division qui se sera trouvé correspondre au niveau du bouillon où il étoit plongé, on sera sûr que toutes les cuites poussées & arrêtées au même point, seront aussi parfaites. Supposons que ce nombre soit 3 ou même 3 ½, car le ½ degré sera encore assez sensible & peut-être important; on dira théoriquement que la perfection de ce genre de cuite consiste à y laisser 3 ½ centiémes d'eau; on dira dans la pratique qu'il faut la continuer jusqu'à ce que le pese-liqueur s'éleve à 3 ½ degrés, & pas au-delà; on aura l'avantage enfin de pouvoir construire, même sans étalon, des instrumens pareils, qui, mis à la main de l'ouvrier le plus novice, le rendront en un instant le rafineur le plus expert, en l'avertissant seulement que sa cuite doit être à 3 ½, ou tel autre nombre qui sera trouvé par l'observation.

# MÉMOIRE

SUR un acide particulier (1) découvert dans le ver-à-soie, avec des observations sur l'origine, le siege de cet acide, la maniere de le préparer & de le conserver.

#### PAR M. CHAUSSIER.

E desir de connoître plus particulierement les effets de l'électricité, de la lumiere, de la chaleur & des gas sur les vers-à-soie, me détermina en 1781 à élever une certaine quantité de ces insectes précieux à notre luxe. Parvenus à leur dernier âge, plusieurs s'échapperent de l'attelier, sans qu'on s'en apperçût, gagnerent un cabinet voisin, y filerent paisiblement leur soie, se convertirent en chrysalides, se changerent en papillons. Quelque temps après leur évasion, parcourant

<sup>(1)</sup> Dans nos Cours publics de Chymie à l'Académie, j'ai traité de cet acide comme dissolvant, sous le nom d'acide bombicin, & M. de Morveau l'a compris dans la table d'affinités qu'il destine à la nouvelle encyclopédie.

mon cabinet, je fus fort étonné d'y voir plusieurs feuilles de papier bleu & des drapeaux de tournesol, tachés en rouge & altérés comme s'ils eussent été touchés par un acide qu'on y auroit lancé par jets, ou fait tomber gourte à goutte. Cet accident excita mon attention; & voyant plusieurs papillons répandus dans mon cabinet, quelques-uns attachés encore aux feuilles de papier bleu, je soupçonnai que ces insectes contenoient une liqueur acide, nécesfaire fans doute à quelque fonction, & qu'ils répandoient lors de leur métamorphole en papillons. Mon soupçon ne tarda pas à être changé en certitude; car ayant encore trouvé quelques chrysalides, je les enfermai dans des cornets de papier bleu, & dans le temps de leur métamorphose en papillons, j'observai les corners mouillés & leur couleur altérée en rouge. Cet essai, si simple & si facile, prouvoit donc déjà clairement l'existence d'un acide libre & développé, mais il fallut se borner à ce premier apperçu. La faison étoit trop avancée pour trouver encore des chryfalides, & faire de nouvelles expériences.

Me proposant de revenir un jour sur cet objet qui me paroissoit intéressant, je parcourus ce que les Naturalistes ont écrit sur le ver-à-soie, mais je n'y trouvai point les éclaircissement que je cherchois; seulement je vis que M. l'Abbé Boisser de Sauvages, à qui nous devons de fort bons mémoires sur l'éducation des vers - à soie, avoit, en deux endroits de son provage, parlé d'acide

72 dans ces insectes. 1°. à la page 12 de son premier mémoire, en indiquant les précautions néceffaires pour conserver & transporter la graine des vers-à-soie, il rapporte qu'on en avoit envoyé plusieurs fois à l'Isle de Bourbon, enfermée dans des boîtes de fer blanc, mais toujours sans succès : a lorsqu'elles arrivoient » à l'Isle de Bourbon, & qu'on ouvroit la » boîte, on étoit saisi d'une forte odeur d'ai-» gre, causée par une effervescence de la trans-» piration de la graine, qui avoit croupi tout » autour, & qui en annonçoit l'altération. » 2°. A la pag. 78 de son troisieme mémoire, en traitant de la maladie de ces insectes, que l'on nomme muscardine; » il seroit difficile » (continue notre Auteur) d'en deviner la » cause; je sais seulement qu'ayant eu la cu-» riosité de goûter du bout de la langue, » l'humeur d'un muscardin que j'avois coupé » en deux, & qui commençoit à durcir, j'y » trouvai une forte acidité; d'où je soupçon-» nerois que la température chaude & humide » pourroit faire développer dans le corps de » l'animal, cet acide qu'on n'y sent point dans " l'état de santé, lequel aigrit & coagule ses 4 humeurs. »

Ces observations de M. de Sauvages sont Curieuses & intéressantes, mais elles ne démontrent pas l'existence d'un acide naturel à ces insectes; il paroît au contraire, d'après les passages cités, que notre savant observateur regardoit toujours l'acide qu'il avoit apperçu dans les muscardins & dans la graine

entaffée, comme un accident particulier; comme un état de maladie & d'altération étrangere à l'organisation de l'insecte, & certainement il avoit grande raison pour les cas dont il fait mention; mais en même temps nous devons ajouter, ce qui est bien dissérent des observations de M. de Sauvages, que dans tous les temps de la vie de l'insecte, il existe le principe prochain de l'acide; mais que dans l'état de chrysalide, cet acide est tout formé, libre, & déposé dans un réservoir particulier.

Pour faire mieux entendre ce que j'ai à dire sur l'origine, la nature & le réservoir de cet acide, j'exposerai en peu de mots la structure intérieure du ver-à-soie dans ses dissérens états, car ses organes se développent successivement d'une maniere bien admirable, suivant les dissérentes sonctions qu'il doit remplir. Je me bornerai à décrire les visceres de l'abdomen, parce qu'à la grosseur près, la tête n'éprouve aucun changement

remarquable.

Lorsque l'insecte sort de l'œus, il a tous les organes nécessaires pour respirer, chercher sa nourriture, la digérer. Sa peau est un sac musculo-membraneux, au milieu duques on n'apperçoit encore qu'un estomac ou boyau aussi long que le corps de l'insecte. Il commence à la bouche par un tuyau étroit & sort court, qui s'élargit tout-à-coup, & conserve ensuite la même capacité jusqu'aux environs de l'anus. Là ce viscere se resserce &

74

forme deux poches continues ou cellules que l'on pourroit avec grande raison comparer au colon des grands animaux. Les parois de ce viscere sont formées par une membrane affez sorte, garnie de sibres musculeuses, percée de petits pores qui versent sensiblement une liqueur claire, legérement muqueuse, propre sans doute à délayer les alimens, & à en fa-

ciliter la digestion.

L'espace qui se trouve entre la peau & l'estomac, est rempli par un tissu spongieux, mol, siexible, formé d'une infinité de filets délicats, de petites vésicules qui communiquent ensemble, & sont toujours pleines d'un suc lymphatique, dont la consistance & la couleur varient suivant l'âge & la santé de l'insecte. C'est dans ce tissu spongieux que sont ramissés trois genres de vaisseaux trèsdissérens, & qui n'ont pas encore été susifiamment distingués par les Anatomistes.

Les uns sont les vaisseaux aériens; ils partent des dix-huit stigmates qui se trouvent symétriquement rangées sur les côtés de l'insecte. Ils se distribuent par petits filets dans le tissu spongieux & à la surface de l'estomac.

Les autres sont les vaisseaux de la circulation; leur tronc est bien maniseste, mais ses branches sont presque imperceptibles. Dans l'animal vivant, on voit ce tronc sormer sur le milieu du dos une ligne blanche, longitudinale, entrecoupée par des resserremens, & avoir un mouvement continuel de diastole & de sistole. C'est de ce tronc, que Malpighi re; gardoit comme une suite de petits cœurs, c'est de ce tronc vasculaire que partent plusieurs branches qui se ramissent dans le réseau celluleux intermédiaire.

Ces deux genres de vaisseaux, à la grosseur près, existent également dans tous les temps de la vie de l'insecte. Mais il en est d'un autre genre qui changent singuliérement avec l'âge, ce font les vaisseaux gommeux ou soyeux, que l'on devroit nommer pour plus grande exactitude, conduits chyleux; ils naissent immédiatement de la partie inférieure de l'estomac, au dessus de ces poches ou cellules, dans lesquelles se déposent, s'amassent & se moulent les feces de la digestion. Ces conduits sont au nombre de deux; l'un à droite, l'autre à gauche; ils se portent parallelement & tout le long des côtés de l'estomac, gagnent la partie supérieure de ce viscere, là se replient sur eux-mêmes, descendent dans la même direction jusqu'à l'anus, se replient encore, puis remontent, & après avoit fait un quatrieme repli, viennent enfin se terminer par un filet plus délié qu'un cheveu, à un mamelon ouvert près de la machoire de l'insecte. D'après cette description exacte, on voit que ces conduits délicats & torrneux doivent être confidérés comme les intestins grêles de l'insecte; en effet, ils s'ouvrem manifestement dans l'estomac, ils en som la contimuité, ils en reçoivent les sucs nourriciers, mais dépouillés de leurs seces; enfin, dans leur trajet, plongés dans le tissu cestulaire



commun, qui semble leur tenir lieu de mésentere, ils sournissent une infinité de petites branches qui se distribuent de tous les côtés, s'entrelacent avec les autres vaisseaux, & forment dans le tissu cellulaire une sorte de réseau que l'on apperçoit bien dans quelques maladies du ver, & par la macération dans

l'esprit-de-vin.

Telle est la structure du ver dans son enfance, on n'y apperçoit qu'estomac & vaisseaux chyleux; mais à mesure que l'insecte grandit, ses organes se développent pour de nouvelles sonctions; il doit un jour sormer un cocon, siler de la soie, la nature en prépare peu à peu & de loin les matériaux; & ces conduits chyleux, si grêles dans les premiers temps, & d'un calibre égal dans toute leur étendue, sont les réservoirs destinés à cet objet important.

Il est certain que les sucs que sournit continuellement la digestion, passent dans les conduits chyleux, en parcourent tous les replis, & sans doute dans ce trajet ils sont absorbés par des vaisseaux très-sins, & portés ainsi dans toutes les parties du corps pour servir à son accroissement: mais quand l'inseste approche de ce terme, alors ces sucs nourriciers, moins absorbés, restent nécessairement en partie dans les conduits chyleux, s'y accumulent, & les

dilatent peu à peu.

L'observation ne permet pas de douter que ce ne soit le méchanisme employé par la nature. En effet, on voit que la dilatation com: mence toujours à l'extrêmité la plus éloignée de l'estomac, c'est près de la bouche de l'inseste que l'on voit le canal s'élargir par l'accumulation des sucs. D'abord la dilatation est petite, mais chaque jour elle augmente par l'affluence des nouveaux sucs que sournit la digestion. Ce conduit qui n'étoit guere plus gros qu'un cheveu, sorme bientôt un renssement conoide de deux lignes de diametre, qui s'allonge & descend peu à peu; ce n'est plus un simple conduit, un vaisseau chyleux. Toute la portion supérieure qui tient à la tête de l'inseste, sorme un réservoir oblong, plein d'un suc gommeux & brillant; la portion insérieure conserve encore son calibre primitis.

On fent bien que ces réfervoirs ne peuvent pas se remplir sans distendre la peau de l'insecte, sans comprimer & applatir l'estomac; aussi quand ces réservoirs sont pleins, quand les sucs qui y sont contenus, ont acquis leur maturité & la perfection nécessaire, alors l'animal pressé par le besoin de les vuider, fuit la nourriture, cherche un abri pour filer sa soie, jette les premieres trames de son cocon, & continue l'ouvrage jusqu'à ce que les sucs gommeux soient épuisés. C'est à cette époque que se dépose, que s'accumule peu à peu la liqueur acide. Pour en bien fentir l'origine, arrêtons-nous encore à confidérer les dernieres fonctions du ver-à-soie, & les nouveaux phénomenes qui s'operent dans son organisa-

La fabrique du cocon est pour l'insecte une opération importante. Tous ses organes y con-



#### 78 ACADÉMIE

courent, sa peau se resserre, ses anneaux se rapprochent, son corps se rapetisse, & la continuité de ces différens mouvemens agissant fur les réfervoirs soyeux, en exprime les sucs contenus, les amene à la filiere, les oblige de sortir. Pendant ce temps l'estomac, applati d'abord par la compression qu'exerçoient sur ses côtés les deux réservoirs soyeux, se contracte aussi par l'action des sibres qui lui sont propres. Cette force contractile augmentant sans cesse & agissant dans tous les sens, diminue la capacité de ce viscere, en expulse les derniers excrémens. Bientôt l'extrêmité du boyau se détache de l'anus, se fronce, se rapetisse, remonte & se rapproche de son attache supérieure; alors l'estomac & les vaisfeaux foyeux qui font vuides, se pelotonnent, & forment un petit fac que l'on retrouve fous la tête de la chrysalide & du papillon. Les vaisseaux aériens participent aussi à ce changement; entraînés par la rétraction de l'estomac, ils en suivent les mouvemens, ils se rémissent & forment une petite vessie qui se trouve à la partie supérieure du corps. Des dix-huit stigmates, il n'en reste plus que deux qui sont sur le corselet du papillon.

Par cette grande & prodigieuse révolution qui s'opere en si peu de temps dans la sorme, la situation & les usages de l'estomac, des réservoirs soyeux & desvaisseaux aériens, l'abdomen acquiert plus de capacité, & l'on voit alors se développer l'appareil de la génération. On en appercevoit déjà les premiers linéa-

#### DE DIJON, 1783.

79

mens dans le dernier âge du ver, mais ce n'étoit encore qu'une esquisse légere & informe. La nature semble ne travailler que successivement à la persection des organes, & ne s'occuper à la fois que d'une seule sonction. Maintenant toute l'énergie vitale est dirigée vers les organes qui doivent conserver & propager l'espèce; aussi les voit-on changer de sorme en peu de temps, & se présenter sous un nouvel aspect.

J'ai dit précédemment que l'espace qui se trouve entre la peau & l'estomac, est occupé par un tissu spongieux, délicat, dont les cellules sont remplies d'un suc lymphatique plus ou moins coloré, suivant l'âge de l'insecte.

C'est dans ce tissu commun à tous les visceres, que l'on trouve les organes de la génération. Situés près de l'anus, entre la peau du dos & l'estomac, ils sont disposés en deux petits paquets oblongs, l'un à droite. l'autre à gauche, & reçoivent manisestement quelques petits filets des conduits chyleux & des autres vaisseaux. Dans l'état de ver, cachés profondément sous la peau, ces organes n'ont aucune ouverture qui communique à l'extérieur; mais lorsque l'estomac se rapetisse, se contracte, se détache de l'anus, alors cette ouverture restante devient une issue pour les parties génitales, on les voit s'avancer au dehors, & occuper toute la cavité de l'abdomen.

Nous avons déjà fait observer que les organes de la génération sont plongés, dans le

#### ACADÉMIE

80

tissu spongieux, & l'on sent bien qu'ils ne peuvent croître, se développer, sans comprimer de tous côtés les cellules, sans en applatir les mailles, sans en rapprocher les filets, sans en exprimer les sucs; ainsi par ce méchanisme, suite immédiate de la disposition & de l'accroissement des organes, il se forme, dans la partie inférieure du corps près l'anus, une nouvelle capacité abdominale, un nouveau réservoir membraneux qui contient les organes de la génération, & tous les sucs lymphatiques qui, avant cette révolution, étoient disséminés dans les vésicules du tissu spongieux. Ce n'est point tout encore; ces sucs éprouvent, dans ce nouveau réservoir, un changement bien remarquable : soit effet du repos, soit action du principe vital, cette lymphe se sépare en deux portions très - distinctes; l'une épaisse & gluante forme un enduit blanchâtre qui adhere légérement aux parois du réservoir; l'autre plus claire, plus fluide, d'une couleur fortement ambrée, sert en quelque sorte de bain aux ovaires & aux organes de la génération.

Ainsi dans la chrysalide, dans le papillon naissant, nous trouvons deux réservoirs nou-

veaux, deux liqueurs particulieres.

L'une, contenue dans le sac formé par le rapetissement de l'estomac, est un reste des sucs gastriques; c'est un sluide muqueux, diaphane, sans saveur, sans acidité sensible, que le papillon exprime de sa bouche pour amollir la soie, & faciliter sa sortie du cocon.

L'autre

L'autre se trouve près l'anus & est plus abondante, c'est le suc propre du ver-à-soie, c'est la lymphe qui, avant sa métamorphose en papillon, circuloit dans le tissu spongieux, en remplissoit les cellules; & qui maintenant réunie, ramassée dans un réservoir nouveau, est d'une couleur ambrée, d'une saveur particuliere, légérement muqueuse; enfin, c'est un acide libre qui sur le champ rougit les teintures bleues des végétaux, s'unit avec effervescence aux alkalis aérés, dissout certains métaux, qui traité au feu, & avec l'esprit de vin, suivant le procédé de M. Landriani, produit une sorte d'éther, se réduit en gas, enfin, qui a toutes les propriétés qui caractérisent les acides (1).

<sup>(1)</sup> Toutes les chenilles qui doivent se filer une coque, ont à peu près la même structure, éprouvent les mêmes révolutions, & présentent les mêmes phénomenes que le ver-à-soie. Pans toutes, les conduits chyleux se dilatent peu à peu, & forment un réservoir oblong qui se remplit d'un suc gommeux, plus ou moins atténué & coloré. Dans toutes, on voit l'appareil de la génération se développer après la formation du cocon, & pendant l'état de chrysalide; on voit ces organes logés dans un réservoir particulier, plein d'un suc lympha-tique, dont la consistance & la couleur varient suivant l'espèce de l'insecte: le papillon nouvellement éclos ne tarde pas à évacuer ce suc, il le lance à différentes reprises, & quelquesois à des distances assez grandes. C'est à cette évacuation que l'on doit attribuer ces taches rouges, que pendant le cours de l'été on observe autour des habitations, & qui long-temps ont été regardées comme des pluies de sang. Le célèbre Peiresc en sit l'observation à Aix en 1608, & le premier il en donna

Après m'être assuré par des observations & des expériences réitérées de l'origine & du fiege de cet acide, toujours libre, toujours le même dans la chryfalide & le papillon naissant, je cherchai les moyens de le recueillir, afin d'en connoître la nature &

l'action sur les différentes bases.

J'avois d'abord imaginé de couper les chryfalides avec des cifeaux pour en féparer la partie postérieure du corps où est contenu l'acide. Mais le procédé étoit long, ennuyeux, & avoit encore l'inconvénient d'altérer l'acide; car il attaque promptement le fer, & j'en eus la preuve dans l'instant même; à peine avois-je coupé trente chrysalides, que mes cifeaux devinrent noirs, & mes doigts étoient teints comme s'ils eussent été plongés dans

l'explication de maniere à ne laisser aucun doute à ce sujet. (Vie de Peiresc, par M. Requier, pag. 113). M. Durande, en rappellant ces saits curieux, dans son discours pour l'ouverture du Cours de Botanique, en faisant sentir l'avantage de l'étude de la nature, présume avec beaucoup de vraisemblance, que c'est à une pareille cause que l'on doit attribuer ces gouttes de sang que Henri IV apperçut sur la table où il jouoit aux dés avec le Duc de Guise, on essue, elles reparoissent encore : ce fait si simple sut alors regardé comme un prodige, & jeta l'épouvante dans le cœur du meilleur des Rois. Mais si on en eût recherché la cause plus attentivement, on auroit sans doute découvert qu'une ou deux chrysalides de la chenille épineuse, en se métamorphosant en papillons, avoient lancé à différentes fois la liqueur rouge qu'elles contiennent près l'anus.

l'encre, couleur qui persista plusieurs jours; ensin cet acide, ainsi que tous ceux que l'on retire des substances animales par la simple expression, n'auroit pu se conserver. Les parties muqueuses qu'il tient en dissolution, l'auroient bientôt fait passer à la putrésaction.

Pour prévenir cette altération spontanée, & obtenir facilement l'acide, je broyai dans un mortier de verre quinze onces de chrysalides saines & récemment tirées de leur cocon (1), elles fournirent par l'expression à travers un linge, neuf onces d'un suc épais, jaunâtre, & très - sensiblement acide. J'y ajoutai d'abord deux onces d'esprit-de-vin. Le mêlange s'échauffa un peu, bientôt il s'éclaircit; je le filtrai, & alors j'eus une liqueur claire, d'une belle couleur orangée, & ayant une odeur approchant de celle du ver-à-soie ou du mûrier. Dans cette liqueur ainsi filtrée, je versai peu à peu de nouvel esprit-de-vin; chaque fois il se formoit un précipité blanc, léger, qui n'étoit autre chose qu'une substance gommeuse. Je continuai l'addition de l'esprit-de-vin jusqu'à ce qu'il ne se fit plus de précipité, & il en fallut encore trois onces & demie.

J'avois conservé les différens dépôts qui étoient restés sur les filtres, ils pesoient une once & demie; il se ramassa à la surface de

<sup>(1)</sup> Les chrysalides sournissent également de l'acide, quoique les cocons aient été mis au sour, ou exposés à la vapeur de l'eau bouillante, & aient soussert le silage,

ce marc, une huile d'une belle couleur orangée, ayant cette odeur propre au ver-à-soie; cette huile est insoluble dans l'esprit-de-vin, cependant elle le colore un peu; une partie de ce marc est de nature gommeuse, & se dissout dans l'eau; l'autre portion est une sorte de gluten animal, intimement uni à

une terre & à une huile graffe.

Au lieu de broyer les chryfalides, on peut fe contenter de les faire infuser dans l'espritde-vin. Après quelque temps l'acide s'unit à l'esprit ardent, & l'on a une liqueur transparente d'une belle couleur orangée, qui ne tient aucune substance gommeuse, & a tous les caracteres acides. Tels sont les procédés que j'ai suivi pour extraire l'acide des versà-soie, & c'est avec l'acide ainsi préparé, que j'ai fait dissérentes expériences dont je

rendrai compte.

Assuré de l'existence d'un acide libre dans la chrysalide, il me parut intéressant d'examiner s'il se trouveroit ainsi tout formé dans tous les temps de la vie de l'inseste: mes recherches anatomiques m'avoient déjà appris que la lymphe étoit le véhicule de cet acide, cependant je n'osois prononcer; car cette lymphe, quoiqu'essentielle à la vie de l'inseste, n'est pas toujours la même; claire & limpide dans l'œus & dans l'ensance du ver, elle se colore avec l'âge, acquiert plus de consistance, & peut-être bien aussi le caractere acide: d'un autre côté, les observations que j'ai rapportées d'après M. de Sauvages, semblent indiquer que l'acide est inné dans ces

insectes, puisque la graine entassée répand une odeur d'aigre, puisque l'humeur des muscardins a une forte acidité. Pour décider cette question, je pris le parti de faire de nouvelles expériences sur le ver-à-soie, depuis l'œuf jusqu'au papillon.

Voulant savoir si la transpiration de la graine entassée & échaussée, répand une odeur d'aigre, je mis dans un petit slacon un morceau de papier bleu & un gros de graine, le slacon sut bien bouché & exposé à une chaleur douce; la transpiration de la graine se sit bientôt remarquer par quelques gouttelettes qui se ramassoient sur les parois du slacon; le papier s'amollit, se décolora, mais ne sut point altéré en rouge, & au lieu d'une odeur d'aigre, on étoit saiss de l'odeur putride qui annonce l'altération de toutes les substances animales.

Les œufs écrasés sur le papier bleu, ne donnent aucun signe d'acidité: j'en sis distiller une once dans une cornue de verre, à un seu de sable, & j'obtins une eau limpide, muqueuse, d'une saveur fade, une huile empireumatique, jaunâtre, ayant l'odeur de l'alkali volatil, mais je n'eus aucun signe d'acidité. Je me crus donc en droit de conclure que l'acide n'existoit point dans les œufs, mais qu'il se formoit avec la vie.

L'expérience devenoit plus délicate sur les vers, parce qu'alors si on trouvoit un acide, on pourroit encore, avec quelqu'apparence de raison, le regarder comme un produit des digestions, & un reste des seuilles dont l'insecte se nourrit. Pour éviter toute erreur, il falloit examiner la lymphe sans toucher aux organes de la digestion; ce que je sis aisément en piquant légérement la peau avec la pointe d'une lancette; bientôt je vis sortir par ces piquures superficielles, le suc clair & muqueux rensermé dans les vésicules du tissu sponjeux; je pus le goûter, je pus l'appliquer sur le papier bleu, mais je n'y trouvai aucun signe d'acidité, & j'admetrois volontiers l'opinion de M. de Sauvages, qui regarde l'acide observé dans les muscardins, comme l'effet de la maladie.

Pour confirmer cette opinion, qui me parossoit très-vraisemblable, je sis distiller au laboratoire douze onces de vers-à-soie sains & dans leur quatrieme âge; même résultat que dans la distillation précédente, eau fade, muqueuse, huile empireumatique, alkali volatil, mais nul signe d'acidité. Je me crus donc encore davantage autorisé à conclure que l'acide, dans la chrysalide, se formoit uniquement pendant le travail de la soie & la métamorphose de l'insecte; mais quel fût mon étonnement lorsque la distillation des chrysalides me donna exactement les mêmes résultats! Cependant je ne pouvois douter de l'existence d'un acide libre & tout formé : qu'étoit-il donc devenu? le feu, cet agent si énergique, l'auroit-il détruit? Non fans doute; car dans la nature il n'y a point de destruction réelle. La forme d'un corps peut être changée par des agens méchani-

ques, ses propriétés peuvent être altérées par des procédés chymiques, elles peuvent être masquées par des combinaisons nouvelles & plus intimes, mais enfin les molécules élémentaires restent. Il falloit donc que l'action du feu eût combiné l'acide de la chrysalide avec quelqu'autre substance; sûrement il n'avoit point été volatilisé, il n'avoit point été réduit en gas, on s'en seroit aisément apperçu dans l'opération; on auroit pu recueillir ces produits fugaces; d'ailleurs des expériences que j'avois déjà faites avec l'acide extrait par l'esprit-de-vin, m'avoient appris combien peu il étoit volatil : il falloit donc qu'il fût resté dans le charbon, & je devois l'y retrouver, soit libre, soit combiné avec quelque substance. Ainsi je pris le parti d'examiner le résidu de la distillation, & bientôt mes doutes furent éclaircis.

Ayant fait bouillir ce charbon dans de l'eau distillée, je filtrai, exposai la liqueur à une chaleur douce, & j'obtins un sel neutre sormé par la combinaison de notre acide avec l'alkali volatil; car ces deux principes salins existent en même temps dans l'insecte, ce qui ne doit pas plus étonner que de trouver après les sermentations spiritueuses, le tartre, qui bien certainement est une combinaison de l'alkali sixe & de l'acide qui existoient en même temps dans le végétal que l'on a soumis à la sermentation: je n'ai pas assez examiné ce sel neutre animal obtenu par la lixiviation du charbon des chrysalides, pour

en indiquer les propriétés, en déterminer la crystallisation, mais c'en étoit bien assez pour me faire connoître l'existence de l'acide. J'examinai de la même maniere le charbon de distillation des vers-à-soie, & j'y trouvai un même sel, mais en moindre quantité. Ces remarques m'ont obligé de revenir sur mes pas; & avant de conclure, comme je le faisois d'abord, que l'acide existoit seulement dans la chrysalide, j'ai fait de nouvelles expériences.

Je broyai avec quelques gouttes d'eau diftillée, un gros de graine de vers-à-soie, j'y ajoutai affez d'esprit-de-vin pour prévenir la putréfaction, & ayant laissé infuser quelques heures, je trouvai la liqueur légérement colorée, & donnant des fignes foibles, mais sensibles d'acidité (1). J'ai suivi ce procédé sur des vers-à-soie de différens âges, & j'ai obtenu les mêmes réfultats. Ainsi je crois maintenant pouvoir conclure avec plus d'assurance, que le principeacide existe dans tous les temps de la vie de l'insecte; mais d'une maniere différente : dans l'œuf & dans le ver, il est engagé, il est combiné avec une substance gommo-glutineuse, on ne peut le reconnoître qu'en séparant, qu'en précipitant cette subs-

<sup>(1)</sup> Ce procédé si simple peut être employé avec le plus grand succès pour extraire l'acide des substances animales les moins compactes; ainsi on obtient l'acide des chairs, du sang; il ne reste plus qu'à le concentrer en faisant évaporer très-lentement la partie spiritueuse: je me suis servi de ce moyen pour recueillir l'acide des sauterelles & de quelques autres insectes.

cance qui masque ses propriétés; l'art le fait par l'infusion dans l'esprit-de-vin; la nature opere dans cette maladie qu'on nomme muscardine: mais dans la chrysalide l'acide est constamment libre & développé; il est dépouillé de cette substance gommo-glutineuse, l manifeste sur le champ ses propriétés acides.

En parlant d'acide libre & développé, j'ai pensé qu'on ne prendroit pas ces expressions lans le sens le plus strict; car dans l'état de rie & de santé, jamais un acide n'est entiérenent libre; ce principe toujours avide de compinaisons, seroit un caustique puissant qui déruiroit l'organisation; aussi ne le trouvonsious jamais pur, mais toujours il est délayé, I est combiné avec une substance gomneuse, terreuse; il est en partie neutraisé par l'alkali volatil, & il forme une sorte le savon acide, ou pour parler plus exactenent, un sel a trois parties, un vrai tartre nimal. En effet, l'expérience la plus simple rouve que ces liqueurs acides que l'on rouve dans les animaux, sont toujours composées d'un alkali volatil uni au phlogistique, mais supersâturé d'acide, & par ette raison, manisestant dès l'instant même eurs propriétés acides.

Tel est bien certainement l'acide que j'ai lécouvert dans les vers-à-soie, quoiqu'obtenu par la simple expression, quoique dépouillé uneportion gommo-glutineuse par l'addition le l'esprit-de-vin, il est encore très-composé, il tient encore intimement à un prinipe mucoso-huileux, qui peut-être en fait

#### A C A D É M I E

partie constitutive; enfin, il contient toujours le principe prochain de l'alkali volatil, qui en masque, en affoiblit les propriétés, en fait par conséquent un dissolvant très-composé.

Cependant malgré cet état de composition, j'ai cru devoir essayer son action sur dissérentes bases; cet essai m'a sourni plusieurs remarques intéressantes, qui seront le sujet d'un autre Mémoire.

# MÉMOIRE

SUR la pierre à chaux maigre de Brion en Bourgogne.

Et sur la maniere de reconnoître cette qualité dans les différentes espèces de pierres à chaux.

#### PAR M. DE MORVEAU.

N appelle chaux maigre, celle qui a la propriété de prendre corps très-promptement, & de devenir, même dans l'eau, une masse dure & solide, ce qui l'a rend très-précieuse pour un grand nombre d'ouvrages de maçonnerie, & principalement pour les espèces de massifis de mortiers que l'on nomme bétons.

Le nom de chaux maigre lui vient de ce qu'elle ne foisonne pas autant que celle à laquelle on a donné par opposition le nom de chaux grasse, qui profite en effet davantage, en ce qu'elle peut être mêlée à une plus grande quantité de sable, & sournir malgré cela un mortier moins sec & plus gras.

L'expérience seule avoit appris à distinguer juiqu'ici ces deux espèces de chaux. M. Quatremère Dijonval, dans un excellent Mémoire couronné par l'Académie de Rouen (1), avoit bien remarqué que ce n'étoit pas la pierre calcaire la plus pure qui donnoit la meilleure chaux; mais on ne connoissoit ni la vraie cause de cette propriété de la chaux maigre de durcir dans l'eau, ni les caracteres qui pouvoient faire distinguer l'espèce de pierre propre à donner cette chaux, lorsque le célèbre Bergman publia sa dissertation sur les mines de fer blanches (2), dans laquelle il fit mention de l'excellente qualité de la chaux que l'on préparoit avec la pierre de Lena, paroisse d'Upland en Suede.

Il résulte des expériences de M. Bergman, que cette qualité vient uniquement de la manganèse qui entre dans la composition de cette espèce de pierre, & que cette composition se décele facilement par la couleur noire qu'elle prend à la calcination.

J'ai fait depuis deux ans un grand nombre d'essais dans l'espérance de découvrir en cette

<sup>(1)</sup> Journal phys. tom xviii, pag. 335 & 419.
(2) Opusc. &c. tom. 2, dissertat. 19, §. 10, pag. 236 de la traduct. franç.

Province une pierre à chaux de cette nature. N'en ayant trouvé aucune qui foutint cette épreuve, j'ai cherché à me procurer, autant qu'il étoit possible, toutes les pierres à chaux qui étoient en réputation, pour diriger mon choix plus sûrement, d'après leurs caracteres extérieurs ou les résultats de leurs analyses; mais ce travail n'a servi qu'à me faire connoître, d'une part, que le plus grand nombre étoit mal-à-propos rangé dans cette classe; d'autre part, qu'il n'y avoit aucun fond à faire sur la ressemblance du grain, ni même de la couleur.

Enfin, ayant eu occasion de rassembler de nouveau divers échantillons qui m'avoient été envoyés de la Province par des amis qui étoient instruits de l'objet de mes recherches; & les ayant examinés avec plus de soin, dans la vue de leur assigner leur véritable rang dans les démonstrations des minéraux de Bourgogne, auxquelles l'Académie s'est engagée envers l'administration de donner à l'avenir quelques séances particulieres, j'ai eu la satisfaction de trouver ce que j'avois si longtemps desiré, je veux dire une pierre à chaux propre à donner la véritable chaux maigre.

Après avoir démontré cette pierre à la séance du cours de minéralogie du 27 Mars, & indiqué la carriere où elle se trouvoit, je pensai que l'objet étoit assez important pour décider les Commissaires du Cours de Chymie à y revenir lorsqu'il seroit question de l'action du seu, ou plutôt du principe calorisque sur

les terres calcaires. Je vais rendre compte à l'Académie des expériences comparatives qui furent faites en conséquence publiquement à la séance du 2 Avril.

Expériences sur six espèces de pierres à chaux, réputées pierres à chaux maigre.

Toutes ces pierres furent mises dans le fourneau à moufle décrit dans le Journal physique (tom. VIII, pag. 117), élevées sur des têts recouverts par des creusets renversés qui les défendoient du contact immédiat de la flamme, & disposées de maniere à recevoir un coup de feu aussi égal qu'il étoit possible.

Le nº. 1. étoit une portion de l'échantillon de la pierre de Léna, qui m'avoit été envoyée de Suede par M. Bergman, & qui devoit ser-

vir de piéce de comparaison (1).

Cette pierre est d'un gris mêlé de parties blanches tirant au verd; elle est très-dure, elle est recouverte, d'un côté, d'une couche assez épaisse de chaux brune de manganèse qui se coupe facilement au couteau.

Après deux heures de calcination, cette pierre s'est trouvée par-tout d'un brun foncé

<sup>(1)</sup> Je m'étois proposé de faire aussi entrer dans ces essais, la pierre à chaux de Montlimart, qui est connue pour prendre sur le champ une dureté qui ne permet pas de différer de la mêler avec le sable, mais il ne m'a pas été possible de m'en procurer un échantillon.

& d'un brun tirant au noir velouté du côté couvert de chaux de manganèse. Elle avoit perdu 2,548 de son poids, elle s'est sondue lentement, & cependant avec chaleur sensible, dans une quantité d'eau qui égaloit trois sois ce qu'elle avoit perdu à la calcination. C'est la proportion que je crois devoir suivre dans ces essais, parce qu'il faut chercher à établir le rapport de combinaison, non entre les poids de la matiere restante, qui peut être surchargée de corps hétérogènes, mais entre les poids de la substance qui a véritablement éprouvé l'esset de la calcination.

Le nº. 2 étoit la pierre à chaux d'Ath en Tournaiss, si connue par la cendrée de

Tournay.

Cette pierre est assez tendre, d'un noir foncé. Elle a pris à la calcination une couleur grise tirant au blanc; elle a perdu 2,474 de son poids; elle s'est fondue très-promptement dans l'eau.

Le nº. 3 étoit la pierre à chaux de Millery en Savoie, employée comme pierre à chaux maigre dans tous les pays limitrophes.

Cette pierre est d'un gris très-noir, elle a le grain sin, sec, assez dur; elle présente des veines blanches de spat. Elle est devenue blanche à la calcination; elle a perdu 2,886 de son poids; elle s'est sondue très-promptement dans l'eau.

Le no. 4 étoit la pierre de Morex dans le

pays de Gex.

Cette pierre est d'un gris tirant au blanc, assez solide, présentant accidentellement des débris de coquilles & corps marins. Elle a pris à la calcination une couleur brun clair, elle a perdu 2,583; elle s'est sondue promptement dans l'eau.

Le nº. 3 étoit la pierre que l'on emploie communément à Lyon pour faire le béton.

Elle est d'un gris clair, plus tendre que celle de Morex, & plus chargée de parties de coquilles. Elle est devenue blanche à la calcination, elle a perdu 2,394 de son poids; elle s'est fondue très-promptement.

Enfin, le nº. 6 étoit la pierre à chaux de Brion en Bourgogne, à une lieue au sud-ouest d'Autun, qui m'avoit été envoyée par M. de Rigny, Procureur du Roi au Présidial de cette Ville, comme donnant une chaux qui se durcissoit promptement dans l'eau.

Cette pierre est d'un gris noir, d'un grain assez compact, très-dure, présentant dans ses sissures des couches minces de matieres friables brunes, & accidentellement un peu de spat blanc & des débris de coquilles. Elle a pris à la calcination une couleur d'un brun sombre, elle a perdu 2,526 de son poids; elle s'est sondue promptement dans l'eau, & avec une chaleur très-sensible.

S.

Le savant Professeur d'Upsal, à qui nous devons la connoissance des véritables pro-

priétés de la manganèse, indique un autre procédé pour la découvrir & s'assurer de son existence dans les diverses compositions minérales, même les plus solides; il consiste à traiter ces substances avec le nitre en suson dans un creuset; si les parois sont teintes de verd, c'est une preuve que le minéral tient de ce demi-métal, dont la chaux prend cette nuance toutes les sois qu'elle est poussée au seu avec des matieres alkalines, ainsi que le prouvent les expériences du caméléon minéral; ce qui vient probablement de l'abondance du principe calorisque dont elle est surchargée. Je n'ai pas cru devoir négliger un moyen aussi simple & en même temps aussi déciss.

J'ai pris en conséquence parties égales de chacune des pierres calcaires dont il a été ci-devant fait mention, je les ai mises séparément au fourneau de fusion dans des creusets de hesse, avec le double de leur poids de nitre, & je les ai tenues près d'une heure exposées à l'action du feu. J'ai trouvé après le refroidissement, au fond des creusets, des masses fondues imparfaitement, telles que celles qui réfultent de l'union du nitre alkalifé avec les terres calcaires; feulement la pierre de Léna étoit un peu plus attaquée, ce qui venoit probablement de la terre quartzeuse qui y est mêlée quelquesois dans des proportions affez confidérables : mais ce qu'il est le plus important d'observer, c'est que la teinte verte, soit à la surface du résidu, soit sur les parois du creuset étoit trèsforte dans le no. 1er., que le cercle verd étoit ençore très-sensible dans le nº. 6, & même la masse souettée de verd en quelques endroits; que lenº c. 4 présentoit aussi quelques traces d'un cer le verd, mais plus foibles; enfin, que les trois autres n'ont pas verdi. la pierre de Millery présentoit un seul point verdâtre sur le côté, ce qui ne pouvoit être attribué qu'à une portion de nitre qui se trouvoit accidentellement moins mêlée, & qui, agissant sur le creuset, avoit produit une tache en cet endroit; ce qui arrive quelquefois avec le nitre seul, lorsqu'il est assez sluide pour pénétrer les vaisseaux, & y rapporter le peu de manganèse dont les cendres sont très-rarement dépourvues.

#### S.

Il étoit intéressant de confirmer encore ces résultats, en procédant par la voie humide. J'ai fait dissoudre un fragment de chacune de ces pierres dans l'eau-forte rectifiée à la maniere de Meyer, non phlogistiquée & étendue dans une sussidante quantité d'eau, pour que l'effervescence sût très-lente, & que le gas acide méphitique s'élevât seul. Les slacons ayant été pesés d'avance exactement, la diminution de poids indiquoit la quantité de ce principe volatil qui avoit été mis en liberté.

Le fragment de pierre de Léna s'étant trouvé chargé d'une quantité assez considé, rable de terre quartzeuse, ne put être dissons complétement, cependant il y eut perte de poids de 0,733; la dissolution étoit sans couleur, & ayant ajouté de l'acide & un morceau de sucre, la poussiere noire sut attaquée, l'addition du prussite de potasse ou alkali phlogistiqué, y occasionna un précipité d'un bleu tendre, dont la couleur s'assoiblit encore sur la fin, ce qui est un signe non équivoque de la présence de la manganèse (1).

La pierre d'Ath a perdu dans la diffolution 1,993 de son poids; il s'en est séparé une poussière noire qui n'a pas été sensiblement attaquée par l'acide nitreux phlogistiqué.

La pierre de Morex a donné une dissolution jaunâtre avec perte de poids de 2,017; le résidu digéré dans l'acide nitreux phlogistiqué, n'a été que soiblement précipité par le prussite de potasse.

La pierre de Brion a perdu pendant la diffolution 2,109; il s'en est séparé une matiere noire pulvérulente, dont l'acide nitreux phlogistiqué s'est chargé au point de donner un précipité très-sensible par l'addition du prussite de potasse, & aussi caractérisé que celui de la pierre de Léna.

#### CONCLUSION.

Il résulte de ces expériences, que des fix espèces de pierres à chaux examinées, il n'y

<sup>(1)</sup> Voy. opusc. de M. Bergman, tom. 2, p. 222i

en a réellement que trois qui méritent le nom de pierre à chaux maigre, & qui en aient la

qualité.

La premiere est celle de Léna en Suede, qui non-seulement tient plus de manganèse que les deux autres, mais qui a encore l'avantage d'être très-chargée de parties quartzeuses, dont le mêlange intime dispose sa chaux à donner très-promptement un mortier trèssolide.

La seconde est la pierre de Brion en Bourgogne, qui est encore très-caractérisée, & dont
la chaux a soutenu toutes les épreuves de la
meilleure chaux maigre, au point que la pâte
qui en a été formée le jour de l'expérience
de la calcination, s'est conservée & se conserve encore sous l'eau sans s'y mêler.

La troisieme & la plus foible est celle de

Pour les trois autres, il est bien démontré qu'elles ne participent nullement des propriétés essentielles aux pierres à chaux maigre, & que la réputation dont elles jouissent à cet égard ne peut servir qu'à induire en erreur ceux qui voudroient les employer dans les constructions qui exigent cette qualité (1). Si

<sup>(1)</sup> Je suppose que les échantillons qui m'ont été remis, sont bien de même nature que la totalité ou au moins la plus grande partie des pierres que l'on emploie comme pierre à chaux maigre, car il est possible qu'il s'en trouve des deux espèces dans la même carrière, & peut être par bancs minces ou entremêlés qu'il se-

on réussit à faire avec la chaux de pierre d'Ath, un mortier qui résiste à l'eau, qui y acquiert avec le temps plus de dureté que les pierres auxquelles il sert de liaison, cela ne vient pas de la qualité particuliere de cette chaux, mais uniquement de la composition du ciment appellé cendrée de Tournay, dans laquelle on a soin de faire entrer plus de moitié de la cendre du charbon de terre qui a servi à cuire cette chaux, & qu'il faut travailler long-temps & à plusieurs jours d'intervalle, pour la porter à sa perfection (1). Cette pierre fournit une preuve bien sensible de ce que dit M. Bergman, que ce n'est pas le fer qui donne à la chaux cette propriété, car elle en tient beaucoup plus que les autres, & le prussite de potasse produit un très-beau bleu dans sa dissolution.

La pierre de Brion n'est vraisemblablement

(1) Introduction au Journ. phys. tom, 1, pag. 370 de l'in-4°.

roit difficile de séparer : or, dans ce cas, le mêlange pourra bien donner une chaux maigre, si l'on veut un peu plus lente à durcir, se délayant même d'abord en partie dans l'eau, mais formant dans la suite un béton solide. C'est ce que l'on a en esset observé dans plusieurs occasions, où l'on a fait usage de la pierre à béton de Lyon, mais comme on n'avoit jusqu'à présent aucun moyen de distinguer, sur-tout par les caracteres extérieurs, les morceaux qui donnoient cette qualité à la masse, il ne seroit pas étonnant que l'échantillon qui m'a été remis, se sût trouvé précisément de l'espèce qui ne contribue pour rien à cette propriété.

pas la seule pierre à chaux maigre qui existe en Bourgogne, & l'on en découvrira bientôt d'autres carrieres lorsqu'on saura à quels signes non équivoques on peut reconnoître cette espèce de pierre; c'est ce qui m'a engagé à donner avec plus de détails les procédés de mes expériences, comme pouvant servir à guider de nouvelles recherches dans le voisinage des grandes constructions dont l'administration de cette Province est actuellement occupée; mais en attendant elle pourra déjà se flatter de trouver chez elle une pierre à chaux maigre, bien plus sûre & d'une qualité très-supérieure à celle qui est employée sous cette dénomination dans les Provinces d'où elle pourroit la tirer.

## **OBSERVATIONS**

SUR un volcan trouvé en Bourgogne près de Couches & du hameau de Drevin.

PAR M. L'ABBÉ SOULAVIE.

\$. I. Géographie physique du volcan de Drevin.

E volcan se présente en forme d'une colline isolée : il s'élève d'un sol presque en

#### ACADÉMIE

102

plaine avec l'extérieur conique & la forme des volcans. Un œil observateur, accoutumé à reconnoître ces sortes de montagnes, voit dans celle-ci l'ensemble d'une montagne formée par le seu. Le volcan de Drevin est au centre d'une infinité d'autres collines éloignées, plus élevées, & qui semblent s'étendre à l'entour d'une maniere orbiculaire; ensorte que s'il n'y a pas d'erreur d'optique, le volcan de Drevin est au centre d'un immense bassin, dont ces montagnes circulaires & environnantes sont les parois.

#### \$. II. Formes particulieres du volcan.

Tels font les rapports du volcan de Drevin avec les montagnes environnantes. Considéré en lui-môme, il n'offre point de laves d'atterrissement comme la plupart des volcans autrefois fous-marins, dont les laves battues par les flots sont quelquesois converties en fablons; ni des laves boueuses, comme celles de quelques volcans éteints de la France méridionale, où l'eau agitée par le feu paroît avoir fait des dépôts d'une autre sorte; ni des laves spongieuses comme dans presque tous les volcans connus. On n'y trouve que du basalte dont je vais donner bientôt la description minéralogique & les formes. Le volcan de Drevin n'a point de cratere, mais seulement cette forme conique formée par l'éboulement des matieres projetées en l'air par les forces expulsives, & abandonnées à leur

#### DE DIJON, 1783.

103 propre poids, d'où résulte toujours une forme conique, quand les matieres ne sortent pas en forme de coulée. Or, le cône de Drevin s'éleve de ses racines par une pente peu inclinée à l'horizon; vers sa hauteur, le cône se subdivise en deux monticules peu élevés, & dont la hauteur est une demi-sphere assez ré-

guliere. Voy. la figure. Je crois que le cratere doit avoir été situé dans le lieu enfoncé, situé entre les deux monticules supérieurs; ce qui rend ce volcan, dans ses formes, très-analogue à celui de la grande Crémade près d'Agde, au bord de la mer, dont le cratere presque comblé, est encore visible, comme ici, entre deux monticules. Enfin, le volcan de Drevin est situé sur un sol calcaire, avec coquilles pétrifiées du côté du hameau; ce qui offre un phénomene remarquable, assez rare, les volcans se trouvant ordinairement sur l'ancienne terre granitique, & dans les puits schisteux dont le sol est une roche connue par ces termes, schistus micaceus argillosus. Nous avons cependant en Vivarais un plateau supérieur de montagne calcaire, qui n'est qu'un comble de cratere.

#### S. III. Nature des laves, minéraux dans les laves, état actuel de ces laves.

Je n'ai trouvé à Drevin que la seule lave basaltique; le basalte ferri coloris & duritiei de Pline, susceptible d'un beau poli, fusible, vitrifiable, attirable à l'aimant, pesante & trèsdure, point crystalline, point par couches, fans organisation dans sa cassure, & autres qualités décrites dans mon livre sur l'Histoire Naturelle des Provinces méridionales. Ces bafaltes ne sont point ici prismatisés. Je n'ai reconnu que quelques faces polies qui peuvent avoir été les pans des prismes avant la révolution qui a dérangé l'ordre établi après les explosions, qui a fait perdre les situations primitives de ces laves, leurs angles incidens & la contiguité des surfaces. Ainsi ce volcan est semblable pour la nature & la forme de ses laves simplement basaltiques, à celui de Craux en Vivarais, qui est tout formé de blocs informes de basalte, d'une forme conique, mais fans cratere.

Cependant, semblables aux autres laves basaltiques, celles de Drevin renferment quelques aiguilles de schorl, rares & ténues, mais bien crystallisées & très-brillantes, ce qui acheve de caractériser cette lave. J'ai vu encore quelques noyaux de chrysolite, matiere vitrifiée par le volcan, mais sans crystallisation réguliere. Voilà à peu près ce que j'ai observé à Drevin. Il est curieux de trouver un volcan aussi avancé dans le continent, & dans une Province où, selon le témoignage de M. l'Abbé Fabarel, on n'en avoit pas soupconné. Les observations qu'il reste à faire sur ce volcan, & que les Savans de Dijon ne manqueront pas de faire, ne peuvent que rendre l'histoire physique de cette Province, encore plus intéressante.

#### NOUVELLES

## OBSERVATIONS

SUR le volcan de Drevin.

PAR MM. DE BRESSEY ET CHAMPY.

N n'avoit pas en effet soupçonné jusqu'ici qu'il eût existé de volcan dans le sein de la Bourgogne; une pareille découverte sembloit réservée à l'œil scrutateur d'un observateur aussi exercé, que M. l'Abbé Soulavie, dans ce genre de recherches. L'Académie qui connoissoit ses travaux, se l'étoit aggrégé, & bientôt il a justissé son admission par cette preuve de son zèle, pour des objets qui pouvoient nous intéresser plus particuliérement.

L'époque de la découverte d'un volcan se trouve liée à celle d'un événement également singulier & rare en Bourgogne. C'est le Dimanche 6 de Juillet que M. l'Abbé Soulavie, à l'instant où il éprouvoit la commotion du tremblement de terre, étoit à la hauteur du volcan de Drevin. Il n'ignoroit pas que quoique l'éruption d'un volcan ait cessé, lorsque la mer s'en est éloignée, son seu subsisse, & suffit, comme le dit M. le Comte de Busson, pour produire de légeres secousses; un tremblement de terre est proprement l'esset de la

réaction du feu. Ces idées, la sensation qu'il éprouve, les laves qu'il apperçoit sur son chemin, tout en ce moment l'invite à s'en écarter, pour constater un fait intéressant, qu'il s'est empressé d'annoncer par sa lettre à M. l'Abbé Fabarel, en date du 7 de Juillet.

L'Académie l'ayant jugé digne de son attention, a nommé MM. de Morveau, Champy & moi pour se transporter sur l'ancien volcan, l'examiner & en rapporter les échantillons de basalte & de laves, que M. l'Abbé Soulavie n'avoit pu lui procurer. Ce n'est que depuis la délibération du 10 de Juillet qu'il a envoyé le mémoire dont on vient de faire lecture, & auquel nous avons ensuite été chargés d'ajouter, en sorme de notes, les observations qu'une excursion légere n'auroit pas permis à l'Auteur d'épuiser entièrement.

Que l'imagination s'allume à l'aspect d'un volcan brûlant, mais la description d'un volcan éteint n'est-elle pas nécessairement sans chaleur. Réduite d'ailleurs à la forme toujours froide des notes, il nous a paru convenable de nous asservir à l'ordre didactique d'un Mémoire qui n'étoit pas le nôtre, & nous ne pouvions mieux faire que d'employer les propres expressions de M. l'Abbé Soulavie.

# S. I. Géographie physique du volcan de Drevin.

Cette butte volcanique s'eleve sur un vaste plateau de la chaîne des montagnes qui sé-

### DE DIJON, 1783.

parent les sources des ruisseaux aboutissant à l'une & à l'autre mers: elle est un des points les plus élevés de cette chaîne divisée en deux branches, au milieu desquelles coule la riviere de Dheune. Ce point est éloigné, à vol d'oiseau, de deux mille toises du Bourg de Couches, suivant la grande carte topographique de France, & d'un quart de lieue environ de la grande route de Couches à Montcenis.

### S. II. Formes particulieres du volcan.

Deux cônes, l'un obtus, l'autre très-aigu, forment le volcan de Drevin. Sur le sommet du cône aigu, se trouve un vieux chêne qui s'apperçoit de plusieurs lieues à la ronde; la forme réguliere de ce cône annonce de loin ce qu'il est; les forces projectives, dans une direction verticale, l'ont élevé, & les laves, en s'amoncelant autour du point central, ont déterminé cette forme conique & réguliere. Ces sortes de volcans, dit M. l'Abbé Soulavie, différent totalement de ceux dont les forces expulsives ont été obliques, leur cratere même se comble plus aisément. Aussi n'apperçoit - on pas le moindre vestige de cratere sur le sommet de ces deux monticules. Notre observateur présume qu'il existoit dans l'espace enfoncé qui se trouve entre eux.

Si l'on préfere à ces conjectures les principes de l'Auteur, que la forme géométrique est Leablie par les forces expulsives qui rejettent sans cesse les laves enslammées, les obligent à se ranger autour de la bouche ignivome, où se forme a qu'on appelle cratere; ne sera-t-il pas permis d'adopter une opinion contraire à la sienne, & d'imaginer que chacun de ces cônes est anciennement un cratere à son sommet? L'espace qui les sépare est de 180 pas, & le point le plus bas se trouve au tiers de cette

distance, du côté du cône obtus.

L'assertion que le volcan de Drevin est situé sur un sol calcaire, peut n'être pas déplacée dans la bouche de quelqu'un, qu'une longue habitude d'observer les volcans met en état de prononcer hardiment. Nous avons en effet rapporté de cette montagne des pierres coquillieres, avec fragmens de coquilles, ainsi que des pierres quartzeuses; mais nous avons également trouvé des granits de plusieurs espèces, dont les échantillons sont rangés dans le cabinet près des pierres calcaires, comme fur la montagne. Cet amas confus de pierres de toute espèce, dont elle est jonchée, ne paroît pas formé des débris des montagnes voisines qui sont moins hautes, ainsi que nous l'avons déjà dit; l'on ne peut donc pas s'imaginer que l'eau les ait amenées fur nos pics. Ils sont au reste couverts d'une terre végétale bien cultivée & très-fertile. Leur état actuel n'est point favorable à des observations approfondies. Il faudroit les dépouiller de l'enveloppe qui les couvre aujourd'hui, déchirer, pour ainsi dire, les slancs d'une de ces montagnes, pour examiner sur quelle couche reposent les laves & le basalte, dont les fragmens épars percent à travers la terre végétale; pour observer s'il y a plusieurs coulées de laves l'une sur l'autre, ce qui prouveroit plusieurs éruptions successives; si ces laves & ces basaltes sont posés sur une base granitique, ou enfin sur une base calcaire, pour en conclure que le volcan n'est pas sous-marin, ni par conséquent antérieur à la formation des roches coquillieres ou granitiques; mais avant d'avoir pu lire dans les entrailles de ce volcan, il paroît difficile d'asserir un jugement certain sur des bases inconnues.

La comparaison des laves avec les roches diverses qui les contiennent, est, suivant notre Auteur, le véritable art de vérifier les dates de la nature, mais nous manquons de ces objets de comparaison. Des restes de laves isolées, semées sur des pics, sans cratere, sans coulées & sans courans, de pareils monumens n'offrent qu'un fait dans l'ordre chronologique, qui ne peut être déterminé par cette observation unique. On peut dire d'eux, voilà les restes d'un volcan, parmi les six époques suivant lesquelles il classe les productions volcaniques; la troisieme ne présente que quelques pics basaltiqués encore sur place. Tel est notre volcan, qui, quoique nouveau pour nous, paroît cependant d'une grande décrépitude, & dont l'éruption peut remonter à ces temps éloignés où, comme le dit M. le Comte de Buffon, une grande masse d'eau choquée contre un grand volume de seu, pouvoit produire des mouvemens aussi prodigieux; catastrophe dont on a oublié depuis bien des siécles les symptômes effrayans, & dont on ne peut avoir d'idées faute de monumens.

Si l'on ne connoît aujourd'hui que quelques volcans en travail, & tous situés près des mers, le nombre de ceux qui sont éteints, & que l'on a reconnus depuis trente ans dans l'intérieur des terres, est considérable. C'est à M. Guettard, puis à MM. Desmarests, Adanson, Faujas, & à notre Auteur, qu'appartient la découverte de la plupart des volcans de la France; car avant eux, on ne connoissoit en Europe que le basalte de la chaussée des Géans, dans le Comté d'Antrim en Irlande. Leur opinion sur la nature de cette pierre, fut regardée d'abord, ainsi que toutes les opinions nouvelles, comme une conjecture fans fondement; les observations l'ont confirmées par la suite : il a été démontré, & il est hors de doute aujourd'hui, que le basalte a été produit par un seu souterrein qui a brûlé par-tout où se trouve cette production volcanique. (Voy. lettres fur l'Islande).

# §. III. Nature des laves, minéraux dans ces laves, état affuel de ces laves.

Dans le peu de temps qu'il a été permis à M. l'Abbé Soulavie d'employer à ses recherches, il ne s'est offert à ses yeux que des laves,

#### DE DIJON, 783.

mais point de basaltes en prismes. Nous avons été plus heureux, & nous avons déposé dans le cabinet de l'Académie, un fragment de prisme basaltique pentaëdre, dont quatre côtés sont à peu près égaux; le 5°. est beaucoup moindre qu'aucun des quatre autres. Cette configuration du basalte est-elle l'esset du resroidissement ou de la dessiccation; car on ne soutient plus aujourd'hui le système de la crystallisation, c'est une discussion étrangere à notre objet; nous n'oserions d'ailleurs prononcer entre les Savans célèbres que cette opinion divise, & qui soutiennent de part & d'autre leur opinion par des raisons solides.

Mais sans tirer même aucune induction de l'analogie qui pourroit résulter de l'identité des parties constituantes du basalte & de la lave, qui est très-certainement un produit du seu, il nous paroît convenable de rappeller l'analyse qu'en a fait le célèbre Bergman. Il y entre, suivant lui, un peu plus de moitié de terre quartzeuse, \(\frac{1}{5}\) de terre argilleuse, \(\frac{1}{25}\) environ de terre calcaire, & \(\frac{1}{5}\) de fer: aussi nos produits volcaniques sont-ils trèsattirables à l'aimant, ce qui démontre qu'ils ont été exposés au seu, quand même on n'en auroit pas d'autre preuve.

Indépendamment du basalte, nous avons apporté dissérens échantillons de lave. MM. de la Condamine & Bergman ont classé les laves sous trois espèces, spongieuse, compade

#### 112 ACADÉMIE

& viereuse (1). Parmi celles que nous avons trouvées, l'une est lisse & compacte, parsemée de grains brillans, qu'on prendroit pour des parties métalliques ou micacées, mais qui malgré le tissu serré de la lave, ne peuvent être que du schorl, ainsi que l'a dit M. l'Abbé Soulavie. M. de Morveau s'en est affuré par quelques expériences. Le mica n'auroit point fondu, le schorl fond très-aisément; l'autre est compacte, sans grains brillans; la troisieme est plus grossiere, raboteuse, terne dans l'intérieur, recouverte d'une multitude de petits creux assez semblables à ceux de la petite vérole (2), inégale & comme poreuse, sans cependant être spongieuse, ni légere, comme les pierres ponces ou les scories, ce qui prouve qu'elle n'a jamais été entièrement fondue, mais qu'elle a été seulement rendue presque fluide; quelques morceaux renserment des noyaux de spat calcaire, d'autres du quartz. Toutes ces laves sont de couleur de fer; toutes sont pesantes & d'une telle

dureté,

<sup>(1)</sup> M. Faujas de St.-Fond, qui a plus particuliérement étudié ces matieres, vient de donner dans sa Minéralogie des volcans, tous les détails & les instructions que les Physiciens & les Naturalistes pouvoient desirer.

<sup>(2)</sup> Cette lave pourroit être celle de l'espèce seconde que M. Faujas de St.-Fond classe parmi les basaltes irréguliers & laves compactes; les deux autres pourroient être rapportées à l'espèce premiere. Min. des volcans, pag. 50 & 51.

dureté, qu'elle a rebuté ceux qui ont voulu l'employer sur les chemins; toutes contiennent des noyaux de chrysolite, mais aucune ne fait feu au briquet; toutes sont attirables à l'aimant; enfin elles sont fusibles. Tel est le caractere du basalte & de la lave, qu'à un léger degré de feu ils se fondent en une scorie noire, lègere & solide; M. de Morveau en a fondu avec la plus grande facilité, & M. Champy en a fait faire une bouteille dans leur verrerie de Saint-Brain, où ils se proposent de l'employer. Un plus grand nombre d'expériences seroit inutile pour démontrer que ces pierres portent l'empreinte d'un feu destructeur. Le basalte & la lave, dont nous avons mesuré des masses saillantes de plus de trente-six pieds cubes, & peut-être encore profondément enracinées, n'ont pas été amenés sur ces pics supérieurs par les eaux, mais celles-ci ont entraîné, dans la plaine sur un cercle, dont le diametre a plus d'une demi-lieue, les débris épars du volcan de Drevin.

Les Commissaires de l'Académie, pour répondre à ses vues, se proposent de poursuivre des recherches qu'un premier voyage ne permettoit guere que d'effleurer, & d'y employer tous les moyens nécessaires dont ils étoient alors privés.



Mais ce défaut de perfection, quelque léger qu'il soit, en est un grand aux yeux du Physicien; il s'agissoit de le faire disparaître, c'est ce que j'ai entrepris, & à quoi je pense avoir réussi en imaginant une méthode de graduer l'aréometre, telle que l'on pourra facilement en faire de comparables qui indiqueront à la sois, & la qualité des liqueurs dans lesquelles on les plongera, & les rapports de la pesanteur spécifique de ces liqueurs, sans qu'il soit besoin de recourir, comme on l'a fait jusqu'ici, à des calculs dissiciles & incertains comme les expériences qui leur servent de base.

J'ai été engagé à faire les recherches qui m'ont conduit à cette invention par la lecture d'un article du livre intitulé, Description d'un Cabinet de Physique, par M. Sigaud de la Fond, dans lequel ce célèbre démonstrateur, après avoir donné la description de divers aréometres, & fait connoître en quoi ils péchent, s'exprime ainsi: « Nous ne craignons pas d'as-" furer qu'il n'existe encore aucun aréometre » qui réponde exactement à toute l'étendue o de ce problème : Déterminer par la seule im-» mersion d'un instrument, sans aucune opération » subsequente, la pefanteur absolue d'un volume " donné de liquide, & conséquemment la pesanteur » relative des différens liquides dans lesquels cet » instrument seroit successivement plongé. Toute » difficile, ajoute-t-il, que paroisse la solun tion de ce problême, nous ne la regardons » pas comme impossible. »



117

Je me persuadai facilement avec l'Auteur, que la solution du problème proposé n'étoit pas impossible, & quoiqu'avant cette époque je ne me susse jamais occupé des aréometres, j'eus la satisfaction de n'être pas long-temps à la chercher.

Je suis parti des principes qui ont été exposés en commençant. Un corps solide, ai-je dit, s'ensonce dans une liqueur jusqu'à ce qu'il en ait déplacé une quantité égale à son poids : donc si je diminue son poids d'une quantité déterminée, par exemple de la moitié, laissant subsister le même volume, il ne déplacera plus, lors de l'immersion, que la moitié de la quantité de liquide qu'il avoit déplacée d'abord, & par la même raison il ne s'ensoncera plus que d'une quantité qui sera aussi de la moitié moindre que la premiere.

Si ce même corps transporté en cet état dans un autre liquide, s'y enfonce de nouveau d'une quantité égale à celle dont il s'étoit enfoncé dans la premiere liqueur, je dirai que cette seconde liqueur est du double moins pesante que la premiere; que sa pesanteur spécifique est à la pesanteur spécifique

de l'autre, comme un est à deux.

Si j'ôte encore la moitié de ce qui reste du poids du corps, laissant toujours son volume le même; c'est-à-dire, si je le réduis au de ce qu'il étoit d'abord, le corps ne s'enfoncera plus que d'un d'abas la premiere liqueur, & d'un demi dans la seconde. Si ce corps plongé alors dans une nouvelle liqueur.

H iij

s'y enfonce d'une quantité égale à la premiere, je dirai que cette liqueur est quatre sois moins pesante que la premiere, & deux sois moins que la seconde; qu'elle est pour sa pesanteur spécifique à la premiere, comme un est à quatre, & à la seconde comme un est à deux.

En sous-divisant ainsi le poids d'un même corps en un nombre de parties sussissant, & en marquant sur la surface les points jusques auxquels il se sera élevé hors de la liqueur après chaque division ou soustraction de son poids, je n'aurai donc plus qu'à le plonger dans les diverses liqueurs pour connoître leur pesanteur spécifique qui se trouvera indiquée par le degré ou la division à laquelle répondra la surface de chaque liqueur.

Comme c'est sur ce raisonnement qu'est fondée la méthode dont il s'agit, il importe de le bien saisir pour concevoir comment j'en ai fait l'application à la graduation de l'aréometre.

La forme ordinaire de cet instrument m'aïant paru la plus commode, je compris qu'il auroit tous les avantages que je desirois qu'il réunit, si je parvenois à diviser sa tige en parties proportionnelles à son poids, de manière que chaque degré pût être considéré comme représentant une partie connue du poids total de l'instrument.

Pour cela j'imaginai que si j'avois un aréometre dont la tige sût assez longue pour porter toutes les divisions depuis la liqueur la plus légere jusqu'à la plus pesante, je n'aurois



119

qu'à le charger de mercure jusqu'à ce qu'étant plongé dans l'eau distillée, il s'y tînt en équilibre à une très-petite distance de son extrêmité supérieure, le peser alors exactement, diviser le poids qu'il auroit donné en un nombre déterminé de parties, par exemple en 100, ôter ensuite successivement des portions du mercure contenu dans le tube, égales à une quantité égale de parties du poids total de l'instrument, & marquer sur la tige les points où la surface de l'eau la couperoit après chaque retranchement.

Cela fait, il n'auroit plus été besoin que de rétablir une partie du poids retranché, jusqu'à ce que l'instrument se sût tenu en équilibre dans l'eau au quart environ de la division de la tige en desendant, ce degré étant à peu près la place que tient l'eau distillée dans l'ordre des liqueurs pour la pesanteur spécifique; marquant ensuite zero à ce point & la suite naturelle des nombres 1, 2, 3, 4, tant en montant qu'en descendant; vérifier ensin la pesanteur spécifique des liqueurs que l'on estime les plus pures pour en déterminer une sois pour toutes le degré.

Si cette maniere de procéder étoit bonne dans la théorie, il n'en étoit pas de même dans la pratique, & je voyois de grands obftacles à l'exécution.

D'abord il est très-difficile de construire des tubes d'aréometres dont la tige soit assez longue pour porter toutes les divisions nécessaires, à moins de les rendre extrêmement

H iv

embarrassans, ou d'en faire la tige d'un diametre considérable, ce qui diminueroit beaucoup leur sensibilité (1), puisqu'alors les degrés étant très-rapprochés ne pourroient pas facilement recevoir des sous-divisions; & quoiqu'il ne s'agisse ici que de faire un étalon, un instrument par conséquent qui ne seroit pas d'un service continuel, on conçoit cependant que ces inconvéniens en eussent rendu l'usage trop difficile.

En second lieu, c'étoit une opération, je ne dirai pas impossible, mais on ne peut pas plus délicate & difficile à faire exactement, que de retrancher ainsi ou d'ajouter successivement le mercure de l'aréometre par parties égales à celles que l'on auroit trouvées par la division du poids total de l'instrument.

Il falloit donc trouver le moyen de substituer plusieurs aréometres à un seul, & inventer une maniere de retrancher ou d'ajouter les parties du poids, plus simple & plus commode. J'y suis parvenu sans beaucoup de peines; & voici enfin comment j'estime que l'on pourra procéder à la construction d'un aréometre comparable.

L'eau distillée étant la liqueur que l'on peut le plus facilement se procurer d'une même

<sup>(1)</sup> On pourroit cependant faire une graduation dont les divisions seroient assez sensibles, il ne s'agiroit que de la tracer sur une ligne spirale.

qualité dans tous les temps & dans tous les lieux, onen remplira un vase A, fig. 1, assez prosond pour que l'on puisse y plonger, de toute leur hauteur, les tubes dont on voudra faire des aréometres.

On aura plusieurs tubes d'aréometres les mieux soussiés que l'on pourra, & dont les tiges bien égales auront une grosseur proportionnée à la sensibilité que l'on voudra donner aux degrés. On aura soin d'y insérer les papiers destinés à recevoir les graduations.

On disposera une balance ordinaire, bien juste & bien mobile, de maniere que l'on puisse la faire monter ou descendre à volonté, & par un mouvement libre & facile, comme par une vis, ou simplement par le moyen d'un cordon qui, passant sur une poulie attachée au plasond, seroit sixé à une cles, comme l'indique la figure 2.

Sous un des bassins de la balance sera un crochet C destiné à suspendre l'aréometre.

On aura aussi une balance que je nomme balance à diviser, pareille à celle que représente la figure 3, & dont je donnerai tout à l'heure la description.

Enfin, on se munira de quelques morceaux de plomb en lames, & de fil de laiton de

différentes grosseurs.

Toutes choses ainsi disposées, la température du lieu étant de dix degrés au dessus de la glace, on procédera de la maniere suiyante.

On prendra le tube qui, par sa forme,

paroîtra le plus propre à peser les liqueurs légeres; on le surchargera de mercure jusqu'à ce qu'étant plongé dans l'eau distillée, il s'y tienne en équilibre à une très-petite distance de son extrêmité supérieure; on marquera ce premier point, on prendra le tube, on l'essuiera, & on le pesera bien exactement avec un morceau de plomb.

Le poids étant trouvé, on le divisera en cent parties, de la maniere que j'indiquerai par la suite, au moyen de la balance à di-

viser.

On suspendra ensuite l'instrument au crochet C de la balance, & on le plongera de nouveau dans l'eau. On fera monter ou descendre la balance, jusqu'à ce que l'aiguille indique qu'elle est parsaitement en équilibre, & que l'instrument soit plongé dans l'eau jusqu'à la marque que l'on a déjà tracée.

Alors on mettra dans le bassin opposé B, une des parties du poids divisé, c'est-à-dire,

un centieme.

L'équilibre étant rompu par cette addition de poids dans le bassin B, ce bassin s'abaissera, le bassin opposé A s'élevera, & en s'élevant, il fera sortir le tube de l'eau.

Aussi-tôt on sera monter la balance pour la remettre en équilibre, après quoi l'on marquera le point jusqu'auquel le tube se sera élevé au dessus de l'eau.

On répétera cette opération jusqu'à ce que l'on ait marqué sur la tige de l'aréometre toutes les divisions qu'elle peut contenir. Je suppose



qu'elle n'en puisse contenir que 25; nous avons dit que cet aréometre étoit destiné à peser les liqueurs plus légeres que l'eau distillée: on fixera donc le terme de la pesanteur de l'eau distillée, à la derniere division, près de la boule; & après avoir marqué zero à ce point, on marquera les chissres 1, 2, 3 4, 5, sur les divisions suivantes, jusqu'à 25.

Après cela on ôtera du mercure contenu dans l'aréometre, jusqu'à ce qu'il se tienne dans l'eau distillée au point marqué zero. Si la quantité de mercure ôtée se trouve peser juste vingt-cinq centiemes, ou le quart du poids total de l'instrument, il sera parsait, &, en le plongeant dans les liqueurs plus légeres que l'eau, on connoîtra exactement le rapport de leur pesanteur spécifique avec celle de l'eau.

En effet, je suppose qu'on le plonge dans une liqueur où il marquera 5 degrés, ensuite dans une autre où il en marquera 10, enfin dans une 3°. où il en marquera 15; je dirai que la premiere pese cinq centiemes ou  $\frac{1}{20}$  de moins que l'eau distillée; la seconde  $\frac{1}{100}$  ou  $\frac{1}{10}$ , & la troisieme  $\frac{15}{100}$ , ou  $\frac{3}{20}$ .

Il s'agira ensuite de faire un aréometre qui puisse servir à peser les liqueurs spécifiquement plus pesantes que l'eau distillée: pour cela il faudra faire la même opération, à l'exception que le point de zero ou de l'eau distillée se trouvant en haut du tube à la premiere division, il n'y aura point de mercure à ôter.



Je suppose encore que la tige de celui-ci n'ait pu contenir que 25 divisions, on les marquera au dessous de zero dans leur ordre naturel en descendant; & après avoir ainsi achevé ce second aréometre, on passera au troisieme que l'on aura destiné à peser les liqueurs encore plus pesantes.

L'opération pour celui-ci sera un peu différente; car comme il ne peut pas porter le terme de l'eau distillée, & comme la division ne doit commencer qu'à la 25°. au dessous de zero, il faudra ajouter en sus de son poids, une quantité de mercure qui équivaille à ce qui doit lui manquer de longueur; & voici

comment on y parviendra.

On mettra d'abord le tube en équilibre dans l'eau comme les deux autres, c'est-àdire, de maniere qu'il y soit plongé jusqu'à son extrêmité supérieure; alors on le pesera, on divisera son poids en cent parties, & la division faite, on y ajoutera du mercure une quantité égale au nombre de degrés qui lui manque pour porter celui de l'eau distillée; favoir, vingt-cinq centiemes, ou le 1/2 de son poids. On le suspendra ensuite au crochet C de la balance, & on le plongera après dans l'eau, toutes les fois que l'on aura mis dans le bassin opposé de la balance, un poids égal à celui que l'on a ajouté au tube, c'est-àdire, 25 ou 1. Ensuite on procedera à la graduation de la même maniere que pour les autres, observant néanmoins de ne la commencer qu'au no. 25, puisque dans le

fait, cette premiere division ne répond qu'à celle qui seroit la 25° au dessous de zero, si le tube étoit assez long pour porter l'eau distillée.

Si l'on veut graduer d'autres tubes pour peser des liqueurs encore plus pesantes, on s'y prendra de même, ayant soin d'ajouter en poids autant de parties qu'il manquera de divisions, depuis celle où l'on veut que la graduation commence, jusqu'à zero.

Toutes ces opérations achevées, il ne restera plus qu'à déterminer la pesanteur spécifique des diverses liqueurs, en marquer les degrés sur les instrumens, ou bien en faire des tables, au moyen desquelles on pourra facilement, & par la seule immersion d'un instrument construit de la maniere que je propose, connoître jusqu'à quel point d'autres liqueurs de même espèce se rapprochent du degré de la plus grande pureté.

Telle est la méthode par laquelle j'ai imaginé que l'on pourroit graduer des aréometres, qui par leur seule immersion dans les liqueurs, pussent donner le rapport de leur pesanteur spécifique, sans aucun calcul, ni aucune opération postérieure; ensin, de remplir rigoureusement les conditions du problème proposé par M. Sigaud de la Fond, & en même temps d'avoir des instrumens qui scront plus comparables que tous ceux de ce genre dont on a jusqu'ici fait usage dans la physique.

#### 126

#### Balance à diviser.

La balance à diviser, dont il est je crois indispensable de se pourvoir pour procéder facilement à la graduation des aréometres, n'est autre chose qu'une balance romaine a c b, suspendue comme les balances ordinaires sur une chape c, & dont le grand bras c b est au petit bras a c, comme 5 est à 1.

Sur le bras c b on détermine un point m, dont la distance au point d'appui est à celle de l'extrêmité du bras a c, au même point d'appui, dans le rapport de 4 à 1, & l'on y forme une chape pour recevoir le crochet

du bassin qui doit y être suspendu.

Lorsque l'on voudra se servir de cette balance (que l'on peut monter comme les balances d'essai) pour diviser un poids quelconque en cent parties, on suspendra au point m du grand bras, le bassin / qui doit être disposé de maniere que la balance, en cet état, se trouve en équilibre; après quoi l'on placera dans le bassin o le poids que l'on voudra diviser. On mettra ensuite dans le bassin / un morceau de plomb ou de laiton, dont on retranchera peu à peu quelques portions, jusqu'à ce qu'il fasse le contrepoids exact du premier, & que l'équilibre soit rétabli.

Le résultat de cette opération sera de donner un morceau de plomb ou de laiton, dont le poids sera exactement le \( \frac{1}{4} \) de celui que



l'on vouloit diviser, & ce poids total étant

supposé 100, le  $\frac{1}{4}$  sera  $\frac{25}{100}$ .

Il faudra ensuite ôter le bassin 1, & suspendre à l'extrêmité du grand bras un autre bassin plus léger n, qui sera pareillement en

équilibre avec le bassin o.

On placera dans celui-ci le morceau de plomb qui forme le \(\frac{1}{4}\) du poids total, & l'on mettra dans le bassin opposé un morceau de plomb, dont on retranchera pareillement quelques parties, jusqu'à ce qu'il fasse équilibre à celui de l'autre bassin. Ce morceau de plomb sera alors la 5°. partie du \(\frac{1}{4}\), & celui-ci étant \(\frac{25}{100}\), il sera par conséquent

Pour avoir le cinquieme de ce dernier, il n'y aura qu'à répéter sur lui la même opération que l'on vient de faire sur le ¼, & le produit sera juste ¼, du poids total. En faisant plusieurs morceaux du même poids, on aura autant de centiemes du poids total; mais on verra à l'exécution qu'il n'est pas nécessaire de les multiplier au delà de 4, puisque lorsque l'on aura besoin de 5, on les trouvera dans un seul sucreau; il en sera de même des ¼, dont cinq formeront un ½, & enfin de ceux-ci, dont 4 feront juste le poids total.

Cette balance est d'une si grande utilité, que je suis bien étonné que l'on n'en ait pas généralement adopté l'usage dans les arts & la physique, & sur-tout dans la chymie, où

128

l'on a continuellement à diviser différentes substances en un nombre de parties déterminé, ou à leur en ajouter de nouvelles portions.

D'ailleurs cette balance est infiniment commode pour peser avec précision de petites quantités, puisqu'en les plaçant dans le bassin qui est suspendu au plus long bras, la moindre variation en produit une grande sur le bassin opposé; où une dissérence de poids, à peine sensible, se trouve tout de suite multipliée dans le rapport de la longueur dont le grand bras surpasse le petit, ensorte que l'on peut sans peine apprécier jusqu'aux plus petites.

# MÉMOIRE

CONTENANT les opérations faites pour parvenir au projet du Canal de communication de la Saone à la Loire.

#### PAR M. GAUTHEY.

QUOIQUE le projet d'un canal qui joindroit la Saone à la Loire, foit le premier dont on ait parlé pour former une communication des deux mers par le centre du Royaume; quoique l'on ait fouvent tenté ce projet, que son exécution ait même été ordonnée, qu'il soit le plus facile de ceux que l'on



129

l'on a proposé, & celui qui paroisse d'une plus grande utilité, cependant il n'en existe aucun

projet qui ait été fait avec soin.

M. Thomassin, habile ingénieur, qui avoit été chargé, d'abord par M. de Vauban, & ensuite par M. le Régent, d'examiner ce projet, en a probablement fait les détails, mais son travail n'est pas devenu public, quoiqu'il ait

publié plusieurs écrits sur cet objet.

Dans le temps qu'il commençoit à remplir sa commission, M. Abeille sut aussi chargé d'examiner le projet d'un autre canal que l'on avoit proposé pour joindre la Saone à la Seine; celui-ci passant par la Capitale de la Province, devoit intéresser davantage ses habitans, aussi eut-il beaucoup de partisans. M. Thomassin défendit cependant son projet avec chaleur; il critiqua celui de Dijon peut-être avec trop d'animosité. M. Abeille & M. Gabriel répondirent dans le même genre, & les deux projets resterent en suspens; il étoit même difficile que l'on pût prendre un parti décidé, sans avoir les détails des deux projets. Celui de M. Abeille avoit été fait avec assez d'exactitude; il a été vérisié plusieurs fois, & l'on sait à quoi s'en tenir sur la quantité d'eau que l'on pourra conduire au point de partage, & sur le nombre d'écluses qu'il faudra construire; mais l'on n'a aucuns détails sur celui que M. Thomassin avoit fait en 1727. M. Abeille ni M. Gabriel n'avoient pas même été chargés de l'examiner, & l'on n'a



fait jusqu'à ces dernieres années aucune opération sur le terrein relative à cet objet.

Obligé par état, depuis plus de vingt ans. de parcourir très-souvent le pays où devoit être placé ce canal, je me suis attaché à en examiner scrupuleusement toutes les parties. Ayant fait les projets, & fait exécuter cinq grandes routes qui le traverseroient, j'ai reconnu par les nivellemens de ces routes & par la grandeur des ponts que j'ai été obligé de faire construire, que l'on pouvoit conduire au point de partage beaucoup de ruisfeaux des environs, & que ces ruisseaux étoient très-abondans; j'avois sur-tout examiné avec attention la direction des montagnes voifines & leur élévation au dessus de l'étang de Long-Pendu, qui se trouve placé sur la ligne de séparation des sources qui se rendent à l'océan d'une part, & à la méditerrannée de l'autre. Je voyois clairement que cet étang étoit beaucoup plus bas que les montagnes voisines, & même que celles qui en sont assez éloignées; je connoissois les ruisseaux qui prennent leurs sources dans ces montagnes: j'avois fait quelques opérations de nivellement pour avoir la hauteur de ces montagnes, & il me fut aisé de reconnoître que sans avoir égard à un nombre considérable d'étangs qui se trouvoient aux environs de celui de Long-Pendu, on pourroit y conduire une quantité d'eau, non-seulement beaucoup plus grande que celle qui est nécessaire pour une bonne navigation, mais encore que cette quan-



131

tité surpassoit de beaucoup celle que l'on avoit pu avoir pour tous les canaux que l'on avoit exécutés jusqu'à présent, & sur-tout celle que l'on devoit rassembler pour le ca-

nal qui passeroit par Dijon.

Je cherchai d'abord à comparer l'étendue du terrein sur lequel tombent les eaux de pluie qui forment les fources que l'on peut conduire au point de partage de Long-Pendu, avec celle des points de partage du canal de Dijon, de Languedoc, de Briare & d'Orléans, qui sont les seuls canaux à point de partage que je connoisse; je me procurai à cet esset des cartes exactes de ces points de partage, & je trouvai pour celui de Long-Pendu 14 lieues  $\frac{1}{4}$  d'étendue, 8 lieues  $\frac{3}{4}$  pour celui de Dijon, 8 lieues  $\frac{1}{5}$  pour celui du Languedoc, 13 lieues ½ pour celui de Briare; par conséquent cette étendue pour le canal de Long-Pendu est plus du double de celle du canal de Languedoc, & une moitié en sus de celle de Dijon; & comme l'on a fait avec soin à ce dernier canal les jauges des eaux que l'on pouvoit y conduire, & que l'on a reconnu que la quantité que l'on a trouvée, est suffifante pour une bonne navigation; la possibilité & la facilité de l'exécution du canal de Long-Pendu, me parut aussi probable qu'elle puisse l'être. Sur quoi l'on doit encore observer que je n'ai pas compris dans l'étendue du terrein des environs de Long-Pendu, tous les ruisseaux que l'on pouvoit y conduire, ainsi qu'on peut le voir sur la carte des points

de partage des canaux de France que j'ai tracée.

132

Il n'est pas douteux que dans le même climat, & dans deux pays aussi semblables que le sont les environs de Pouilly & ceux de Long-Pendu, la quantité d'eau que sournissent les sources, ne soit à peu près relative à l'étendue du terrein sur lequel tombent les eaux de pluie qui les sorment. Lorsque les climats sont différens, la comparaison n'est pas aussi exacte, mais on peut la rectisser ai-sément lorsque l'on sait la quantité d'eau qui tombe communément chaque année dans ces différens pays.

L'on trouve dans les Mémoires de l'Académie des Sciences, année 1773, qu'il est tombé moyennement 16 pouces d'eau ¼ à Beziers, pendant les huit années qui ont précédé celle-là, & que pendant le même temps il n'en étoit tombé à Paris que 14 pouces 3 lignes par année moyenne; d'où l'on voit qu'il tombe environ ½ plus d'eau de pluie en Languedoc qu'à Paris: par les expériences que M. Maret, Secretaire de l'Académie de Dijon, fait dans cette Ville depuis seize ans, on a trouvé par année moyenne 26 pouces, où l'on voit qu'il pleut plus à Dijon qu'à Paris de ¼, & de ¼ environ de plus qu'en Languedoc.

Il paroît d'abord fingulier qu'il pleuve plus dans les parties méridionales de France, que dans les septentrionales; mais c'est une observation que l'on a aussi faite en Italie, où



M. le Marquis de Poleny a trouvé qu'il tomboit moyennement à Padoue 43 pouc. d'eau par an; probablement il tombe plus d'eau à Beziers & à Padoue qu'à Paris, parce que ces deux Villes font plus proches de la mer; & comme il s'éleve plus de vapeurs de la mer que des terres, la pluie qui s'en forme, doit tomber en plus grande abondance sur les côtes que vers le milieu du continent. On sera moins étonné qu'il pleuve plus en Bourgogne qu'à Paris & en Languedoc, lorsque l'on sera attention que cette Province est dans le pays le plus élevé de la France, puisque la plupart de ser rivieres y prennent leurs sources, & qu'il y a beaucoup de bois & d'étangs.

M. Deluc, Physicien de Genève, a trouvé, par le moyen du barometre, que la Ville de Lyon étoit à 504 pieds au dessus du niveau de la méditerranée; & comptant sur les nivellemens des différens canaux de Bourgogne, fur ceux de M. Picard par rapport à la Loire & à la Seine, ce qui fait une suite de hauteur qui n'est interrompue que par de petits intervalles que j'ai estimés par la pente des rivieres connues en quelques parties voisines, on peut compter que les montagnes de Bourgogne, voisines de Pouilly & de Long-Pendu, sont environ à 1700 pieds au dessus de la méditerranée; que le point de partage du canal de Dijon étoit à 1234 pieds plus haut que cette mer, celui de Long-Pendu à 965, celui de Languedoc à 600, & celui de Briare à 420 pieds; ce qui prouve que la



Bourgogne est un pays fort élevé entre les deux mers, & l'on sait qu'il pleut davantage

dans les pays élevés qu'ailleurs.

L'on observera encore que dans le même climat il pleut beaucoup plus dans les pays de montagne que dans la plaine; on a observé en Angleterre que dans les hautes montagnes des Provinces de Lancastre, il tombe année commune 41 pouces d'eau, tandis que dans la plaine il n'en tombe que 19 \frac{1}{2}.

J'ai remarqué aussi dans les jauges que j'ai faites aux environs de Long-Pendu, que le ruisseau de Marigny qui prend ses sources dans la montagne du Mont-St.-Vincent, la plus élevée du pays, & opposée directement au vent de la pluie, sourniroit au moins \frac{1}{8} plus d'eau, relativement à l'étendue du terrein qui reçoit les pluies, que le ruisseau de Torcy qui prend ses sources du côté opposé, & dans des montagnes moins élevées.

L'avantage du point de partage placé à l'étang de Long-Pendu, provient de la position singuliere de cet étang, qui, quoique sur la chaîne de montagnes qui sépare les sources qui se rendent, d'une part, dans l'océan, & de l'autre dans la méditerranée, est dans une espèce de gorge pratiquée par la nature dans cette chaîne; & parce que ce seuil est considérablement plus bas que les montagnes voisines, où tous les ruisseaux prennent leur source, on trouve que ce point de partage est à 746 pieds au dessous de la montagne du Mont-Saint-Vincent, qui n'est qu'à 1 lieue

1/2, à 454 pieds au dessous de celle de Montcenis, de celle de Nolay & de la source de la Cozanne, & est aussi à 348 pieds au dessous du seuil de Pouilly, où se trouve le point de

partage du canal de Dijon (1).

J'examinai ensuite quel séroit l'avantage de ce projet par rapport au commerce du Royaume en général, & sur-tout par rapport à celui de la Bourgogne. Je voyois qu'il présentoit des avantages qui paroissoient bien plus étendus pour le commerce du Royaume que le canal de Dijon, puisqu'il communiquoit à la Loire. On transporte là toutes les marchandises qui nous viennent de l'étranger par l'océan, le port de Nantes étant le plus commode pour les transporter dans le centre

<sup>(1)</sup> L'on a vu que les points de partage des canaux de Bourgogne devoient avoir beaucoup plus d'eau que ceux de Languedoc & de Briare, puisqu'il pleut davantage en Bourgogne qu'ailleurs: mais l'on peut ajouter à cette raison, qui est commune pour toutes les parties de la chaîne de montagnes qui traverse la Bourgogne, une autre qui est particuliere à celui du Charolois, en ce que les environs de Long-Pendu sont extrêmement garnis de bois & d'étangs, qui sont encore une cause particuliere de la formation de la pluie. Ayant fait des expériences pour recevoir l'eau de pluie auprès de Long-Pendu, & à trois lieues au-delà, dans un pays où il y avoit peu de bois & aucun étang, j'ai trouvé qu'il étoit tombé sensiblement une plus grande quantité d'eau au premier endroit qu'au second; mais ces expériences n'ont pas pu être continuées assez exactement, pour connoître en quelle proportion est cette quantité.



du Royaume, à Lyon, & même dans les Provinces méridionnales par le Rhône, en descendant, attendu que celles qui passent par le canal de Languedoc, ne peuvent qu'avec la plus grande difficulté remonter ce fleuve, par rapport à sa rapidité: mais ce qui me parut le plus frappant par rapport au commerce de la Bourgogne, c'est que la plus grande partie de ses vins, qui font le principal objet de ce commerce, se récoltent sur les bords de ce canal; tandis qu'il en coûteroit plus pour les voiturer sur les ports au canal de Dijon, qu'ils ne coûtent à présent pour les transporter aux ports de la Loire, & par consequent que si ce dernier canal étoit important pour le commerce général, il ne paroissoit pas devoir être d'une aussi grande utilité à la Bourgogne que celui du Charolois, quoique la partie de Tonnerre à Brinon soit extrêmement importante, ainsi que celle de Dijon à la Saone.

Ce furent toutes ces considérations qui me déterminerent à saire, dans le plus grand détail, les jauges & nivellemens de ce projet, asin de le comparer avec celui de Dijon, & de mettre les connoisseurs en état de juger, en connoissance de cause, de l'utilité de ces

deux projets.

A peine avois-je commencé mes opérations, que MM. les Magistrats de la Ville d'Autun, qui avoient fait faire un projet pour rendre la riviere d'Arroux navigable depuis cette Ville jusqu'à la Loire, imagi-

nerent que l'on pourroit diriger par-là un canal de communication des deux mers. La navigation de l'Arroux paroissant alors décidée, il n'y avoit plus que quinze lieues de canal à faire depuis Autun à la Saone; & quoique l'on connût bien qu'il y auroit quelques difficultés à faire le trajet de la chaîne de montagnes, comme il y avoit dix lieues de moins de canal à faire que par le canal de Long-pendu, qui avoit toujours passé pour le projet le plus naturel, on avoit lieu de penser qu'il pouvoit y avoir de l'économie à prendre ce parti. Ces considérations engagerent MM. les Elus à faire examiner en détail ce projet qui auroit effectivement eu les mêmes avantages que celui de Long-Pendu, & de plus, celui de passer par l'une des principales Villes de la Province: en conséquence je sus chargé, par délibération du 13 Janvier 1778, de faire les plans, nivel-1emens & jauges relatifs à ce projet, & d'en rendre compte aux Etats.

Je commençai d'abord par lever le plan du passage que l'on m'avoit indiqué, par couches, & je sis en même temps des nivellemens provisoires des dissérens passages, en adaptant à la pinulle de la boussole, un niveau d'air & un niveau de pente pour les montagnes rapides: cette premiere opération me sit voir que le point de partage par couches avoit de grands inconveniens. J'en cherchai un autre par Nolay, qui me parut moins dissicile; je nivellai ensuite le cours des ruisseaux

que l'on pouvoit conduire à ces deux points de partage, & j'en pris les jauges en faisant en même temps celles du canal de Long-pendu, que j'avois déjà commencées l'année précédente en différentes saisons. Ces opérations me firent voir que ce projet par Autun étoit possible; mais comme il avoit de très-grandes difficultés, dont je rendis compte à MM. les Elus, ils me chargerent, par délibération du 21 Mai de la même année, de faire pour le canal de Long-Pendu, les mêmes opérations que j'avois faites pour celui d'Autun, afin de comparer l'un avec l'autre. Je fis alors avec soin tous les nivellemens, les plans & jauges de ces deux projets, ainsi que les estimatifs, & j'en rendis compte à la fin de Décembre. Je ne parlerai ici que de celui de Long-Pendu, que j'ai fait depuis dans le plus grand détail, attendu que j'ai démontré par le compte que j'en ai rendu, qu'il étoit préférable à celui d'Autun.

Je me procurai d'abord un procès-verbal de M. de Regemorte, contenant le nivellement de la Dheune de moulin en moulin. Cette opération avoit été faite par rapport à un procès qui s'étoit élevé pour le flottage de la Dheune. Il résulte de ce procès-verbal, après avoir restifié quelques petites erreurs de calcul, que le niveau du déchargeoir de l'étang de Long-Pendu est élevé à 425 p. 8°. au dessus des basses eaux de la Saone à Chauvort, à l'embouchure de la Dheune dans cette riviere. Comme j'avois pris le ni-



vellement depuis le pont de Chailly à Autun, que je trouvai à 357 pieds au dessus de la Saone à Chauvort, & que dans le projet que l'on avoit fait pour la navigation de l'Arroux, on avoit trouvé 163 pieds de pente depuis Autun à la Loire, il s'ensuivoit que la Loire se trouvoit à 194 pieds au dessus de la Saone; & comme l'étang de Long-Pendu étoit à 425 pieds 8 pouces au dessus du même pont, la pente de la Bourbinse se trouvoit, par ce calcul, de 231 p. 8°., ce qui faisoit voir que cette pente est peu rapide, puisqu'elle n'a, suivant ce calcul, guere que la moitié de la pente de la Dheune, quoique

son cours soit plus grand.

Je pris ensuite la hauteur des montagnes voisines où je savois que les ruisseaux prenoient leurs sources, afin de connoître tous ceux que l'on pourroit amener au point de partage; & je me servis à cet effet, pour cette opération qui n'étoit que provisoire, d'une méthode assez juste pour ne pas se tromper d'un cinquantieme, ce qui étoit sussifiant pour cet objet. Pour cet esset j'attachai au centre d'un grand graphometre à lunette, un cheveu avec un plomb, & plaçant l'instrument verticalement, je dirigeai la pinulle fixe du dessus d'une montagne, sur toutes celles dont je voulois avoir la hauteur, en vérifiant chaque fois le niveau, en le retournant de l'autre côté, & tenant compte des différences du niveau apparent sur le niveau vrai. Ces opérations me firent connoitre que le Mont-Saiut-Vincent étoit à 715 pieds au dessus de l'etang de Long Pendu, que la Ville de Montcenis étoit à 430 pieds au dessus de ce même point, que le Village de Charmois étoit à 50 pieds au dessus, &c. J'avois aussi reconnu, par les nivellemens que j'avois faits des projets du canal d'Autun par Couches & Nolay, que la riviere de Couches avoit sa source à plus de quatre cents pieds au dessus de cet étang de Long-Pendu, & que celle de Nolay étoit à quatre cent trente pieds plus haut. Je trouvai de même que les rivieres de Marigny, de Gourdon & de la Limasse, qui sont sur la gauche de la Dheune, pourroient être amenées au point de partage, ainsi que celles de Villeneuve & de Chatelmoron, sur la droite de cette riviere.

Je continuai en même temps les jauges de ces ruisseaux que j'avois déjà mesurés en dissérens temps depuis 1776; & pour avoir un objet de comparaison avec les jauges que M. de Chezy avoit faites avec soin en 1754 pour le canal de Pouilly, dans le même temps que je jaugeois les ruisseaux des environs de Long-Pendu, je sis jauger quelques-uns de ceux des environs de Pouilly.

Je commençai ensuite à lever les plans, & faire des nivellemens exacts des rivieres de Dheune & de Bourbinse, aux environs de Long-Pendu, & je reconnus d'abord que la pente de la Bourbinse étoit assez douce, puisqu'elle n'étoit que d'environ 25 pieds sur

la premiere lieue, depuis l'étang de Montchanin, & que la pente de la Dheune étoit de plus de 80 pieds fur 🕹 de lieue depuis l'étang de Long-Pendu; d'où je conclus que le point de partage ne pouvant pas être fort long, ni beaucoup plus enfoncé que l'étang de Long-Pendu, il falloit lui donner le plus de largeur que l'on pourroit, & je reconnus que l'étang de Montchanin, qui est au dessous de Long-Pendu, étoit très-propre pour cet objet; qu'il ne falloit pour cet effet, que faire une tranchée dans l'endroit le plus profond de l'étang de Long-Pendu, laquelle ne seroit pas même bien considérable, & que le point le plus convenable pour fixer la hauteur du point de partage, étoit le niveau ordinaire des eaux de l'étang de Montchanin. Cet étang étant presque aussi grand que celui de Long-Pendu, & ayant 900 toises de longueur sur 78 toises de largeur moyenne, fait l'effet d'un canal qui auroit 9000 toises de longueur, ou 3 lieues 3 fur 7 toises 3 pieds de largeur, qui est la largeur moyenne du canal, à quoi ajoutant la longueur de la traversée de l'étang de Long-Pendu, & ladistance des premieres écluses aux étangs, on trouve que ce point de partage équivaudroit à un canal de 4 lieues 1 de longueur; celui de Languedoc n'a que 1 l. + 116 toises, celui de Dijon auroit 2 lieues \(\frac{3}{4}\) moins 26 toises, celui d'Orléans à 4 lieues + 27 toises; par conséquent celui de Long-Pendu a plus d'étendue que les autres; & en lui donnant 8 pieds de profondeur par-



tout, on pourra aisément le faire baisser de 3 pieds, ce qui produiroit un cube de 35490 toises d'eau, qui fourniroit seul à la navigation de plus de 360 batteaux, sans que l'on fût obligé de tirer de Feau des étangs & ruisseaux : cette ressource est nécessaire dans les temps de pluie, où les eaux entreroient troubles dans le point de partage, & y occasionneroient des dépôts qu'il est bon d'éviter, autant qu'il sera possible. Le moyen d'éviter ces dépôts est de construire des réservoirs élevés de 6 à 7 pieds au dessus du point de partage, que l'on pourra fermer & ouvrir à volonté, pour y laisser déposer les eaux qui y seroient entrées troubles. J'ai marqué quatre emplacemens pour ces étangs, dans les vallons les plus voifins du point de partage; ceux du côté de la Bourbinse se trouvent placés fort près, mais ceux du côté de la Dheune en sont un peu éloignés.

Le point de partage du canal de Long-Pendu, étant dans un vallon entouré de montagnes de tous côtés, on peut prendre les eaux de ces montagnes de quatre côtés pour les y amener par des rigoles qui doivent suivre tous les contours de ces vallons, avec une pente suffisante pour conduire l'eau en assez grande abondance pour remplacer celle que dépenseroit le passage des batteaux dans le temps où le commerce seroit le plus considérable. Cet avantage de pouvoir tirer les eaux de quatre côtés, est encore particulier au canal du Charolois, car à celui

de Languedoc & de Briare, on ne les tire que d'un côté.

Ces rigoles feront placées fur un terrein de sable condensé & assez dur; on ne craindra pas par conséquent beaucoup les filtrations: mais comme elles pourroient entraîner des sables, il est à propos de ne pas leur donner une trop grande pente. Au canal de Briare, la rigole de Saint-Privé n'a que 5 pieds de pente sur 10676 toises, ce qui ne fait que 6 lign. 4 par 100 toises, & 13 pouces 1 par lieue. La rigole de Courtpalet au canal d'Orléans, a 16100 toises de longueur, & n'a que 4 pieds de pente, ce qui ne fait que 3 lign. - par 100 toises, & 7 pouces par lieue. L'aqueduc d'Arceuil à 3 pouces de pente sur 100 toises; celui de Roquencourt n'a que 2 pouces. M. Beliddr rapporte aussi que l'étang de Trapes, dont l'eau fut conduite à Versailles par les soins de M. Picard, n'avoit pas un pouce par 100 toises. M. Abeille avoit fixé les pentes des rigoles du canal de Dijon à 6 po. par 100 toises, & cette pente avoit été adoptée par M. Gabriël; mais il est certain qu'elle étoit trop forte, & qu'en la réduisant au tiers, il pouvoit prendre les sources de la Brenne & celles du Serin plus bas qu'il ne les a prises, & par conséquent en suivant les côteaux plus bas, rassembler une plus grande quantité d'eau. Afin de prendre un terme moyen entre toutes ces pentes. je les ai fixées à deux pouces par cent toifes au moins, en donnant un peu plus de pente



aux endroits où il y a beaucoup de contours; par le moyen de cette pente, on prendra l'eau au dessous de plusieurs moulins que l'on

ne détruira pas.

Après avoir fixé l'emplacement de ces étangs de dépôt, j'ai jallonay des lignes de niveau depuis le point de partage jusqu'à ces étangs, en relevant la ligne de deux pouces par 100 toises au plus; j'ai levé ensuite le plan de ces lignes qui marquent l'emplacement des rigoles. Arrivé à l'emplacement des étangs de dépôt, j'en ai marqué la chaussée & pris le profil du vallon; & relevant ensuite le niveau des rigoles de 6 pieds; j'ai pris le plan des étangs à cette hauteur, qui donnera dans ces étangs de dépôt 6 pieds d'eau, dont on pourra diposer pour le canal; j'ai ensuite continué de jallonner toutes les rigoles de niveau, en relevant toujours la ligne de 2 pouces de cent toiles en cent toiles, lorsqu'il n'y a pas de sinuosité, & de 2 pouces 1/2 à 3 pouces, lorsqu'il y en a; il se trouve dans les rigoles peu de vallons qui exigent un grand circuit, si ce n'est à Torcy, & à la rigole de la riviere de Prodon. J'ai terminé ces rigoles aux ruisseaux du Vilet, des Panneceaux & de la Saugie, parce que j'ai reconnu, par les jauges, qu'il y auroit suffisamment d'eau, sans en aller chercher plus loin. Mais pour avoir toutes les eaux que l'on peut rassembler au point de partage, il seroit aisé de continuer, par les mêmes opérations, ces rigoles, jusqu'à ce que l'on eût gagné le haut des montagnes;

I'on a seulement nivellé le cours des ruisseaux de Chatelmoron, de Charmois & de Gourdon, & l'on a marqué l'endroit où doit se faire les prises d'eau. L'on a encore vu par les grands nivellemens des montagnes, que l'on pourroit encore y conduire les ruisseaux de la Limasse, même celui de Saint-Romain, du côté du midi, & ceux de Saint-Berain & de Sanvigne, du côté du nord. A l'égard de ceux qui se jettent dans la Dheune, il seroit inutile de conduire les rigoles plus loin que la riviere de Chatelmoron, attendu que les ruisseaux sont peu considérables au délà, qu'ils tarissent pour la plupart, & que l'on se servira de ceux qui sont perennes, pour les faire entrer dans le cours du canal, afin de subvenir aux filtrations & évaporations.

L'on n'a pas formé la rigole de la Dheune du côté du midi, quoique ce fût celle qui ameneroit la plus grande quantité d'eau au canal, puisque l'on peut faire verser dans cette rigole les rivieres de Cozanne, de la Vielle, celle de Saint-Jean-de-Trezy & d'Effertaine, dont les deux premieres sont plus considérables qu'aucune des autres : mais ayant reconnu par les nivellemens, que la fource du ruisseau de Montaubri, qui est le plus près de Long-Pendu, étoit trop basse pour être amenée au point de partage, & les autres sources étant éloignées, je les ai négligées, parce l'on en a une assez grande quantité, sauf cependant à s'en servir si l'on en a besoin.

Après avoir tracé l'emplacement des rigoles. on a jaugé tous les ruisseaux qui les traversoient à l'endroit même des rigoles, afin d'avoir exactement leur produit. Ces jauges ont été faites en différentes saisons & en différens temps, pendant le cours de deux années complettes, toujours huit jours au moins après les pluies, & lorsque les ruisseaux ne contenoient plus que des eaux de source. On s'est servi de différens moyens pour avoir ces jauges; mais il y en a quelques-unes que l'on n'a pas pu avoir bien exactement, par plusieurs circonstances dont

on rendra compte.

La meilleure jauge est la jauge ordinaire. qui est une seuille de fer blanc percée de plusieurs trous ronds d'un pouce de diametre: on la place dans le courant des ruisseaux; & après avoir mis des gazons à l'entour. pour qu'il ne s'échappe de l'eau que par les trous, on les débouche les uns après les autres, jusqu'à ce que l'eau ne s'éleve plus qu'à une ligne au dessus de ces trous. Les petits ruisseaux qui ne fournissent que 18 pouces d'eau & au dessous, ont été jaugés de cette maniere; mais lorsqu'ils ont été plus considérables, on n'a pas pu se servir de cette jauge, parce qu'elle occupe beaucoup plus de place, & que les ruisseaux ont souvent peu de largeur. Pour les ruisseaux un peu considérables, on s'est d'abord servi d'une jauge de bois formée d'une planche. que l'on place sur le champ dans le fond de la riviere : cette planche est accompagnée

de deux montans qui laissent quatre pieds d'intervalle entre eux; on fait glisser entre ces montans une regle accompagnée d'une coulisse, & on la descend jusques sur la surface de l'eau, ensorte que l'on fait passer tout le ruisseau dans un parallélograme exact. Cette méthode paroît devoir être très-juste: mais comme il passe par cette ouverture une grande quantité d'eau, le ruisseau ne se met pas de niveau, ou du moins il se forme une pente vis-à-vis la jauge, qui donne plus ou moins de vîtesse à l'eau; de sorte que l'on se tromperoit assez souvent, si l'on ne comptoit que la vîtesse qui répond aux 4 de la hauteur du pertuis, attendu que cette vîtesse est déjà acquise par la pente des ruisseaux qui est souvent considérable, & que d'ailleurs il est rare que l'on puisse faire, comme il le faudroit, des retenues assez élevées pour former un petit étang où l'eau se mît de niveau sur une certaine étendue : il est donc nécessaire de mesurer la vîtesse de l'eau du pertuis par un instrument particulier, pour pouvoir compter sur cette méthode.

Je me suis d'abord servi de celui de Mr. Pitot; & après l'avoir fait faire & essayé de plusieurs manieres, je n'ai jamais pu trouver un résultat juste. L'un de ses désauts provient d'un balancement continuel dans la colonne d'eau qui est souvent de 3 à 4 pouces, & qui empêche de juger de la hauteur d'où l'on doit compter le niveau de l'eau, parce que ce balancement n'est rien moins qu'uniforme; mais l'inconvénient le plus considérable provient

148

du coude que l'on est obligé de donner au tuyau après l'entonnoir; si ce coude est à angle droit, l'eau montera beaucoup moins hant que lorsqu'il est fait en courbe allongée, la grandeur de l'entonnoir y inslue aussi beaucoup; l'eau s'éleve à une hauteur d'autant plus grande, que cet entonnoir est plus large; d'où l'on peut conclure qu'elle ne monte jamais dans cet instrument à la hauteur de sa chûte, & que l'on ne pourroit s'en servir qu'après des expériences faites sur des vitesses connues.

Les défauts de cet instrument m'en ont sait imaginer un autre qui m'a très-bien réussi, & qui n'a pas les inconvéniens de celui de M<sup>r</sup>. Pitot. Ma méthode consiste à mesurer la vitesse de l'eau par son choc, au lieu que M<sup>r</sup>. Pitot la mesure par la hauteur de la chûte

capable de produire cette vîtesse.

L'instrument dont je me suis servi, est composé d'une espèce de palette de 6 pouces de
largeur sur 3 pouces de hauteur, formée d'une
feuille de fer blanc; la tige est une tringle de
fer de 3 pieds 3 à 4 pouces de longueur, applatie dans la partie insérieure en forme de
couteau; dans la partie supérieure elle est
applatie parallelement, & dans un autre sens;
elle est percée dans le milieu de sa longueur
d'un trou rond de 2 lignes de diametre; son
extrêmité insérieure est encore applatie dans
le même sens que la partie supérieure, mais
seulement sur deux pouces de hauteur, pour
pouvoir être attachée solidement à la plaque
de fer blanc; dans la partie supérieure elle

149

est percée de deux trous, l'un est oblong, & l'autre qui est rond, est placé à 1 pouce 1 au dessus du premier; le tout doit être construit de forte que la tige de cette palette soit en équilibre au tour du trou du milieu. La seconde partie de cet instrument est un manche de fer de deux pieds & quelques pouces de long, dont la partie inférieure est refendue & percée pour embrasser la tige de la palette vers le milieu, & s'assembler à peu près comme un fleau de balance, au moyen d'un tourillon tournant très-librement; à la partie supérieure de ce manche est attaché un arc de cercle plat, ayant le tourillon inférieur pour centre; on y attache encore un fil de laiton qui est aussi courbé en arc de cercle; ces arcs doivent être placés vis-à-vis les trous pratiqués à l'extrêmité de la tige de la palette, & y passer très-librement; c'est sur cet arc plat que l'on grave les divisions qui doivent marquer les différens degrés de pression suivant lesquels la palette est poussée. Pour retenir cette palette, on fixe, au bas du manche, un ressort au moyen d'un rivet & d'une vis, & on l'attache à la tige de la palette, un peu au dessous du trou de l'arc, par le moyen d'un petit anneau mobile dans un troisieme trou pratiqué dans cette tige, de telle sorte que le manche étant fixe ou tenu fermement, en poussant la palette, on fasse bander le ressort.

Pour tracer les divitions, il faut former une table des chocs relatifs aux vitesses sur une surface de ½ de pied quarré, dont le 1 er, rang marque la vitesse d'un courant par se-



conde, & le second marque le choc que formeroit ce courant sur ; de pied quarre. Cette table est tirée de celles de M. Belidor; je la joins ici.

pouc.         on. gros         pieds         liv. onc.         pi.         liv. on. gr.         pieds         liv. on. gr.           3         1         1.         9.         6 6.         3.         3.         1 v. on. gr.         pieds         liv. on. gr.           6         4 7/3         2.         0.         9.         23/3         3.         1.         1.2. 5         5.         4.         9.         3.         4.         6.         4.         6.         1.         1.         5.         3.         9.         2.         1.         5.         3.         4.         0.         4.         9.           1.         3         4.         0.         2.         5.         6.         4.         9.           1.         4.         0.         3.         1.         5.         4.         0.         4.         9.           1.         3         4.         0.         3.         1.         5.         4.         3.         2.         15.         6.         4.         9.           1.         4.         0.         1.         5.         4.         6.         2.         15.         4.         2.	Viusses.	Chocs.	Vielfes.	of Co.		Chocs.	Š	Vi	esse		Choc		V'a	Vitesses. Chocs. Vitesses.		Chocs.	3.
3       4       9       0       0       3       3       1       0       0       4       9       3       4         6       4       9       2       3       6       1       12       5       5       9       10         9       1       2       3       1       1       6       1       1       5       4       0       5       3       4       0         9       1       2       3       4       0       5       3       4       0         10       2       3       4       0       2       5       6       4       9         3       4       0       2       9       1       1       5       4       3       2       12       5       9       4       13         6       4       0       3       0       1       5       4       6       2       15       8       6       5       4       4	pouc.	on. gros	pieds		liv.	, a	1	'n.	,	Į	۱۹.	/급	pied	·	Ţ	. 8	مَق
6 4 3 2 0 9 2 3 3 6 1 12 5 5 3 4 9 1 2 3 5 6 4 0 5 7 9 1 5 4 5 5 4 6 4 0 7 9 1 5 5 9 4 6 7 9 1 5 7 9 4 6 2 15 8 6 5 9 4	w	•		9.		6	•	÷	÷	-	.00	٥	4	<u>ب</u>	w	4	6
9 1. 3 ½ 2. 3. 11. 6 ½ 3. 9. 2. 1. 0 5. 3. 4. 0. 0 2. 3 ½ 2. 6. 14. 5. 4. 0. 2. 5. 6. 5. 6. 4. 9. 3 4. 0 0 2. 9. 1 1. 5. 4. 3. 2. 12. 2. 5. 9. 4. 13. 6 4. 0 ½ 3. 0 1. 5. 4. 6. 2. 15. 8. 6. 5. 4.	٥	4	'n	o		9	ml n F3	÷	٥.	ī.		<u>.</u>	÷		÷	10.	<b>†</b>
0 2.2 3 3. 6. 14. 5. 4. 0. 2. 5. 6. 5. 6. 4. 9. 3 4. 0 0 2. 9. 1 1. 5. 4. 3. 2. 12. 2. 5. 9. 4. 13. 6 4. 0 3 5. 0 1. 5. 4. 6. 2. 15. 8. 6. 5. 4.	9	1. 12. 14.	ų	به			61	'n	9	4		٥	÷	بب	<b>÷</b>	ò	4
3 4.00 2. 9. 1 1. 5. 4. 3. 2. 12. 2. 5. 9. 4. 13. 6 4.0 ± 3. 0 1. 5. 4. 6. 2. 15. 8. 6. 5. 4.		بر د ن	4	6			÷	4	٠	;		٥	٠.	٥	4	9.	
6 4.0 \$ 3. 0 1. 5. 4. 6. 2. 15. 8. 6. 5. 4.	1. 3		'n	Ģ	<b>—</b>	r.	÷	4	÷	'n	12.	'n	÷		4	13.	+
	1.6	4. 0 4	· ye	0		÷		4	٥.	'n	15.	<u>,</u>	6.		÷	4	٠,

Ħ

### DE DIJON, 1783.

151

On place alors la tige de la palette horizontalement, après avoir fixé solidement le manche dans un étau; l'on perce la palette dans son milieu, & l'on y attache un petit sac léger, au moyen d'une petite ficelle; l'on met ensuite successivement dans ce sac tous les poids marqués dans la table ci-contre, lesquels sont bander le ressort; l'on marque alors le long de l'arc, & l'on numérote les degrés où la tige de la palettte s'arrête; on enduit à cet effet cet arc avec de la cire; & lorsque toutes les divisions sont indiquées sur la cire, on les marque ensuite avec un ci-seau.

Pour se servir de cet instrument, on met dans l'arc de laiton un petit morceau d'étoffe où l'on fait un trou; l'on tient l'extrêmité supérieure du manche d'une main, & l'on embrasse avec l'autre le bas du manche avec la tige; l'on met ensuite la palette dans l'eau, on l'expose au courant, & l'on desserre la main peu à peu & en inclinant le manche, afin que la tige de la palette reste toujours verticale; alors le courant de l'eau par sa pression contre la palette fait bander le ressort qui fait avancer le petit morceau de drap; l'on ôte ensuite la palette de l'eau, & tirant la partie supérieure de la tige jusqu'à ce qu'elle touche le morceau de drap, on voit jusqu'à quel degré elle a fait bander le ressort, par où l'on connoît la vîtesse indiquée par ces degrés.

L'on voit que par cette construction l'inftrument ne peut pas être faux, puisque les K iv

### 152 ACADÉMIE

degrés ne sont marqués que par l'expérience; dans l'usage il faut avoir attention de ne desserrer la main que peu à peu, sans quoi la palette feroit beaucoup d'ondulations, furtout lorsqu'elle commence à recevoir le choc; elle en fait bien encore par la raison que le mouvement de l'eau n'est pas toujours uniforme, mais le morceau de drap marque la plus grande vitesse, & il est aisé de voir à l'œil la moindre, & de conclure la vîtesse moyenne à la moitié de l'intervalle entre ces extrêmes, lorsque le mouvement est uniforme, & plus près de l'un que de l'autre, suivant que ce mouvement laisse plus long-temps la tige d'un côté que de l'autre; au reste il arrive souvent que ce mouvement est peu sensible, ou du moins qu'il ne dure pas long-temps. L'instrument dont je me suis servi, pouvoit mesurer jusqu'à une vitesse de 6 pi. par seconde, les grandes vitesses auroient trop tourmenté l'instrument, & les petites ne font pas affez fenfibles pour s'en fervir : dans tous les cas il faudroit changer de palette, & la diminuer de moitié dans les courans rapides, & l'augmenter du double dans les ruisseaux cui ont peu de vitesse; alors les mêmes divisions pourront servir. On voit aisément que l'on peut par cet instrument mesurer la vîtesse de l'eau à toutes sortes de profondeurs, & même dans les grandes riviercs; mais dans ce cas, pour que le bateau d'où l'on mesure ces vitesses ne change rien au mouvement de l'eau, on éloignera l'instrument du bateau, en l'attachant solidement à une longue perche; & pour empêcher ses vibrations, il faut d'abord mettre la palette dans l'eau en la couchant, parce qu'alors le choc est moins considérable, on la relevera ensuite peu à peu; il faut aussi avoir bien attention de ne pas faire avancer la palette contre le courant, parce que la vîtesse paroîtroit plus grande. L'on a remarqué que le bas de la tige étoit sait en couteau, pour que le choc de l'eau contre cette partie n'occasionnât pas de remoux ni d'esset sensible pour la pression.

Cet instrument m'a paru très-commode par l'usage; mais comme je ne l'avois pas inventé d'abord ni perfectionné, je me suis servi, pour faire la plupart des jauges, de la méthode ordinaire de laisser flotter sur l'eau un petit morceau de bois blanchi, & de compter le nombre de secondes qu'il employoit à parcourir un certain espace; j'ai reconnu par comparaison cette méthode assez juste, lorsque les ruisseaux avoient une certaine profondeur de 8 à 10 pouces; mais lorsqu'ils sont fort larges & qu'ils n'ont que 2 à 3 pouces de profondeur, il est certain qu'il y a une grande diminution de vîtesse dans le fond. L'on a eu attention de faire chaque opération au moins trois fois, & de prendre la moyenne entre les deux vîtesses qui ont été les moins différentes entr'elles; on a pris aussi plusieurs profils des ruisseaux, en choisissant les endroits où la largeur du ruisseau étoit étren-

### ACADÉMIE

154

& à peu près uniforme; & lorsqu'on ne trouvoit que des bords irréguliers, on les faisoit arranger à la beche : l'on a pris des profils moyens, après en avoir mesuré au moins trois pour chaque opération.

L'on a marqué pour toutes ces jauges, non pas le résultat moyen des trois opérations, mais la moyenne entre les deux expériences qui étoient les moins différentes entr'elles.

Une difficulté des plus considérables que l'on ait éprouvée pour ces jauges, c'est que la plupart des ruisseaux que l'on a jaugés, sont au dessous des moulins, & quelquesois au dessous de deux ou trois moulins les uns au dessus des autres, qui tantôt vont ensemble ou séparément, ou cessent entiérement; il y a par conséquent une variation considérable chaque jour dans le produit de ces ruisseaux; il est même fort différent à certaine distance des moulins, lorsqu'elle est prise peu de temps après que les vannes sont levées, ou lorsqu'elle est prise long-temps après. Comme tous ces moulins tirent leurs eaux des étangs, il n'est pas possible ici, comme dans des biess ordinaires, de faire lever toutes les pêles & de mettre les biefs à sec, puisque la plupart de ces étangs sont très-considérables, & que l'eau seule de ces étangs peut faire aller des moulins pendant plusieurs mois sans être renouvellée. L'étang de Long-Pendu fait aller le fourneau pendant trois ou quatre mois pendant l'été où il ne reçoit point d'eau. L'on s'est servi de plusieurs moyens pour tous ces objets; l'on a pris ces jauges lorsque le moulin n'alloit pas; on les a aussi prises lorsqu'il alloit; & en s'informant combien le moulin alloit de temps par jour, on en a déduit une quantité moyenne qui seroit assez juste, si l'on pouvoit compter sur le rapport des Meûniers. 2°. L'on a jaugé tous les ruisseaux à leur source, & avant que d'entrer dans les étangs qui servent de biess aux moulins: cette méthode seroit la meilleure, s'il n'y avoit pas beaucoup de sources dans ces étangs que l'on ne peut avoir par ce moyen, mais on a mieux aimé négliger celles-ci, & ne compter que sur des eaux certaines.

L'on s'est encore servi d'un moyen qui seroit sujet à peu d'inconvéniens, si l'on pouvoit avoir des notes exactes de la quantité de temps que les moulins peuvent moudre chaque année, & du temps pendant lequel l'eau passe par les déchargeoirs; mais il est assez difficile de prendre des informations sûres auprès des Meuniers qui, soit par ignorance ou plutôt par mauvaise foi, cachent, autant qu'ils peuvent, le produit de leur moulin; cependant l'on a compté quelquefois sur leur rapport & sur celui des gens du pays, attendu que tous les autres moyens ne pouvoient pas, dans bien des cas, donner même des approximations, & que l'on a par ce moyen les jauges bien plutôt foibles que fortes.

Rigole de Torcy.

L'on a remonté cette rigole jusqu'au mou-

lin du Vilet; l'on pourroit même la remonter plus loin fi l'on en avoit besoin. Suivant les informations que l'on a prises, ce moulia peut moudre cent mesures par jour pendast six mois, & le déchargeoir donneroit encore de l'eau pendant ces fix mois d'hiver. L'enpellement a 11 pouces de largeur, il s'éleve de 4 pouces 3 lign. & la charge de l'eau et de 3 pieds; ainsi, jusqu'au centre d'impression, la surface du pertuis est de 0 3 pouc. 10 lign. 3, & la vitesse de 13 pieds 4 pouc. Il lign. par conséquent la dépense par seconde sera de 4 pieds 4 pouces 3 lign. ce qui produit 653 pouces de fontainiers. Pendant trois mois des eaux moyennes, il ne moudroit que soixante mesures au lieu de cent, ains la dépense ne seroit plus que de 392 pouces: pendant trois mois d'été, on ne doit compter que sur onze mesures par jour, relativement au temps des chommages; ainsi la dépense d'eau n'est plus que de 72 pouces.

Le déchargeoir ayant été jaugé lorsqu'il étoit dans son état moyen, il a donné 150 pouces, ce qui produit par jauge moyenne

$$\frac{653}{2} + \frac{392}{4} + \frac{72}{4} + \frac{150}{2}$$
, faisant en tout 517 pouces.

Le moulin le Duc peut moudre, pendant fix mois, 80 mesures de bled par jour, & le déchargeoir donneroit encore moyennement 150 pouces d'eau. Pendant 4 autres mois, il peut moudre 50 mesures; pendant six semaines il n'en peut moudre que 5, & il

chomme quinze jours. L'empellement a 8 pouc.  $\frac{1}{2}$ , on le leve de 6 pouces, & la charge est 2 pieds 9 pouces; la vitesse se trouve de 12 pieds 5 pouces 4 lign.  $\frac{3}{5}$ , & la dépense 682 pouces que l'on doit compter pendant six mois. Pendant quatre autres mois, on ne doit doit compter que  $\frac{5}{8} \times 682 = 426\frac{1}{2}$ ; pendant un mois  $\frac{1}{2}$ , on ne doit compter que  $\frac{5}{10} \times 682 = 42\frac{1}{2}$ ; la dépense moyenne sera  $\frac{682}{2} + \frac{426}{3} = \frac{1}{2} + \frac{42}{8} + \frac{150}{2} = \frac{564}{2}$ .

Le moulin de Champliau peut aussi moudre 80 mesures par jour pendant six mois; pendant trois autres mois, il ne pourroit moudre que 20 mesures par jour, & pendant les sécheresses, il ne peut moudre moyennement que 3 mesures par jour: l'empellement a 9 pouces de largeur, on le leve de 3 pouces, & la charge est de 3 pieds 7 po. ce qui donne pour la vîtesse 14 pieds 7 po. 11 lig. & pour la dépense, 412 pieds pendant six mois. Pendant les trois mois moyens,

la dépense sera  $\frac{20}{80} \times 412 = 103$ ; pendant les

trois mois d'été, elle sera  $\frac{3}{80} \times 412 = 15\frac{1}{2}$ ; ajoutant pour le déchargeoir qui s'épanche pendant six mois, comme pour l'étang le Duc, 150 pouces, on aura la dépense

Le moulin du Breuil peut moudre pendant huit mois entiers, le jour & la nuit; le reste du temps il chomme entiérement, parce que l'étang est presque vuide: l'empellement a 8 pouces de largeur, & se leve de 4 pouc. 6 lign. ce qui donne 3 pouc. pour le profil de la lame d'eau; la charge est de 3 pieds, qui répond à une vitesse de 13 pieds 4°. 11 lign. ce qui donne pour la dépense 50° pour le profil de 13 pieds 4°.

pendant huit mois, & par conséquent  $\frac{2+503}{3}$ 

Indépendamment de ces moulins, la rigole prend dans son cours plusieurs ruisseaux au nombre de 40 pendant l'hiver, mais qui tarissent presque tous: ils ont été jaugés en hiver, & ont donné 786 pouces, que l'on peut compter pendant quatre mois; environ 318 pouces pendant cinq mois; & pendant trois mois de l'été, il n'y en a qu'un qui ne tarit pas, & qui fournit au plus 15 pouces; par conséquent tous ces ruisseaux produiront  $\frac{786}{3} + \frac{318}{\frac{18}{12}} + \frac{15}{4} = 398$ . Ainsi le produit de cette rigole sera donc 517 + 564 + 310 + 180

410 + 398 = 2199 pouces, & c'est porter les choses au plus bas, car les jauges ont donné davantage.

### Rigole de Marigny.

L'on remonte cette rigole jusqu'au moulin des Paneceaux: suivant les informations prises, ce moulin peut moudre pendant six mois, vingt-quatre heures par jour; pendant deux mois de l'année, avant les sécheresses, il ne peut moudre que 6 heures, & chomme entiérement pendant quatre mois: l'empellement a 8 po. de largeur, & se leve de 6 pouc. la charge de l'eau est de 2 p. 5 ½, qui répond à une vîtesse de 12 p. 1 lign.; le pertuis étant 0 4 pouc. la dépense sera de 605 pouces,

ainsi la dépense sera  $\frac{605}{2} + \frac{605}{4} + 75$  pour le

déchargeoir, ce qui produit en tout 528 po. On a trouvé, suivant les jauges, 816 po.

Le moulin de Marigny peut moudre toute l'année; pendant six mois il peut aller vingtquatre heures; pendant les six autres mois, il n'iroit que le quart du temps : le pertuis a 11 pouces de largeur sur 6 de hauteur, & la charge de 14 pouc, qui répond à 8 pieds 4 po. de vîtesse, ce qui produit 506 po.  $\frac{1}{3}$ , ainsi le produit sera  $\frac{506}{2}$  +  $\frac{506}{8}$  = 316; à

quoi il faut ajouter ce qu'il en passe par le déchargeoir où l'eau coule presque toujours. Pour avoir cette jauge avec exactitude, on a été prendre celles de tous les ruisseaux qui tombent dans l'étang de Marigny. Les jauges ayant été saites en hiver, au dessus de tous

les moulins, & des autres ruisseaux qui tombent dans l'étang, on a trouvé qu'ils fournisfoient 2192 po.; & en automne elles ont donné 915: elles n'ont pas été prises en été; mais en les estimant relativement aux autres expériences, on trouve 324 p. ce qui donnera

pour jauge moyenne  $\frac{2172}{3} + \frac{915}{5} + \frac{324}{4} =$ 

1137.

Le ruisseau de la Queue-de-Bœuf, jaugé en hiver, a donné 520 po., au printemps 180, & en été 86 pouces, ce qui donnera pour jauge moyenne 272 pouces.

Le ruisseau des Essards a été trouvé en hiver de 675 pouces, en été il fournit environ 84, & en automne 340, ce qui produit . . . . . . . . . . . . . . . . 380 po.

trouvé de 1375 po. en hiver, & de 460 po. en automne; en été il ne va qu'à 164 pouces, ce qui produit environ 694 po. Il y a encore depuis le ruisseau de la Queue-de-Bœuf jusqu'à celui du petit Montchanin, outre celui des Esfarts, plusieurs ruisseaux dont quelquesuns tarissent en été; ils fournissent ensemble 427 pouces en hiver, 205 en automne, & 63 en été, ce qui donne 237 po. pour la jauge moyenne; de sorte que la rigole de Marigny donne 528 + 1137 + 272 + 388 + 694 + 237 = 3543. Ce ruisseau est plus considérable ordirairement que celui de la rigole de Torcy, quoique l'étendue du terrein qui recoit reçoit les pluies qui fournissent ses sources, soit moindre: la raison en est peut-être que le Mont-Saint-Vincent où il prend sa sonrce, est beaucoup plus élevé que les montagnes de Montcenis qui sont du côté du vent d'où vient la pluie ordinairement. Dans les débordemens, ce ruisseau est très-considérable; ayant mesuré son profil à la planche d'Ocle, je lui ai trouvé 120 pieds quarrés, & en comptant sur 6 po. de vîtesse, qui est la moindre que l'on puisse supposer dans cet endroit où il a beaucoup de pente, on trouve qu'il sournit alors plus de 100,000 pouces d'eau; ces inondations peuvent durer l'équivalent de quinze jours par an.

### Rigole de Saint - Julien.

Il n'y a aucun moulin sur les ruisseaux de cette rigole; il y en avoit un autresois, mais il a été détruit. L'on a jaugé ensemble les trois ruisseaux de la Chapelle, de la Saugie & des Baudots, & on les a trouvés de 2042 pouces en hiver, 676 en automne, & 256 en été, ce qui donne pour jauge moyenne, 945 pouces; à quoi il faut ajouter le ruisseau de l'étang Bondilly, & plusieurs autres venant de la montagne d'Ecuisse, lesquels sournissent ensemble en hiver, 1640 pouces, & au printemps 457: ils n'ont pas été jaugés en été; mais estimant le produit relativement aux autres, on trouvera que ces ruisseaux donneront moyennement 779 pouces; ainsi

### ACADÉMIE

le produit de cette rigole sera 945 + 779 = 1724.

### Quantité d'eau fournie par les étangs.

Indépendamment des eaux que l'on peut amener au point de partage par les rigoles, il y a encore aux environs plusieurs étangs dont les eaux peuvent servir pour le canal; & comme l'étang de Long-Pendu fait aller un fourneau, & celui de Montchanin un moulin, en sachant combien de temps ces usines vont par année, on aura assez exactement la quantité d'eau que peuvent fournir ces étangs.

Le fourneau de Long-Pendu va ordinairement quatre mois de l'année; l'empellement a 14 po. de largeur, & s'éleve de 3 pouces lorsqu'il a 10 pi. 4 po. de charge, & de 6 pouces lorsque les eaux de l'étang sont basses, & qu'il n'y a que 16 pouces de charge. Dans le premier cas, la vîtesse répondant à 10 pieds 4 po. est de 24 pi. 10 po. 8 lig. & la dépense de l'eau par seconde est de 7 pieds 3 pouces, équivalente à 1087 pouces ; & comme le fourneau ne va que le tiers de l'année, il

ne faut compter que sur  $\frac{1087}{3}$  = 362; lorsque

l'eau est basse, cette dépense est un peu plus considérable; & lorsque le fourneau a cessé, cet étang est ordinairement trois mois à se remplir, & lorsqu'il est plein, elle coule par le déchargeoir quatre mois de l'année; mais comme ce déchargeoir tombe dans l'étang de Montchanin, dont on va prendre le produit, il ne faut pas y avoir égard.

Le moulin de Montchanin chomme au plus quinze jours par an; il peut aller six mois entiers pendant vingt-quatre heures, ainsi que son déchargeoir; on peut compter que pendant les six mois d'été, il pourroit aller six heures par jour: l'empellement a 10 po. de largeur, & on le leve de 3 po. ½ dans les eaux ordinaires, où la charge est de 5 pi. 4°. qui répond à une vîtesse de 17 p. 10°. 8 lign. équivalant 652 pouces; le produit

par an fera donc  $\frac{652}{2} + \frac{652}{8} = 489$  po. L'on

doit ajouter le déchargeoir de l'étang, qui étant jaugé en hiver, a donné 1263 pendant quatre mois moyennement, ce qui revient par an à 421 pouces, & en totalité à 910

pouces.

De sorte que l'on peut compter pour l'eau de ces étangs, sur 1272 po. L'on a encore une autre maniere de savoir la quantité d'eau que fournissent ces étangs, en cubant celle qu'ils contiennent; & étant prévenus que lorsqu'ils sont vuides, ils sont deux à trois mois au plus à se remplir, l'on a trouvé que les étangs Bordeau, Ravarde, de la Tuilerie, les deux Guillemettes, le Coudrai, Porchet, Montchanin, Jean-du-Bled, Saint-Pierre & l'Etang-Neuf, contiennent 169,930

toises cubes d'eau. Les étangs que l'on construira à côté de Long-Pendu & de Montchanin, contiendront 166,000 toises, le tout faisant 339,930 toises cubes, & en comptant qu'ils se rempliroit quatre fois par an, on auroit 1359,720 toises cubes: un pouce d'eau fournit 28 l. d'eau par minute, 24 p. cubes par heure, 2 toises par jour, & 975 toises par an; de sorte que les 1359,720 toises équivau-droient à 1385 toises cubes, qui est un peu plus considérable que par le premier calcul.

L'on n'a pas compté sur les trois étangs de dépôt qui contiendront 100100 toises cubes, ni sur les six étangs à la tête des rigoles, qui contiendront 371,500 toises, faisant en tout 471,600, & comptant qu'ils se rempliroient aussi quatre sois par an, ils sourniroient

1934 pouces.

Celle de Saint-Julien , . . 1724. 8784.

Et pour les étangs des environs de Long-Pendu, . 1272.

L'on n'a pas tracé le projet pour continuer les rigoles plus loin, mais on a jaugé les ruisseaux, & l'on s'est assuré par les nivellemens, que l'on pourroit amener tous les ruisseaux qui forment la riviere de Sorme du côté de la rigole de Torcy, ceux qui forment la riviere de Gourdon, & même la Limasse, du côté de la riviere de Marigny; & la riviere

## ETAT DES JAUG Pag. 165.

Jauges le pro Es monnes.

### RIGOLE DE

e gran je sa marber

The Control of the Charles

# Software Silver 
or the second second

### Received to the commence

165

de Chatelmoron, du côté de la Dheune: on a trouvé que la riviere de Sorme fournissoit moyennement 3500 po., celle de Gourdon 1200, la Limasse 800, & la riviere de Chatelmoron 1400, ce qui fait en totalité 6900.

L'on a jaugé la Cozanne qui produit 2150 po., la Vielle qui produit 2040 po., le ruisseau de St.-Jean-de-Trezi 1200 po., & celui d'Essertaine 800, ce qui produit en tout 6190 po. Ainsi l'on pourra augmenter de 13000 pouces la quantité d'eau des rigoles; mais la quantité de 8700 sournie par les étangs & les trois rigoles, est bien suffisante, puisque l'eau seule des étangs qui ne fait que la septieme partie du total, seroit suffisante pour saire passer 1000 batteaux par an par le canal.

Il y a quelques différences de ces jauges avec celles que M. Aubry a rapportées dans son procès-verbal du 15 Janvier dernier, où il les fait monter à 7182 pieds, qui n'est cependant qu'un peu plus d'un 6e. plus foible. Cette différence provient de ce que dans la mesure des eaux faite sur les informations que M. Aubry a prises sur le produit des moulins, comme il n'a voulu mettre que ce qui est reconnu certain, il a négligé l'eau des déchargeoirs des moulins qu'il n'a pas pu mefurer, parce que ces déchargeoirs ne versent de l'eau que pendant l'hiver; car les jauges qu'il a faites dans les endroits où il n'y avoit pas de moulin, excédent même de quelque chose les jauges moyennes que j'ai déduites de celles que j'avois faites.

Il a trouvé aussi quelque dissérence entre ces jauges & celles que j'ai inscrites sur la carte générale, parce que j'ai depuis mesuré plus exactement quelques ruisseaux, & qu'il y avoit aussi quelques erreurs de calcul que

j'ai rectifiées.

Dans le même temps que je prenois les jauges des ruisseaux des environs de Long-Pendu, j'ai fait prendre celles de quelques ruisseaux du canal de Pouilly, & le 20 mars le ruisseau de Beaume a donné 490 pouces d'eau; M. Gabriel l'avoit trouvé de 310 dans un temps où le total de ces jauges ne produisoient que 3023; mais, suivant les expériences de M. de Chezy, le total des jauges moyennes étoit de 4047. Il faudra donc augmenter la jauge que M. Gabriel donne du ruisseau de Beaume, de j pour avoir la moyenne, qui se trouve par ce moyen de 413 po.

En suivant la même proportion, le total des ruisseaux du canal de Pouilly auroient donné, à l'époque du 20 mars, 4583 pouces, tandis que celles du canal de Long-Pendu en ont donné 14584, non compris l'eau des étangs, ce qui fait voir qu'elles sont en hiver plus du triple de celles de Pouilly.

La jauge moyenne des eaux de Long-Pendu étant de 8783 & celle de Pouilly étant de 4047, il s'ensuit qu'il y aura au moins à Long-Pendu deux fois plus d'eau qu'à Pouilly, en ne comptant que les trois rigoles; cet effet provient de ce que les rigoles du canal de Pouilly ne doivent prendre les eaux qu'à la

#### DE DIJON, 1783. 167

source des ruisseaux, parce que ces rigoles sont fort élevées au dessus du vallon, & qu'il fort plusieurs sources dans le bas de ces vallons, qui ne peuvent pas entrer dans les rigoles; au lieu qu'au canal de Long-Pendu les rigoles sont assez basses, & recouvrent plusieurs ruisseaux qui ont un long cours.

### MÉMOIRE

SUR l'incohérence des nouvelles maçonneries construites en cailloux & en chaux commune, fondée sur une expérience importante.

### PAR M. AUBRY.

JETTE expérience est établie sur la démolition d'une voûte qui avoit une année de. construction, & dont les culées qui devoient être faites en pierres échantillonnées, serrées les unes contre les autres & en liaison, suivant l'usage, avoient éprouvé au derriere, des voussoirs une compression laterale de 1/2, de leur épaisseur, qui indiquoit qu'on ne s'étoit point conformé à cette regle.

En effet, le massif de ces culées qui avoient.

18 pieds d'épaisseur, n'étoit composé que de cailloux ronds, disséminés dans un mortier encore humide, composé d'une chaux grasse,

d'une deffication tardive, en telle forte que les vuides occupés par ce mortier l'emportoient sur le plein de la pierre.

J'ai choifi, pour expérimenter ce fait, un échantillon de cette maçonnerie qui pût me faire juger de ce que j'en appercevois sous

les mêmes rapports.

Cet échantillon étoit composé d'un cailloux oblong, très-pesant, cassé par l'un de ses poles & d'un autre morceau de recoupe de pierre, l'un & l'autre enveloppés du mortier dans lequel ils avoient été plongés sans autre forme, & par conséquent sans contact immédiat des uns aux autres.

J'ai ramassé soigneusement cet échantillon & les débris du mortier qui en dépendoient, & l'ayant pesé dans l'air & dans l'eau, il a produit 80 \frac{8}{3.5} de pouces cubes, qui m'ont donné 161 livres \frac{1}{2} pour chaque pied cube.

J'en ai distrait ensuite tout le mortier pour peser de la même maniere les pierres à part, elles contenoient 18 po. ½ cubes, dont chaque

pied pesoit 233 liv.

Suivant ce procédé, il n'y avoit donc dans les 80 pouces \(\frac{3}{17}\) de cette maçonnerie, que 18 po. \(\frac{1}{2}\) de pierres, & partant 61 pouces \(\frac{2}{4}\) cubes de mortier; d'où il fuit que ce mortier occupoit les \(\frac{1}{4}\) du massif de cette maçonnerie, qui ne devenoit au moyen de cela qu'un beton factice, nécessairement compressible en proportion de sa crystallisation; ensorte que quelqu'attention qu'on eût apporté d'ailleurs à l'épaisseur que devoient avoir les culées

fuivant les regles de la statique, & suivant les autres circonstances physiques, leur résistance étoit soumise à l'événement de cette mauvaise construction, en décintrant la voûte avant la dessication des mortiers.

Application de l'analyse à cette expérience.

Soit la figure ci-jointe (Voy. fig. 4) de la voûte & des culées, conforme au système & aux événemens que nous venons de détailler,

on aura

A B = a = 30 pi. B G = b = 56 pi. A G = c = 47 pi. 4°. D L = nn = 236 pi. N Q = d = 12 pi. 8°. C L = 4 pi. B N = 18 pi. A L = 8 pi. 8°.

L'élément DL = 206 pieds; mais comme cet élément est en pierre de taille, & que celui de la culée DN est en moëllons, & que le rapport du poids de ces deux matieres est :: 186: 161 livres ½, il faut pour les rendre homogènes, ajouter ½ à celui de la poussée, parce qu'elle acquiert une plus grande charge par cette différence de construction, alors cet élément équivaudra 236 pieds = nn.

L'analogie donnera donc  $\frac{bnn}{4}$  pour l'effort

### 170 ACADÉMIE

que font les voussoirs au point B, qui est évidemment celui où se fait cet essort, puisqu'an premier mouvement le contact doit se rellcher au point P à l'extrados.

Mais cet effort, qui agit par la tangente BH, se décompose suivant les directions AB & DB, dont l'un tend à faire reculer la culée sur son plan BN, si le rectangle DN n'est plus adhérent au rectangle NK qui étoit d'ailleurs inébranlable par sa liaison avec les épaulemens, ou à comprimer latéralement cette culée, si la maçonnerie en est tellement incohérente, que les pierres soient distantes les unes des autres, & que les mortiers qui les interceptent, n'aient point encore fait corps.

Cela posé, on aura pour l'expression de cette poussée horizontale par l'analogie des triangles semblables  $\left(\frac{cnn}{a}\right)$ , car  $b:c::\frac{bnn}{a}$ 

 $\vdots \frac{bnnc}{ab.}$ 

A l'égard de la puissance qui agit suivant DB, dont le concours devient nul, lorsque le plan vertical DB est impénétrable, elle agit ici par pression sur la culée, à causé de la liaison des deux élémens respectifs LD & DN, qui sont en équilibre par l'hypothèle, & elle se trouve simplement exprimée par m, suivant l'analogie, ensorte que le centre de cette pression est dans le plan vertical DB, parce que la partie qui sui fait équilibre, est une sonction de l'énergie de la culée; ce qui étant posé comme consorme à l'analyse

même de la poussée des voûtes par la décomposition de l'effort des voussoirs, l'équation (si la puissance étoit égale au poids) seroit  $\frac{cnn}{a} = dy + nn$ , d'où on tire  $\frac{cnn}{ad} - \frac{nn}{d} = y = 10$  pi. 9 p°. (1).

Mais l'état de la question nous donnant y = 18 pieds, on peut donc prendre cet événement comme une expérience constante de l'équilibre entre la puissance & la résistance, ou entre la puissance & la compression pour le cas de la plus grande incohésion.

On aura alors pour l'expression de la poussée  $\frac{enn}{a} = 372$  pieds, & pour la résistance due à la pression dy + nn = 464 pieds, ce qui indique que la puissance dans cet événement n'étoit que les  $\frac{4}{5}$  du poids.

Il est évident que si le plan BN eût été poli & graissé, comme dans les expériences qui ont servi à établir la théorie des frottemens,

Et idem.

$$\frac{\epsilon \pi n}{a} = 372. 2.$$

<sup>(1)</sup> Preuve: posant  $y = 10 \text{ d.} - 8^{\circ}$ . on a dy = 136. 2. nn = 236. 0.  $37^{2} \cdot 2.$ 


on auroit eu y = 32 pieds 3 pouces (1). Mais dans le cas des plans raboteux & engrainés, l'expérience actuelle peut servir à établir qu'on peut regarder la puissance comme égale au poids, au moment où les maçonneries sont nouvellement construites, en ne présumant point d'exceptions de bonnes constructions, parce qu'on ne pourroit pas toujours se proposer d'attendre une dessication totale de celles qui ont une grande épaisseur, sans d'autres inconvéniens du laps de temps.

Et à l'égard de celles qui ont pu subir cette dessication, l'expérience constate que la puis-

sance est le double du poids.


Dans la thèse actuelle, où la puissance est moindre que le poids, l'épaisseur des culées n'auroit donc pu rien conclure pour leur résissance, puisque finies ou infinies, elles étoient, par la nature de leur construction, compressibles comme un liege.

(1) Car point 
$$y = 10 \text{ d. } 9^{\circ}$$
. comme ci-deffus,  
on a  
3  $dy = 408 \text{ d. } 6^{\circ}$ .  
3  $nn = 708$ . o.  
1116. 6.  
Ront le tiers = 372. 2 =  $\frac{cnn}{4}$ 









## MÉMOIRE

SUR la coralline articulée des boutiques;

PAR M. DURANDE.

A nature rapproche beaucoup les différens regnes; elle passe de l'un à l'autre par des nuances presqu'insensibles; car on obferve dans les minéraux des apparences de végétation, & des marques de sensibilité dans les végétaux. En commençant chaque regne par l'être qui réunit le moins de caracteres propres à ce regne; en s'élevant par degré jusqu'à celui qui, par sa persection, semble presque rentrer dans le regne suivant, elle paroît ne former qu'un seul & même tableau, & suivre une progression qui lie & unit tous les êtres. Mais la différence entre les regnes, quoique peu apparente, n'est-elle pas toujours très-réelle? les êtres qui commencent chacun de ces regnes, ou qui les finissent, n'ont-ils pas des caracteres qui les rangent essentiellement parmi les minéraux, les végétaux, les animaux? ou sont-ils des êtres vraiment intermédiaires qui réunissent les caracteres de deux regnes, ou qui, par quelques caracteres particuliers, appartiennent à l'un ou à l'autre, sans pouvoir être rangé dans

#### ACADÉMIE

aucun d'eux? C'est une question intéressante; sur laquelle il s'en faut beaucoup que les Naturalistes soient d'accord.

Les productions maritimes ont sur-tout offert aux Naturalistes des êtres ambigus, qu'ils ont placés successivement dans les trois différens regnes. La plupart des anciens rangerent les coraux & les autres corps de cette espèce, parmi les minéraux, à raison de leur poids, de leur accroissement sur les rochers, de la propriété qu'ils leur reconnurent de se convertir en une véritable chaux, au moyen du seu. Boccone comparoit ces végétations minérales à celles de l'arbre de Diane.

Cependant cette opinion ne fut pas générale. Dioscoride, Pline, dont Cesalpin, Rai, Tournesort adoptent l'opinion, penserent toujours que ces productions, dont la structure extérieure avoit une si grande analogie avec celle des végétaux, étoient de véritables

plantes.

M. de Marsilli prétendit confirmer cette opinion par des observations exactes. Il reconnut sur ces productions de petits corps organisés & découpés en plusieurs parties, dans lesquels il crut trouver tous les caracteres des fleurs. Ayant mis tremper dans l'eau de la mer quelques branches de corail nouvellement pêchées, il s'apperçut au bout de quelque temps, que de petits tubercules rouges qui étoient à la surface de son écorce, s'épanouissoient peu à peu, & ensin se développoient en fleurs blanches qui avoient la

forme d'une étoile à huit pointes, soutenue par un calice divisé de même en huit parties. Lorsqu'il retiroit ces branches de l'eau, les fleurs se refermoient aussi-tôt, & ne formoient plus que des tubercules rouges. En exprimant ces tubercules, il en sortit un suc laiteux. Lorsqu'il remettoit dans l'eau de la mer ces branches de corail, ces tubercules s'épanouissoient de nouveau en fleurs, ce qui continua de la sorte pendant huit à dix jours, temps où les boutons cesserent ensin de s'épanouir.

M. Shaw apperçut également ces petits corps fur les madrépores; mais il prétendit qu'ils étoient les racines de la plante qui paroifsoient davantage lorsque ces productions étoient dans la mer, & qui disparoissoient

lorsqu'elles en étoient tirées.

Ces naturalistes s'accordoient à regarder les productions maritimes comme de véritables plantes; mais on eut toujours peine à croire que des corps pierreux, qui conservent dans la mer toute leur dureté, pussent végéter. Quelques Naturalistes, entre autres M. Peyssonel, Médecin, examinerent les productions maritimes avec plus d'attention; ce dernier crut s'assurer, par des observations réitérées, que les prétendues fleurs de M. de Marsilli étoient de très-petits, mais de véritables animaux semblables à des orties de mer. Il soutint que les coraux, les madrépores, les lithophytes, les corallines, n'étoient qu'un assemblage de coquilles de ces insectes ou de loges d'animaux; quoique Ferrante Imperato cût déjà soupçonné cette génération des li-

### 176 ACADÉMIE

thophytes dès la fin du seizieme siecle, & quoique Rumphfius nous eût appris que les Philosophes Indiens pensoient, il y a plus d'un siecle, que le corail étoit de la fabrique des animaux; cependant cette opinion parut si singuliere à M. de Reaumur, que rendant compte à l'Académie des Sciences en 1727, du Mémoire de M. Peyssonel, il n'osa nommer fon Auteur. Mais en 1739, les observations de M. Trembley, sur les polypes, réveillerent l'attention des Naturalistes. M. de Reaumur conçut dès-lors que l'opinion de M. Peyssonel méritoit un examen plus réfléchi. Il observa les polypes d'eau douce, & il reconnut que ces animaux se retirent dans une espèce de tuyau, & que ces tuyaux sont arrangés avec ordre dans les endroits moins peuplés de ces insectes. Le premier est collé contre quelque appui fixe; il fert d'appui au fecond qui part assez près de l'ouverture de l'autre : le troisieme est posé d'une maniere semblable fur le second, & ainsi de suite; ce qui forme une tige qui, à l'origine de chaque nouveau tuyau, semble avoir un nœud ou articulation. De cette tige partent souvent, des deux côtés opposés, d'autres fils de tuyaux qui font comme autant de branches; & ce polypier, suivant M. de Reaumur, ressemble trèsbien à une plante dépouillée de ses feuilles.

L'opinion qu'avoit adopté M. de Reaumur fut bientôt confirmée par M. Bernard de Jufleu. Ce célèbre Naturaliste se transporta le ong des côtes occidentales de la Normandie; & ayant observé dans l'eau de la mer plusieurs espèces de ces productions, formées à la maniere des plantes, il vit fortir des bouts de toutes leurs branches & de toutes leurs articulations, de petits animaux qui, comme les polypes à panaches d'eau douce, se donnoient tantôt plus, tantôt moins de mouvement; qui, comme ceux-ci, s'épanouissoient en certains temps, & qui dans d'autres rentroient en entier dans leurs petites cellules, hors de laquelle leur partie postérieure ne se trouvoit jamais. Enfin, il reconnut que plusieurs espèces de ces corps ayant l'extérieur d'une plante, n'étoient qu'un assemblage singulier de cellules construites les unes sur les autres, & habitées par de petits animaux, que cependant il ne découvrit point sur les corallines pierreuses.

Donati, Loeslingius, Ellis, semblent avoir confirmé cette opinion par des observations exactes & très-multipliées. Cependant tous les Naturalistes ne croient point avec ces Auteurs, que les productions maritimes soient des coquilles ou des loges d'animaux réunis, quoique néanmoins très-distincts & séparés; en un mot, que ce soit de véritables polypiers, comme quelques-uns se sont plu à les nommer. MM. Linné, de Baster, Pallas, ont regardé ces productions comme des animaux végétans, qui naissent sous la forme d'une plante, & semblent en avoir les proprietés. Ils croient que ce sont des plantes animées, & non un assemblage de cellules de petits

animaux. Ils ajoutent que les restes des zoophytes que nous conservons, n'en sont que les dépouilles & le squelette. Linné dit que les zoophytes sont des animaux composés, tenant au regne végétal & animal; car, suivant lui, ils ont un sens qui n'appartient ni aux minéraux ni aux végétaux; ils sont d'une nature mitoyenne entre ces deux ordres, ils forment des êtres composés & intermédiaires, & ils unissent les plantes aux animaux. M. Pallas, conduit par le même système, pense que la division des trois regnes est arbitraire, & ne git que dans l'imagination. Il croit qu'il y a autant de distance de telle brute à telle autre brute, que des brutes elles-mêmes aux corps organiques. Diviser les corps organiques en animaux & en végétaux, ce n'est pas suivre, solon lui, la marche de la nature; car quoique les végétaux forment la derniere classe des corps organisés, & que les plantes paroissent très-distinguées des animaux, elles sont cependant unies par les zoophytes. M. l'Abbé Dicquemare, ce naturaliste infatigable, si connu par ses observations intéressantes & multipliées, par les découvertes presque sans nombre qu'il a faites dans la mer, nie au contraire que les regnes végétal & animal se confondent, il juge que ces distinctions sont puisées dans la nature même.

Il doit être fâcheux pour les partisans du fystême de la réunion des êtres, de se trouver réduits à établir leur opinion sur des observations faites en mer, où il est si difficile de

considérer les mêmes objets dans toutes les saisons, & peut-être impossible de découvrir les opérations des différens êtres qui y habitent, ainsi que les loix de leur propagation & la maniere dont ils forment la chaîne immense des créatures; aussi ces observateurs ont-ils songé à chercher le lien qui joint les plantes terrestres aux insectes. Donati prétendit qu'on le trouveroit dans les mousses & les fungus, si on les connoissoit mieux. M. Hedwig vient de détruire cette prétention. Il a prouvé que les mousses étoient de véritables plantes, qu'elles avoient toutes les parties de la fructification, & qu'elles se reproduisoient de graines comme les autres végétaux; il ne doute point qu'on ne parvienne à faire la même découverte pour les champignons. Marsilli, Lancisi, & nouvellement M. de Necker, prétendent que les champignons ne font autre chose qu'une excroissance produite par quelque maladie des végétaux; mais, dans ce cas, ils appartiendroient aux végétaux, comme les verrues, les loupes appartiennent aux animaux, & s'écartant, de même que toute maladie, des loix de la nature, ils ne formeroient ni un nouveau regne, ni des êtres intermédiaires aux regnes établis.

Le Pere Minasi, Dominicain, pense aussi que les coraux ne sont ni des coquillages, ni des excroissances, ni des croûtes de substances polypeuses; il les regarde comme de vraies plantes infectées dès l'âge le plus tendre par

des animaux marins.

Mais parmi les productions maritimes, s'il en est qu'on doive regarder comme des végétaux, & qui en offrent toutes les apparences extérieures, ce sont certainement les corallines qui ne ressemblent guere à des polypes greffés l'un sur l'autre, mais à de véritables plantes. En effet, quoique les Naturalistes aient reconnu qu'un polype pousse hors de fon corps un jeune polype, comme une tige d'arbre pousse une branche, comme une branche pousse un rameau, il y a bien loin du produit de cette génération finguliere à une plante aussi bien ramisiée que l'est une coralline. D'ailleurs, cette génération successive ne produira jamais qu'une suite de cellules, & l'on ne concevra point comment ces cellules pourroient être traversées par une tige ramifiée & liqueuse.

Cependant M. de Reaumur n'hésite point à regarder les corallines comme l'ouvrage des polypes, ou comme des fils de cellules de ces insectes. M. Ellis, dans son ouvrage intéressant sur les corallines, dir qu'il est porté à croire que la plupart de ces corps marins, que leur hgure ont sait prendre pour des arbrisseaux, des plantes & des mousses de mer, sont nonseulement le domicile d'animaux, mais qu'ils sont encore leur ouvrage, & qu'ils servent à leur conservation, leur désense, leur propagation; en un mot, qu'ils ont les mêmes usages que les gateaux, les cellules que les abeilles & d'autres insectes se construisent. Il appuie cette assertion sur les observations

multipliées qu'il a faites sur des corallines de différentes espèces, dans lesquelles il a toujours cru reconnoître les insectes & leurs loges. Linné range les corallines parmi les zoophytes, c'est-à-dire parmi les animaux-plantes.

D'un autre côté, M. de Jussieu n'a découvert aucun insecte sur les corallines pierreuses, & M. Pallas pense que ces productions maritimes sont de vrais végétaux. Il assure qu'elles ne donnent aucun signe de vie dans la mer, qu'elles n'ont aucune incrustation polypeuse ou muqueuse, & que leurs pores sont si étroits qu'ils ne peuvent loger les polypes.

La diversité de ces opinions, loin de rebuter les Naturalistes, doit au contraire exciter leur curiosité, & les engager à faire de nouvelles recherches pour connoître la nature de ces êtres singuliers que l'on n'a pu déterminer, même en les considérant sur les bords de la mer. Ils doivent y être d'autant plus portés, que loin d'observer sur terre les variations d'un animal à une plante, ils n'y découvrent pas même celle d'une espèce à une autre; de maniere que ces variations doivent leur paroître circonscrites dans des bornes fixes & déterminées; car s'ils peuvent prendre deux variétés pour deux espèces, ils ne sont jamais dans le cas, après un examen résléchi, de prendre une variété pour une autre plante dont la figure est déterminée, & qui differe de celle à laquelle la variété af partient.

Une coralline articulée du croisic, tapportée M iii

par M. de Morveau, m'a fait naître ces réflexions, & m'a décidé à tenter quelques expériences pour déterminer le regne de ces productions maritimes. Cette coralline, quoique seche, étoit moins mutilée que celle que Fon trouve ordinairement dans les boutiques. Ses tiges, vues à la loupe, sont articulées ou composées de particules, en forme de cône renversé, dont la partie supérieure s'élargit pour recevoir l'emboîtement de l'articulation qui la suit. Ces particules sont toutes uniformes & un peu applaties, plus ou moins groffes & longues, felon que les tiges sont plus ou moins fortes. A l'extrêmité de certaines branches, on apperçoit de petits corps dont la forme n'est point celle d'un cône renversé, ce sont comme de petits boutons sphériques, soutenus par des péduncules cylindriques assez ordinairement, de grosseur égale dans toute leur étendue. Ces petits boutons sphériques ne s'emboîtent point dans le pédicule qui les soutient; mais ils y sont appliqués immédiatement & comme collés, ainsi qu'on le remarque dans la plupart des plantes aux parties de la fructification (1). Le sommet du bouton parfaitement arrondi n'est point . préparé à recevoir une autre articulation.

<sup>(1)</sup> M. Ellis, pl. xxIV, a présenté ces boutons avec leur concavité; mais, suivant lui, les uns sont ovales & les autres arrondis, tandis que tous ceux que j'ai pu appercevoir, sont absolument ronds.



## DE DIJON, 1783.

D'ailleurs, les articulations sont pleines & folides, simplement traversées par la tige ligneuse; au lieu que les petits boutons sont creux, ou dans leur concavité intérieure se conforment exactement à la convexité du dehors, comme on le reconnoît par l'inspection de quelques-uns de ces boutons qui sont entr'ouverts, soit par fracture ou naturellement, pour donner passage à ce qu'ils pouvoient contenir, & que l'on n'y retrouve plus, peutêtre parce que le dessechement de la plante, ou la saison dans laquelle elle a été cueillie, n'est point favorable à cet examen. Cette coralline étoit garnie de coquillages, appliqués immédiatement sur la tige & sur les branches. M. Ellis en a observé de semblables, & ce célèbre Naturaliste a prétendu que les polypes fe changent ainsi en coquilles ou en animaux testacés, pareils à des limaçons ou à des nerites: on est peu porté à admettre de telles transformations.

Sur cette coralline j'en ai observé deux autres plus petites, qui m'ont paru être, l'une, l'antenne d'écrevisse ou barbe de mer: corallina astaci corniculis amula, R. S. M. Ellis, no. 14; l'autre le tamarin de mer: corallina vesiculata sparsim & alternatim ramosa, denticulis oppositis, oribus crenatis patulis: Ellis, no. 1. On ne doit pas être étonné que ces corallines croissent les unes sur les autres, puisque M. de Reaumur en a observé une qui paroît être la barbe de mer, & qui se trouvoit infixée sur un sucus qu'il nomme sucus teres ramosissimus. Rai, Synop.

La coraline du croisic est de couleur rougeâtre; mais il suffit de la tremper dans l'ean pour lui faire perdre cette couleur. La forme de ses articulations doit la faire regarder comme, une simple variété de la coralline des boutiques ( corallina subipinnata, articulis subturbinatis, Linné. ) Les articulations sont allongées & solides, le bouton terminal est creux & arrondi: dans le cas où il serviroit de loge à un insecte, les autres articulations ne pourroient avoir le même usage. Il devient difficile de se persuader que des insectes puissent créer toutes les ramifications articulées des corallines, les faire traverser par une tige qui ne se prolonge point dans le bouton, pour se construire ensuite une loge à l'extrêmité de ces rameaux; que les mêmes infectes créent des articulations coniques, & ensuite un bouton ovale; qu'enfin, d'autres insectes viennent se placer sur ces ramifications, pour y construire d'autres loges, dont la forme est absolument dissérente des premieres.

Dans la vue d'éclaireir ces difficultés, j'ai tâché de dépouiller les corrallines de leur incrustation saline & calcaire. Le vinaigre n'a point suffi; l'eau-forte affoiblie avec l'eau, ne les a dépouillées qu'imparfaitement, mais elles ont perdu sept huitiemes de leur poids dans l'acide nitreux pur; la plante a paru très bien nettoyée; ses tiges étoient minces comme des cheveux, elles sembloient articulées, quoiqu'examinées à la vue seule; quel-

185

ques-unes étoient encore terminées par des boutons.

Ces tiges considérées à la loupe étoient articulées, & paroissoient sistuleuses, n'ayant pas plus de rapport avec une formation animale, que la prêle & autres végétaux analogues. La cavité de ces tiges sermée par les nœuds, ne paroît nullement propre à loger des insectes, qui sont tellement apparens, que M. de Jussieu les a apperçus au premier aspect, sans le secours d'aucun instrument. L'enduit qui les recouvroit étoit compact, & l'on ne peut supposer que la cavité des tiges ait été resservée, tandis que celle des boutons s'est très bien conservée.

Ainsi la coralline est articulée, indépendamment de son incrustation qui en rend seulement les articulations plus sensibles, mais qui ne fait que se conformer au moule sur lequel elle est établie; & comme on trouve par-tout dans la mer des animaux pétrifiés, on ne doit pas être surpris d'y rencontrer des plantes pétrifiées. Les boutons ayant résisté à l'eau-forte, on peut présumer qu'ils font de même formation que les tiges; cependant on n'a rien vu dans leur cavité. Un seul a laissé appercevoir deux petits corps roulés en spiral, qui sembleroient plutôt appartenir à la fructification d'une plante, qu'au regne animal. Au surplus, la mer est tellement fournie d'insectes, qu'il faut bien qu'ils se logent par-tout; les coquillages infixés sur ces corallines, en fournissent la preuve.



#### 186 ACADÉMIE

MM. Donati & Ellis ont bien reconnti qu'après la macération dans le vinaigre, il restoit une substance très-dissérente de celle de l'incrustation; & M. Ellis croit que les parties calcaires du tuyau ayant été mêlées avec les parties gélatineuses de l'animal, il en est résulté une nouvelle substance qui tient de la nature de la come, ce qui la rapprocheroit de l'animalité, car jamais le bois n'eut pareille origine. Mais il est des plantes maritimes, telles que disférentes espèces de varex ou fucus, dont la substance ressemble à celle du cuir, & peut paroître cornée. Au surplus, l'analyse chymique peut iervir à établir des différences essentielles entre ces deux substances; elle peut déterminer avec exactitude la nature végétale ou animale des corallines, & c'est elle que je crois devoir consulter, en suivant l'exemple des Naturalistes qui ont voulu la faire servir à établir leur opinion.

MM. de Marfilli & Geoffroi ont retiré, par l'analyse des productions maritimes, & par la distillation dans la cornue, de l'esprit volatil rousseatre, qui verdissoit le sirop de violette, & faisoit un coagulum avec le sublimé, de plus un peu d'huile fétide; & par la calcination & la lixiviation du caput mortuum, ils ont obtenu un sel sixe d'un goût salin, il est resté de la terre calcaire. Ils ont conclu de cette analyse, que les productions mari-

times étoient de véritables plantes.

Donati au contraire dit que les expériences

## DE DIJON, 1783. 187

chymiques faites sur les productions marines, sont une forte preuve, qui, au défaut de toute autre démonstration, devroit nous convaincre qu'elles appartiennent au regne animal, vu, ajoute-t-il, qu'elles contiennent une grande quantité d'alkali volatil, de qu'elles répandent, lorsqu'on les brûle, une forte odeur d'huitres rôties.

M. Ellis dit que les corallines different des véritables plantes marines, par les principes que la Chymie en retire. Dans les plantes marines qui méritent véritablement ce nom, telles que les algues, les fucus, &c. la diftillation ne fait découvrir que peu ou point de fel volatil, au lieu que les corallines en donnent une grande quantité. De plus, lorsqu'on les brûle, elles exhalent une odeur femblable à la corne & à d'autres substances animales.

Ainsi MM. de Marsilli & Geossfroi, prévenus que les productions marines sont des plantes, croient leur opinion confirmée par une analyse sur laquelle MM. Donati & Ellis établissent un sentiment absolument contraire.

Ayant mis dans une cornue de verre quatre onces de coralline des boutiques, & procédé à la distillation qui a été poussée jusqu'à désoncer la cornue, il a passé dans le récipient une matiere blanche & nébuleuse qui s'est colorée ensuite, est devenue brune, une huile empyreumatique épaisse, peu abondante & pesante: cette liqueur laissoit déposer une espèce de terre blanchâtre qui s'attachoit

légérement aux vaisseaux. Le produit de la distillation pesoit en tout quatre gros.

Ce produit versé sur du sirop de violette étendu avec un peu d'eau, l'a verdi sur le champ, & le verd s'est soutenu plus de vingt-quatre heures.

Mêlangé avec une dissolution de sublimé, il l'a précipité en un bleu jaunâtre.

Avec une diffolution de vitriol de cuivre, il a donné un beau précipité d'un verd bleuâtre.

Il a fait une forte effervescence avec l'acide marin. Ayant filtré & évaporé jusqu'à ficcité, & ensuite versé de la potasse, il s'est fait une petite effervescence, & il s'est répandu une odeur assez forte d'alkali volatil.

Le charbon resté dans la cornue pesoit trois onces; il étoit mêlangé d'un nombre considérable de petites coquilles réduites en

chaux d'un gris blanc.

Ce charbon poussé au seu jusqu'à être réduit en cendre, a pesé alors deux onces deux gros quarante grains. En versant de l'eau, le mêlange s'est beaucoup gonssé; la liqueur a fortement verdi le sirop violat par l'alkali sixe qui y étoit mêlangé avec la terre; elle a été précipitée par l'acide méphitique; & abandonnée à l'air libre, elle a laissé une pellicule comme l'eau de chaux.

Il résulte de cette analyse, que la coralline contient de l'alkali volatil avec du phlegme & de l'huile, que la terre en est calcaire. Cette terre mise dans un appareil pour l'air fixe, a donné avec l'acide vitriolique de l'acide ménhitique

que de l'acide méphitique.

Il est facile de rendre raison de la présence de l'alkali volatil, en voyant les productions animales restées dans le charbon. D'ailleurs, quand même les corallines seules eussent fourni de l'alkali volatil, on ne seroit nullement fondé à en conclure que ce sont des productions animales; car non-seulement il existe différentes plantes vénimeuses, telles que la ciguë, qui fournissent de l'alkali volatil; mais on en retire encore de la marchante ombellée, nommée vulgairement herbe d'Alaud, marchantia polymorpha.

Comme cette plante a une odeur marécageuse, telle que la coralline, il étoit intéresfant d'en comparer les produits. Quatre onces de marchante ombellée, telle que les Herboristes la vendent, après en avoir ôté tous les coquillages qui pouvoient s'y être attachés & que l'on a pu appercevoir, ont été mis en distillation dans une cornue au feu de réverbere. Il s'est élevé d'abord une liqueur rousseâtre, qui peu à peu a passé à la couleur marron. Sur la fin de la distillation, on a vu une huile pesante & une huile légere qui nageoit sur le liquide: la totalité de ce produit pesoit deux gros.

La liqueur versée sur du sirop violat, l'a verdi sur le champ. Unie à la distillation du sublimé, elle l'a précipitée en blanc; mêlée avec une dissolution de vitriol de cuivre, elle l'a'précipité en un bleu clair.

L'acide marin a fait effervescence avec cette liqueur. Ayant filtré & évaporé, la po-



190 À CADÉMIE taffe en a dégagé une forte odeur d'alkali

volatil.

Le charbon resté dans la cornue pesoit

trois gros vingt - quatre grains. Réduit en cendres, il pesoit une once; l'ayant lessivé & évaporé, la lessive a donné quarante grains d'alkali assez blanc, qui, mêlé avec. l'acide nitreux, a sourni par l'évaporation

des crystaux de nitre.

La marchante donne donc de l'alkali volatil de même que la coralline; elle n'en est pas moins une plante. On a eu soin d'ôter tous les insectes qui s'y trouvoient attachés, comme à toutes les plantes qui croissent dans les lieux humides; cette opération étoit facile. Elle ne l'est pas avec la coralline, vû que les émanations animales doivent être mêlangées avec l'incrustation pierreuse qui la recouvre. D'ailleurs il est avantageux de connoître les produits de la marchante ombellée; l'alkali volatil & sixe qu'elle contient, doit servir à rendre raison des propriétés que l'on lui attribue dans les cas de chûte & dans les maladies laiteuses.

L'analyse de la coralline couverte de son enduit calcaire, doit donner des résultats étrangers à cette production. Il étoit nécessaire de la dépouiller de son incrustation; c'est ce qu'a opéré l'eau-forte en faisant une vive effervescence, sans offrir de phénomenes différens de ceux qui résultent du mêlange de l'acide nitreux & de la terrre calcaire. Quatre onces de coralline sur lesquelles on



a versé une once & demie d'acide nitreux. se sont trouvées réduites à quatre gros. Ces tiges frêles, mais entieres & articulées, n'avoient d'autre apparence que celle d'une · plante. Mises en distillation dans une cornue, il a passé dans le récipient, 1°. un peu de phlegme très-limpide; 2°. une liqueur roussatre & un peu d'huile, dont une partie étoit sous le phlegme, tandis que l'autre partie surnageoit. Cette matiere a pesé un gros & demi; mêlangée avec le sirop violat, elle l'a verdi légérement; mais en laissant séjourner ce mêlange, il a pris la couleur de feuilles mortes; unie à la dissolution de sublimé, il y a eu un léger précipité d'un jaune rousseâtre; versée sur la dissolution de vitriol de cuivre, il n'y a point eu de précipité, & la liqueur est devenue rousse. Ainsi la plante subsistoit; & quoiqu'elle eût été fortement impregnée de matieres animales, à peine y remarquoiton des traces d'alkali volatil : encore cette foible nuance pouvoit-elle être attribuée aux parties animales qui y étoient restées; car on observoit dans le charbon qui se trouvoit au fond de la cornue, des morceaux luisans qui ne pouvoient être autre chose que des fragmens de coquilles échappés à l'eau-forte.

Deux gros de coralline ainsi dépouillée de fon incrustation, ont donné par la décoction dans l'eau distillée, un gros de matiere extractive gommeuse, âcre & saline. Cet extrait mis en digestion dans l'esprit-de-vin, l'a coloré fortement; la teinture étoit d'un brun

#### 192 - ACADÉMIE

très-foncé. Cette teinture a laissé après l'évaporation, un demi-gros d'extrait brunâtre, d'une saveur âpre, attirant l'humidité, à raison de quelques grains de muriate calcaire

qui s'y trouvoient réunis.

Pour reconnoître si ces produits étoient ceux d'une substance liqueuse ou cornée, il falloit employer sur la corne les mêmes procédés. Quatre gros de corne sur lesquels on a versé de l'acide nitreux, ont pris sur le champ une couleur jaune, & l'acide en se chargeant du phlogistique de la corne, a répandu une odeur d'acide nitreux sumant, qui remplissoit tout l'appartement où cette opération a été faite.

Ayant laissé la corne dans l'eau-forte jufqu'à ce qu'elle ait paru se précipiter, on a filtré & lavé plusieurs fois, de maniere que la corne ne conserva plus aucun goût. Ensuite on l'a fait sécher; elle est devenue pulvérulente & semblable à de la gomme gutte en

poudre.

Cette poudre pesoit deux gros : on l'a fait houillir dans cinq livres d'eau; elle a pris la forme d'une colle brunâtre, & l'eau s'est colorée en jaune. On a répété ces lavages plusieurs sois, la colle diminuoit à chaque lavage; ces lessives évaporées ont laissé une matiere gluante & très-mucilagineuse. Cette matiere desséchée a coloré très-légérement l'esprit-de-vin, & s'est dissoute entièrement dans l'eau avec laquelle on l'a triturée à froid.

L'eau-forts

L'eau-forte qui avoit séjourné sur la corne, a laissé précipiter sur le champ son mucilage par l'acide vitriolique & l'acide marin qui ont diminué sa couleur jaune; l'alkali fixe ou potasse n'a donné de précipité qu'après un certain temps, & le mêlange est devenu safrané.

En comparant l'action de l'eau-forte sur la corne avec celle de ce même acide sur la coralline, celle des autres menstrues employées dans ces deux analyses, il est clair que la coralline n'est point de la corne, qu'elle offre tous les produits des substances végétales, & qu'elle ne peut être autre chose qu'une plante impregnée de beaucoup de terre calcaire, ou de sel, & de matiere animale; qu'ainsi elle a, non-seulement l'apparence d'une plante, mais qu'elle est trèsréellement végétale.

Peut-être qu'en essayant les mêmes expériences, ainsi que plusieurs autres que j'ai indiquées dans les élémens de chymie & de botanique, on parviendroit à établir le véritable caractere de dissérentes autres productions marines (1), & à les rapporter à

<sup>(1)</sup> Je pense bien qu'il en est dont la ressemblance n'est pas très-exacte avec des plantes, & qui peuvent n'être, ou que le produit des insectes, ou des substances minérales travaillées par ces animaux. Mais toutes celles qui ont la figure exacte des plantes, pourroient bien n'être que des végétaux plus ou moins travaillés par des insectes, ce qui les éloigne beaucoup de leux

# ACADÉMIE 194 leur regne. Peut-être que, par ce moyen; on parviendroit à exclure ces êtres intermé-

diaires ou ambigus, qui pourroient ne deyoir leur existence qu'au systême qui prétend lier & unir tous les êtres, & que nous regardons comme le comble de la perfection; fandis que la nature, fort au dessus de cette marche gênée & timide, semble se jouer dans l'immense variété des êtres, leur assigner à chacun des caracteres vraiment distinctifs, quelquefois néanmoins affez développés pour nous mettre dans la nécessité, si nous voulons les approfondir, de les étudier avec toute l'attention que méritent ses ouvrages.

origine. Certains cératophytes, percés d'une infinité de trous, approchent beaucoup de ces feuilles de peupliers, ou d'autres arbres qui ont été disséqués par des insectes & que nous trouvons à la campagne, avec cette différence que ces seuilles n'ont point d'incrustation, & que les insectes les ont abandonnées. La forme symmétrique que gardent les insectes dans les loges qu'ils ont construites dans le pédicule ou soutien de ces espèces de végétation, pourroit bien ne devoir être attribuée à autre chose qu'à l'instinct qu'ont ces animaux de suivre la direction des fibres, en ne rongeant que la partie la moins dure du végétal. Au surplus, ce ne sont que des doutes, car j'ai entrepris seulement de déterminer la nature des corallines.

# E S S A I

SUR l'histoire naturelle du champignon vulgaire (1).

# PAR M. VILLEMET.

ORIGINE de plusieurs êtres est encore enveloppée d'une nuit profonde; l'industrieuse curiofité des mortels s'efforce en vain de soulever le voile dont la nature s'est plu à couvrir les liaisons imperceptibles de ses trois regnes. L'ancienne philosophie, qui croyoit son amour-propre intéresse à rendre raison de tout, imagina l'hypothèse de la dissémination & de la préexistence des germes. La philosophie moderne, le microscope à la main, & aidée du secours de la chymie, est par-. venue à mettre plus d'ordre dans l'étude de l'histoire naturelle, en fixant avec plus de précision, & d'après des principes avérés de l'expérience & de la raison, les grands signes caractéristiques des trois divisions générales. Mais, comme l'ont très-bien remarqué plusieurs Membres illustres de la république des

<sup>(1)</sup> Agaricus campestris. L. 1641.

Fungus campestris albus superne, inferne rubens. J. B. 824.

Lettres, il sera toujours presqu'impossible de fixer ces limites précises d'une maniere qui

ne laisse rien à desirer.

Les champignons font ils des plantes, comme la docte antiquité & la tradition vulgaire se sont accordées à le croire? sont ils des animaux, comme bien des Savans l'ont imaginé, & comme les expériences de quelques-uns semblent le persuader? tiendroient-ils au troisieme regne de la nature, comme des faits affèz évidens, & qui ne sont pat sant poids, pourroient l'insinuer? Ces substances ensin seroient-elles des êtres mixtes, que des qualités communes ne permettroient d'adjuger spécialement & exclusivement à aucun de ces regnes?

Je vais tâcher d'exposer les sentimens des Naturalistes, & en peser la possibilité. Tous se fondent sur l'expérience, tous en appellent à elle; interrogeons-la aussi, mais sans opinion préconçue, sans aucune propension à la faire parler selon des idées particulieres. Je ne consulterai dans cet examen que le seul intérêt de la vérité. Peut-être avec ces dispositions établirai-je des apperçus moins brillans, moins ingénieux, moins positifs même; car ensin, dans les matieres abstraites & disficiles, l'imagination fertile fournit aisément des assertions, tandis qu'un examen froid & raisonné présente la démonstration de l'insuf-

fisance des autres opinions.

 De temps immémorial les Naturalistes ont placé les champignons parmi les végétaux.

L'énumération des différens points de vue sous lesquels ils les ont considérés & rangés, seroit ici aussi déplacée que superflue. Quelques Auteurs avoient témoigné des doutes. Les Botanistes de profession devinrent plus confians fur leurs principes constitutifs, lorsqu'en 1729 Micheli prétendit y avoir découvert des fleurs & des graines. Cette observation acquit un plus grand crédit, lorsque M. Gleditsch, en 1753, en publia d'autres qui la confirmerent. Celles-ci le furent encore quelques années après par Battara, Italien, qui donna un traité particulier sur les fungus qui croissent aux environs d'Arimini. Je suis assurément pénétré pour ces Savans, de toute la vénération & de toute l'estime que leurs talens & leur réputation méritée exigent de moi; mais qu'ils me permettent au moins de douter un instant de la nature de ce qu'ils assurent être des étamines ou des parties propres à la fructification; que leur autorité ne m'engage pas à dissimuler que ces affertions demandent encore d'ultérieures expériences, pour convaincre suffisamment les Naturalistes qui doutent de l'existence de cette découverte.

Il semble bien effectivement que cette production a beaucoup d'analogie avec les plantes; mais celle qu'elle a avec les autres corps naturels, a-t-elle moins de droit de frapper? Voyez quelle est la spontanéité de son origine, avec quelle facilité elle naît des matières excrémentielles animales; & ce qui se N iii

fait remarquer particuliérement dans le champignon culinaire, est reversible plus ou moins à toutes les espèces individuelles qui composent la grande famille des fungus. Car les filets blancs que produisent les crottins divisés par le manuel que pratiquent les Jardiniers sur les couches destinées au champignon vulgaire, doivent-ils bien l'existence de leur germe aux semences de ce fungus? Je n'en crois rien, & mon septicisme est d'autant plus admissible, d'autant plus raisonnable, que sans émietter & sans diviser des champignons avec les crottins, il n'en naîtra pas moins sur les couches: c'est ce que des épreuves réitérées, multipliées & avouées de l'expérience ont confirmé. En vain auroiton recours à des semences prétendues de champignons, précédemment retenues & contenues dans ces matieres, & qui n'attendoient que le développement; de cette hypothèse, toute futile & gratuite qu'elle paroisse, naîtroit cette vérité, que la famille des champignons a encore besoin d'éclaircissemens nouveaux, & qu'elle pourroit bien moins appartenir au chaînon qui fait la nuance insensible du végétal à l'animal.

Suivant les expériences que Georges Wilek, Naturaliste Anglois, a faites sur le champignon vulgaire, il paroît que cet individu mériteroit plutôt d'être classé parmi les zoophytes, que parmi les végétaux. Ce Savant assure qu'ayant sait macérer dissérentes sois de ce champignon dans l'eau, il en avoit vu certaines parties se métamorphoser en animalcules. J'ai réitéré cette expérience en divers endroits, en diverses saisons, en diverses circonstances; le résultat est que presque toujours j'ai obtenu de cette opération, des infectes & d'autres petits animaux en assez grand nombre, & quelquefois d'une ténuité qui ne les rendoit perceptibles qu'au microscope. Tilingius, Membre de l'Académie Impériale des Curieux de la nature d'Allemagne, a fait des observation plus plausibles encore. Il a remarqué plusieurs espèces d'insectes éclos sur différentes fortes de champignons. Il a même cru voir une sorte de graine, qui, exposée au soleil, se transforme en un insede vivant. Ne seroit-ce pas pour cela que des champignons de couches ont quelquefois exercé des effets déléteres surprenans sur des personnes qui en avoient mangé? Ces faits sont consignés dans les Journaux & dans les ouvrages de différens Médecins observateurs. C'est même-là un des moyens les plus plausibles d'expliquer pourquoi les champignons de la même couche, ou cueillis trop tard, ou trop gardés, ou différemment apprêtés, sont un met perfide, tandis que des circonstances opposées laissent à d'autres convives tout le plaisir & l'impunité de la gourmandise. Indépendamment de cette dégénérescence spontanée, ou de cette métamorphose animale, plusieurs Naturalistes modernes sont persuadés que les champignons servent de domicile aux insectes, de même que les coraux, les sertulaires, les zoophytes;



#### 200 ACADÉMIE

c'est pour cette raison qu'ils les excluent de la criptogamie du regne végétal. Non-seulement les champignons paroissent naître d'euxmêmes (alors le proverbe ancien n'a pas été fait sans raison), non-seulement ils servent de matrice & d'alimens à divers insectes & animalcules, ou se transforment en eux, mais il en naît encore jusques sur des bandelettes. fur des appareils que les Chirurgiens appliquent sur les blessés. Je me rappelle avoir lu autrefois, dans les Mémoires de l'Académie Royale des Sciences de Paris, que M. Meri avoit trouvé à l'Hôtel-Dieu des bandes & des compresses qui avoient été la veille trempées dans l'oxicrat, garnies de petits champignons plats & blancs. La possibilité de l'observation de Meri m'a été démontrée par le témoignage d'un ami, que ses talens, ses lumieres & sa candeur me rendent également précieux. M. Laflize, Préfident & chef de la Chirurgie en Lorraine, m'a assuré avoir vu naître de petits champignons à pédicule sur les fanons qui servoient à l'appareil d'une jambe fracturée; ce phénomene a été observé auprès d'une Dame qui étoit en même temps incommodée d'une incontinence d'urine : cette derniere circonstance est on ne peur pas plus favorable au système de l'animalité des champignons. J'ajouterai encore ici le témoignage du célèbre Valisnieri, qui atteste en avoir trouvé qui avoient pris leur origine & leur accroissement sur les membranes du cerveau de l'homme.

Voilà donc une famille rangée par les Botanistes, parmi les végétaux, & que d'autres Naturalistes seroient, avec plus de vraisemblance, autorisés à ranger parmi les animauxplantes. Ce ne sont pas seulement les deux premiers regnes de la nature en faveur desquels on a revendiqué les champignons. Le cêlèbre Dillen, dont le nom ne peut être d'une légere autorité en matiere d'histoire naturelle, & de botanique sur-tout, paroît croire que ces substances se rapprochent davantage du regne minéral; il conclut, même d'après cette idée, qu'elles pourroient naître sans semence, à l'imitation des fossiles & des pierres. Cette idée ne lui auroit-elle pas été fuggérée par l'observation de Lister & de Jean Bauhin, qui ont trouvé des champignons foffiles, enfouis dans un sol rempli de pierres à chaux. Volkamer rapporte qu'une certaine pierre d'Italie produit des champignons qui ont la forme d'un bonnet. En effet, Mathiole, Jules Scaliger & Jean-Baptiste Porta en avoient déjà fait mention; & ce qui doit paroître bien merveilleux, c'est que tous ces écrivains s'accordent à ne pas attribuer moins d'excellence & de délicatesse à ces champignons pierreux. On trouvera plus de vraisemblance & de probabilité dans ce que raconte Marc-Aurele Severin, Chirurgien Grec du seizieme siecle. Il imprima, dans une lettre sur les pierres fungiferes, qu'il connoissoit un champignon bon à manger, qui prenoit naissance dans des concrétions pierreuses; qu'on l'arrosoit avec

une certaine relavure, & que par-là on s'en procuroit une assez grande quantité au printemps & en automne. Il n'est pas douteux qu'il y a près d'ue siecle que l'on a trouvé en Boheme des morilles d'une substance oryctologique, qui contenoient à l'intérieur des pierres métalliques presque toutes d'argent. On présume bien que d'après de semblables observations & de semblables préventions, ces divers Auteurs ne balanceroient pas à ranger les champignons dans la série des lithophytes.

Cette diversité d'opinions fait voir combien l'article des champignons a été jusqu'ici livré aux conjectures, & combien a été impénétrable le voile qui couvre la vérité. Parmi les premiers Naturalistes, il en est plusieurs qui excluent les champignons du regne végétal, parce qu'ils n'ont ni racines, ni fleurs, ni semence, ni feuilles; selon eux, c'est une production particuliere, dont la naissance est due à une certaine pituite, à une humidité putrescible, fournie par les arbres & par la terre. Un célèbre Botaniste de ce siecle atribue leur stérilité à leur origine, en ce qu'ils sont engendrés, dit-il, d'un suc corrompu qui se forme principalement dans les temps humides & pluvieux.

On ne peut disconvenir néanmoins que certains fungus ne doivent leur naissance aux végétaux. Dans une promenade botanique, j'ai observé le lycoperdon epidendrum du Chevalier de Linné, sur une branche morte de groseiller des Alpes. Dans d'autres herborifations j'ai vu des mucors qui avoient une grande analogie avec celui que le célèbre Pline du nord a surnommé septique. Un de ces mucors étoit produit par un suc pourri, découlant par une fente du tronc d'un petit obier mort. Ce mucor étoit manifestement une excroissance visqueuse; il n'avoit aucun indice, aucune marque caractéristique d'animalité ni de végétabilité, que relativement à l'endroit de son origine. Ces sortes d'excroisfance n'auroient-elles aucune ressemblance avec les sucs sanieux qui découlent de quelques parties des animaux? Quoi qu'il en soit, ces productions me paroissent ne devoir en aucune maniere leur origine à des semences, car j'ai observé avec la plus grande attention le suc ou la sève de cet obier desséché, qui étoit épaissi, & entroit dans la formation de ce mucor septique. J'ai encore eu occasion d'en examiner de près un autre, qui s'étoit formé sur une planche voisine d'un puits, & sujette à recevoir des écoulemens de lavure de cuisine. Celui-ci ressembloit assez à une assiette, & il n'étoit pas possible de se méprendre sur les caufes de son existence & de son accroissement.

Mais des Botanistes célèbres qui ont cru voir des semences dans les cellules de certains champignons, n'en ont pas été plus portés à croire pour cela qu'ils sussent plus propres à leur reproduction. Tel a été le sentiment de Valisnieri, Lancisi, Marsigli & Jussieu. Marsigli prétend qu'en divisant en très-petites parties des champignons, & les répandant ensuite

#### ACADÉMIE

204

dans le sol qui leur est propre; il en naît de nouveau, mais il ne juge pas pour cela que cette régénérescence soit due à la semence.

Les vacances d'automne m'ont donné le loifir dexaminer par l'expérience, le degré d'affentement que mérite l'opinion de Marsigli. J'ai à plusieurs reprises semé sur des couches appropriées, de la poussiere de champignons; il m'en est germé à la vérité, mais je n'ose presque attribuer leur naissance à cette espèce de dissémination. Pour éclaircir mes doutes dans une matiere aussi problématique, je me suis armé d'un excellent microscope, & en même temps de beaucoup de patience & d'attention. A peine en ai-je vu deux qui m'aient semblé naître d'un même fragment de champignon répandu. Dans beaucoup d'autres endroits, & cela d'une maniere plus sensible encore, j'observois les premeirs rudimens du champignon s'élever à côté des débris des anciens. & ceux-ci subsister ou disparoître insensiblement, mais sans qu'il parût rien de commun, ni aucune influence de la destruction des uns sur la production des autres. Au reste, ce que je viens de dire des deux petits champignons qui ont paru naître sur un fragment d'ancien, ne fourniroit qu'une analogie avec la reproduction spontanée des polypes, des mousses, de quelques filicées, & de la racine de prêle. Ce n'est donc pas sans raison que plusieurs habiles Naturalistes Italiens regardent la génération des fungus comme une forte de phénomene protéiforme, très-difficile à expliquer.

Je ferois tenté de regarder comme apochryphe ce que cite Dioscoride d'une méthode artificielle propre à se procurer des champignons vulgaires, & qui étoit pratiquée de son temps; elle ne consiste qu'à enfoncer dans des couches de fumier de l'écorce de peuplier. Les assertions de Ruelle ne me paroissent mériter guere plus de créance. Il rapporte, dans son Histoire des Plantes, qu'en arrosant le tronc du peuplier blanc mis à découvert près de sa racine, avec de l'eau dans laquelle on aura délayé du levain, il en naîtra aussi-tôt des champignons. Bergius dit avoir observé la naissance spontanée d'une espèce de champignons à pédicule, produite par la nourriture de feuilles de choux entassées en terre dans une fosse. J'avoue que je n'ai pas répété ces expériences. Si elles sont fidelles, il en résulte la grande facilité avec laquelle les champignons naîtroient sans semence, d'une autre maniere que les plantes; si elles ne le sont pas, au moins est-ce l'observation de la spontanéité de ces substances qui les a fait supposer. Car, malgré le respect dont je fais profession pour les lumieres des systèmatiques, & notamment pour celles de MM. Micheli, Gleditsch, Battara & Muller, qui admettent des semences prolifiques dans les champignons, je doute de la véracité de cet article. Il ne m'est pas possible d'en être parfaitement persuadé sans d'itératives preuves, sans d'ultérieures expériences, mises au delà des bornes de l'évidence la plus démontrée. Je con206

viens que M. Hedwig, grand observateur de la nature, à Leipsick, vient de nous démontrer à l'œil les pissils, les étamines des mousses, aussi distinctement qu'on les voit aux autres plantes. Mais donner une pareille démonstration aux sungus, me pareit infiniment plus difficile. Il y a des Auteurs qui ont encore mis en assertion, que de petits corps diaphanes, qui se sont remarquer dans les champignons à lames, sont des organes secondaires aptes à la fécondation.

Jean-Baptiste Porta, Botaniste Napolitain, qui vivoit en 1588, dit, dans sa Phythognomie, avoir remarqué des semences dans les champignons; mais ni lui, ni ses contemporains, n'ont entendu prétendre par-là qu'elles fussent propres à la sécondation. M. Gleditsch a encore observé une dissémination explosive dans le genre des fungus appellés carpobolus. Je ne peux non plus considérer cet acte comme propre en aucune maniere à la génération. Mais Goëdart, Naturaliste assez sidele & assez exact dans ses écrits, assure que les petits grains ronds transparens, de la forme & de la grosseur de la semence de raisort, qui se sont appercevoir dans quelques champignons qui commencent à pourrir, deviennent, lorsque la chaleur contribue à les développer, de petites araignées, qui, selon lui, n'acquierent quelquefois pas leur groffeur naturelle de plus de trois ans. C'est probablement cette nature mixte, en quelque forte, des champignons, qui engagea Marc-Aurele Severin à faire ur

207

## DE DIJON, 1783.

eux diverses expériences, pour s'en servir en médecine en qualité d'apéritif & de diurétique, comme on sait que le sont les plantes à insectes.

Les champignons donnent-ils naissance à ces insectes? Un Auteur qui a peut - être fourni à quelques modernes l'exemple abusif d'avoir introduit trop de métaphysique dans les sciences naturelles, veut que l'ame végétative ne soit jamais propre à produire au-cune sensitive (1). Ces insectes, suivant lui, peuvent naître des parties nutritives que les plantent tirent de la terre, & parmi lesquelles il se trouve des molécules qui sont les débris des excrémens des animaux, de leurs corps pourris & décomposés, & qui, joints à d'autrer particules d'ame végétative, produisent ces sortes de substances qui participent de l'un & de l'autre. D'ailleurs, combien de particules sensitives ne s'exalent pas continuellement des corps des animaux vivans, & qui en s'attachant aux feuilles des arbres & des plantes, peuvent donner naissance aux insectes? En supposant que les champignons dussent être rangés parmi les plantes, encore feroient-ils du nombre de celles qui ont plus de disposition à recevoir ces diverses espèces d'insectes. C'est même d'après cette observation, que le Docteur Tilingius conclut combien l'usage des champignons doit être dan-

<sup>(1)</sup> Fortun. licet de sponte viv. art.

gereux. Je n'en ai jamais mangê, dit cet . Auteur, & je suis bien résolu de n'en jamais goûter (1).

Mais pour m'expliquer d'une maniere plus précise sur ma façon de penser, relativement à cette obscure & ténébreuse origine, je crois que l'origine du champignon vulgaire, champêtre & culinaire, est due à un suc pituiteux, putrescible, excrémentitiel, composé des substances zoo-végétales, puisqu'il est prouvé par l'expérience journaliere des Jardiniers, avec quelle facilité ils se procurent ce champignon, en fabriquant des couches où les crottins de chevaux, de mulets & d'autres animaux, entrent pour beaucoup, sans y avoir même mêlé aucune partie de champignon. Seroit-il encore impossible que les sels urineux des dissérens animaux, qui répandent cet excrement sur la terre, n'entrassent ici pour rien? Est-ce donc que ce liquide versé par les cerfs, les chevreuils, les renards, les sangliers, &c. ne pourroit pas faire éclorre cette espèce de végétation? Le cas observé par M. Laslize, vient à l'appui de cette présomption. Mais pour donner plus de clarté & de probabilité au système à qui j'accorde plus de prédilection sur la nature & l'origine des champignons, j'offrirai l'énumération du sol qui convient à plusieurs

۲,

genres

<sup>(1)</sup> Ephem. d'Allemagne, décurie 2, ann. 2, 1683. observ. 73.

genres d'entre eux. Les corps vivans, morts, entiers, détruits, putréfiés; les débris de feuilles, de fruits, de racines, de bois, d'écorces, de semences; le pain, le lait, le fromage, les os, les farines, le vin, l'urine, le vinaigre, les viandes, la gelée, les excrémens, le tan, les cordes pourries, les sucs végétaux cuits & fermentés, leur donnent naissance. Il s'en trouve dans les souterreins, les antres, les cavernes, les fentes, les rochers, les forêts, les déserts; sur les troncs de gros arbres, ainsi que sur la tige des arbustes, & sur les racines des plantes, spécialement celles du chardon roland, de la chicorée, de la grande consoude. On en voit dans les cîternes, au bord des puits, des fossés, des ruisfeaux, les pierres même n'en font pas exemptes; & pour étendre leur spontanéité jusqu'aux termes dont elle est susceptible, il ne faut pas oublier de dire qu'il n'est pas rare d'en observer qui sont nés sur d'autres.

Schelammer donne la description d'un petit champignon à disque, qui devoit son origine à du bois sec arrosé d'eau de pluie. Olaus Borrichius raconte qu'en voyageant, il a vu une espèce de champignon vigoureux, qui avoit cru au sommet d'un noyer. Les carpobolus ne se trouvent que dans une couche de terre formée avec le bois pourri & combiné de sucs terrestres. En vain les chercheroit-on dans tous les lieux que j'ai précédemment cités. Les circonstances propres à produire la matiere immédiate de laquelle ils résul-



#### 210 ACADÉMIE

tent, ne se réunissent en aucun endroit avec autant d'abondance & d'énergie que dans les sombres réduits des forêts, dans les terres basses, un peu humides, couvertes de vapeurs, où il y a eu çà & là des chênes creusés, par une vieillesse décrépite, & pour ainsi dire inanimée, parce que la poussiere qui résulte de la carie, se mêle avec les autres décombres, & sorme la matiere nécessaire à la germination & à l'accroissement de ces sungus secondés peut-être & mis en action par les sels urineux dont j'ai ci-devant parlé.

Quant à la structure, à la forme, à la substance & à la nature des champignons, il y en a de membraneux, de cellulaires, de spongieux, de subéreux, de tuberculeux, d'écaillenx, de verruqueux, de bulbeux, de lamelleux, de foliacés, de pulpeux, de visqueux, d'annulaires, à collets, à réseaux, à tuyaux; les uns ont la superficie sillonnée, velue, filamenteuse, gluante, raboteuse, lisse; d'autres sont composés de feuillets minces, glabres. Wray, Botaniste Anglois, a observé des champignons fistuleux, qui produisoient à leur-sommet une espèce de nœud, qui délayé dans de la lessive, donne une couleur pourpre fixe. Le même écrivain a aussi remarqué que celui qui croît en Angleterre, dont l'acrimonie approche de celle de l'euphorbe, & que Lister a décrit, est le champignon blanc poivré de Jean Bauhin. Il y en a de si visqueux, que Muller a préparé une colle avec une espèce particuliere qu'il fai-



## DE DIJON, 1783.

21I

foit simplement bouillir dans l'eau. Il en est dont l'accroissement s'opere très-promtement, d'autres croissent avec plus de lenteur, & durent davantage. Cet objet est très-analogue

à ce qui arrive aux animaux.

Que conclure de cette foule d'objets si disparates, de cette étonnante variété, qui nous prouve que si les champignons ont quelques propriétés des végétaux, ils semblent aussi, à certains titres, tenir au regne animal, & peut-être même revendiquer, finon une place, au moins une existence quelconque dans le troisieme. L'on pourroit à coup sûr créer une classe nouvelle à ces êtres. Oserois-je l'intituler pseudo - zoo - litho-phytes; bien entendu qu'elle mériteroit d'être subdivisée en espèces distinctes. Le champignon vulgaire, par exemple, seroit un pseudo-phyte-membrano cellulaire, spongieux, subereux, à pédicule, qui porte un chapiteau convexe en dessus, concave, feuilleté & fistuleux en dessous.

# SUITE

DE L'HISTOIRE

METÉORO-NOSO-LOGIQUE

DE 1783.

PAR M. MARET.

T	HE	R	мол	M E	TR	E.	BAR	ROME	TRE.
jo	Мат	IN.	MII	) I.	Soi	R.	MATIN.	MID I.	Soi
du m.	deg.	12.	deg.	12.	deg.	12.	po. l. 10.	po. l. 10.	po. l. 1
1	16.	3	21		18.	9	27. 6. 3		27. 6.
2	17.	9	21.	9	19.	9	6. 6	6. 9	6.
3	19		22.	G	15.	الأ	7 7. 9	7 8	7• 8.
5	14.	3	19.	3	14.	9	7· 9 8. 6	. 8	7· 6.
	14.	9	20.	9	16.	9	7 6. 6	6. 6 6. 3	6.
8	15.	9	20. 21	9	17.		5. 6	5. 3	
9	16.	6		6	19.	9	4.9	4	5
10	17.	9	23 23		19.	9	4. 6	4· 3 5	4. 5
l 1 12	17.	٩	22.	6	18.	6	5	Ś	5 5 3 2.
<b>1</b> 5	17.	3	22	ı	18.	9	5 3. 9	3. 3	3
1.4	16 :1 <b>6</b>		19		17. 17.	9	2. 3 2. 6	2. 3 2. 6	2. 2.
15 16	16.	9	20.	6	16	1	4. 6	5. 6	6
17	16		20.	6	16.	6	6. 6	6. 9	2
18 19	16	9	21	9	16.	6	7. 6 6. 9	7. 6 6. 3	7· 5·
20	16.	3	21		17		5. 6	4. 9	4.
2 1	16.	3	20		17		4. 9	4. 9	4.
22 23		6	20. 17.	6	16. 14.	3	4. 9	4· 3 3· 9	4. 5.
24		•	17-	9 6	14	-	6. 3	7	7.
25		6	18.	9	15		7.6	7. 3	7 4
26 27	14.	9	19.	3	17. 18	3	6 3.3	4· 9 2. 6	4 2.
28		3	20	. 1	17.	3	2.9	2. 6	3.
29			20		17.	6	3. 6	3. 6 5. 6	4.
3 C	16. 16.	6	27.	3 9	17· 18	6	4. 9 6. 3	5. 6 6. 9	6.

# VENTS ET ETAT DU CIEL

	VENTS E	UILLET.	OU CIEL
jo. du m.	MATIN.	Midi.	Soir.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 0 1 1 2 1 3 4 5 6 7 8 1 9 0 2 2 2 3 4 5 6 2 7 2 8	N, br.  N×, br.  O×, br.  No×, br.  No×, -br.  ONO×, -br. fe.  N×, fe.  N×, fe.  N×, fe. v.  N×, fe. v.  N×, fe. v.  N×, nubr.  N×, nubr.  N×, -nubr.  N×, -nubr.  N×, -nubr.  S×, nabr.  NO×, febr.  ONO×, febr.  ONO×, -nu.  So×co.or.T.plnm OSO×, nubr.  S×, +nupl.  OSO×, +nupl.  OSO×, -nu.  N×, fe.  S×, fe.  S×, fe.  S×, fe.  ONO×, -nu.	NX, -nu. NNE X, fe. SEX, -nu. ENEX, fe. ENEX, nu. v. SEX, +nu. v. NEX, nu. v. SEX, -nu. SOX, nu. v. NX, nu. v. NX, nu. NNE X, nu. NX, nu. SOX, nu. SOX, nu. SOX, nu. SOX, nu.	SE, br.  NE X, br.  ONO X, -br.  NNO X, v.  NNO X, +fe.  NX, +fe.  NE X, fe. Br.  ENE X, feBr.  NX, febr.  SE X, co.or. T.pi  ONO , febr.  NX, febr.  SE, -nupl.  NX, +fe.  SX, -nu.  SOX, fepl.  NNO X, +fe.
130	Ox, nu. NEx, fe.	Ox, -nu. NEx, +fe.	NOX, fe. NEX, +fe.

#### 214

# RÉCAPITULATION.

La pesanteur de l'air a été en général considérable dans tout le cours du mois, mais bien plus dans le commencement & le milieu que sur la fin.

L'élévation moyenne du mercure dans le barometre, a été dans le mois, de 27 p. 5 l. 4 12e.

Les vents ont varié très-souvent, ont été souvent viss, rarement très-viss, & une seule sois impétueux. Le N a principalement dominé dans les deux premiers tiers du mois; le S & l'O dans le dernier.


Il n'a plu que cinq fois, & fouvent trèspeu; il n'y a eu que deux orages avec tonnerre & grande pluie, & l'eau qui est tombée pendant le mois, n'a été que de 1 p. 1 l. 29<sup>36</sup>.

Le brouillard qui a regné en Juin, a duré toute la journée pendant les cinq premiers jours du mois, s'est montré quelques heures dans la matinée du 6, a reparu le 12, & a regné matin & soir jusqu'au 19, & dans les soirées des 20 & 21. L'air, dans le cours de la journée, a été plusieurs sois vaporeux.

La sécheresse a toujours été grande, & souvent extrême dans la premiere moitié du mois.

Il y a eu dans la matinée du 6 un trem-





DE DIJON, 1783. 21

blement de terre, dont on trouve l'histoire pag. 26.

La température a été des plus chaudes & très-constante, sans alternative de fraîcheur, & au tempéré::+16 d. 8 12 c. 10 L'élévation moyenne du mercure dans le hermometre, a été pendant le mois de 16 d. 8 12 c.

La végétation a été forte; la maturité des grains & des fruits a été précoce. Les moissons ont commencé au environs du 10; la récolte en froment, en seigle, en orge & en avoine, a été abondante, les pailles assez grandes.

Il y a eu beaucoup de fruits à noyaux. On a mangé des cerneaux dès le 20.

La constitution maladive a continué à être bilieuse.

La fievre tierce a toujours été la maladie dominante; elle a pris, sur la fin du mois, le caractere de fievre maligne putride. Plusieurs de ces fievres ont eu pour symptomes dans leur début, une éruption urticaire, avec des vomissemens très-violens.

Il y a eu des érésipelles, des éruptions pustuleuses sans sievre, quelques fausses pleurésies bilieuses, quelques sievres catharrales; quelques rhumatismes goutteux.

La rougeole est devenue plus commune. Le nombre des malades, peu considérable dans les deux premiers tiers du mois, l'est devenu beaucoup sur la fin.

# OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. A O U S T.

THERMOMETRE.						BAROMETRE.				
-	-		~		-	7	-	-		
jo. du	MAT	IN.	Min	1.	Soi	R.	MA	T 1 N.	M 1 D 1.	SOIR.
m	dég.	12.	dég. 1	12.	deg.	12.	po.	l. 10	po. l. 10.	po. l. 10.
1	17.	6	22		20.	3	27.	6. 9	27. 6. 6	27. 6. 2
2	18.	9	23		21		1	6. 3	5. 6	5. 6
3	19.	5	23.	9	20	1	1	5	3.6	
4	18.	9	18.	9	15.	3	1	3. 3	4. 3	4- 9
1 5	14.	9	19		15.	3		5. 3	5	4. 9
5	14.	3	19.	9	17			5	4. 6	4. 6
1 7	17		19.	9	16.	6		4. 9	5. 6	
8	15.	5	19		16		1	5. 6	5. 6	5. 9 6. 9
9	14.	6	19.	6	16.	3		5- 9	6. 3	6. 9
10	16		19		16.	9		7. 3	6. 6	6
11	16		17.	6	13-	9		3. 9	3- 3	3.6
12	1 I.	6	13.	3	10.	9		3. 6	3. 3	3.6
113	9.	9	15		11.	9		3. 6	3.9	3. 3
114	11		14		II.	9		4. 6	5	5. 9
115	11,	6	13.	3	15			6. 3	7	7.6
16	12,	5	15.	9	13.	6		7- 6	7. 6	7. 6
17	13	-	17.	6	14			6. 9	6. 3	6. 3
18	12		16.	5	14.	9		6. 3	6. 6	6. 6
19	13.	9	17.	5	15.	3		6. 3	5- 3	4. 9
20	13.	9	18.	5	16			4. 6	4. 3	4. 3
21	14.	6	18.	6	15.	6		4. 6	3. 9	3. 9
22	14		18		15.	9		4. 3	4. 6	4. 6
23	14.	9	18.	9	15.	6	1	4. 6	4. 9	4- 6
24	15.	9	1 12	3		3		4. 6	4	4
25		6		9		3	1	3. 9	4	4. 6
: 26			15		13	- 1		4. 9	4- 3	4
27	11.	6	15.	6	12.	6	1	4. 6	5- 3	5
28			16		14-	9	1	5. 3	3. 9	3. 3
, 29	14.	9	17		14-			4.9	5	5. 6
30	1	6	16.	3	14.	3	1	5. 1		5. 6
31			21.	6	15.	31	_	5. 6	5	4. 6

VENTS ET ÉTAT DU CIEL. AOUST.							
jo. du m.	M A T I N.	MIDI.	Soir.				
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 22 12 22 24 22 22 24 22 22 22 24 22 24 24 24	NNO ×, nu. ONO ×, nuRo. ONO ×, -nu. O, nu. Ro. br. ONO ×, fe. br. NO ×, fe. Ro. N, -nu. NNO ×, fe. O ×, nubr. E×, febr, or. T.pl. SO, +nu. So ×, nubr. So ×, +nubr. So ×, +nubr.	ENE X, +fe.  S, -nu.  S, -nu. Tpl.  SO, nu.  NNE X, nu.  SE X, nu.  SO X, -nu.  SO X, -nu.  SOO X, -nu.  SSO X, nu.  SSO X, nu.  SSO X, nu.  SSO X, nu.  SO X, -nu.  NO X, nu.  E X, -nu.  NNO X, nu.  SO X, nu.	NE x, +fe. S, +fe. S, +fe. Sx, co. pl. NO, fe. NE x, fe. O x, -nupl. O, +nu. OSO x, fe. O, nu. O, fe. SSO x, nu. N x, fe. O x, nu. N x, fe. O x, nu. NO x, co. NO, fe. br. ONO, fe. E x, fe. E x, fe. E x, fe. S x, fe. S x, fe. S, fe. S, fe. S, fe.				
29 30	$O \times$ , -nubr $S \times$ , co. +pl. O, nubr. $NO \times$ , cobr.	E, nu. v. SO ×, nu. SSE, nubr. ENE, co.	SO X, -nu, O, -nu. O, fe. NE, co.				

N. B. Les brouillards de ce mois étoient tous à mi-côte, ne s'étendoient pas dans la plaine.

# 1 218 ACADÉMIE

# RECAPITULATION.

La pesanteur de l'air a été forte pendant tout le mois, il y a eu peu de variété dans son énergie. L'élévation moyenne du mercure dans le barometre, pendant le cours du mois, a été de 27 p. 5 l. 6 12°.

La plus grande de . . . 27 p. 7 l. 6 12 e. La moindre de . . . . 27 3 3

Les vents de S & d'O ont été les dominans, dans le commencement & la fin du mois. Ceux de l'O & du N dans son milieu. Ils ont été presque toujours viss, & quelquesois violens.

Le ciel a été très-souvent serein, ou peu chargé de nuages, quelquesois nuageux, &

rarement couvert.

La sécheresse a été très-grande pendant la moitié du mois; l'évaporation a été quelquesois de 3 l. ½ par jour, & il y a eu un peu d'humidité sur la fin.

Du 5 au 18, on a observé de la rosée tous les matins, & il y a eu plusieurs fois du

brouillard sur la montagne.

Il n'a plu que six sois, & il ne s'est sait qu'un orage avec pluie. L'eau qui est tombée pendant le mois, n'a été que de 11 l. 31 36e.

La température a été très-inégale, trèschaude dans le premier tiers du mois, un peu moins dans le dernier, & beaucoup moins

219

dans le second. Les matinées ont éte peu au dessus de la température moyenne du 12 au 18 inclusivement.

L'élévation moyenne du mercure dans le thermometre, a été dans le mois de 15 d. 8 12 e.

La moisson de la navette d'été & des autres menues graines, s'est faite sur la fin du mois, elle a été peu abondante.

Il y a eu beaucoup de fruits d'été.

La sécheresse s'est opposée aux labours, dans la plus grande partie du mois, mais l'humidité de la fin les a favorisés.

Les arbres ont commencé à se dépouiller de leurs seuilles sur la fin du mois, & les hirondelles à partir dès le 26.

La constitution bilieuse s'est soutenue, mais a été souvent compliquée avec la putride.

Les fievres tierces & les fievres rouges ont été les dominantes. Les premieres ont été toutes très-opiniâtres, & la plupart de l'efpèce des perniceiuses, se changeant en malignes comateuses.

On a vu quelques fievres ardentes, quelques doubles tierces, quelques catharrales

& quelques puerpérales.

Il y a eu des éruptions sans fievre, des affections catharrales & rhumatismales; & en général un très-grand nombre de malades.

0	OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. SEPTEMBRE.									
T	HERI	и О М Е	TRE.	BAI	ROMET	RE.				
du m.	MATIN. dég. 12.	M 1 D 1. dég. 12.	SOIR. deg. 12.		MIDI. po. l. 12. 27. 5. 9					
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 5 26 27 28	13. 5	17. 3 16. 3 14. 13 12. 5 13. 3 14. 15 14. 16 12. 13. 3 17. 17. 16 16. 17. 17. 16 16. 17. 17. 16 16. 17. 17. 16 17. 17. 16 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18. 18.	14 13. 6 12. 6 11. 6 12. 6 11. 10 12. 9 13. 9 13. 9 13. 9 13. 9 14. 9 15. 9 11. 6 14. 9 15. 9 11. 6 11. 6 12. 9	3. 6 3. 6 3. 6 3. 6 3. 7 4. 6 5. 7 5. 7	4· 3 4· 6 2. 2	49.6 2 393 93 66 3 999 99 6 96 98 99 6 96 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 9				

19   SSE x, co. +pl.   S x, nu.   S x, -nu.   S x, -		VENTS ET ÉTAT DU CIEL. SEPTEMBRE.							
2   O × , nuBr.   O × , -nu.   O × , feBr.   O × , nu.   SO × , co.   pl.   SO × , nu.   SE × , nu.   SO × , nu.   SE × ,	du	MATIN.	Мірі.	SOIR.					
28 N×, fe. Ro. ENE ×, +fe. N×, +fe. N×, +fe. N×, +fe. SSO, nu. SO×, fe.	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 29	O ×, nuBr. OSO×, nu. br. SSO×, co. pl. S ×, co. +pl. SO ×, copln. ESE×, +nupl. O ×, -nubr. OSO ×, nu. NO×, nu. S, nupl. O ×, +nu. pln. O, -nu. OSO ×, fe. S×, fe. br. SSE×, -nu. S×, nupl. SSE×, co. +pl. S×, nu. Ro. SSO ×, co. br. pln. SSO ×, nu. bm. SE ×, co. br. pl. N×, nu. brm. N×, nupl. N×, nupl. N×, nupl. N×, nupl.	Ox, -nu. OSOx, nu. SOx, nu. SOx, nu. Sox, nu. Sox, -nu. Sox, -nu. Sox, -nu. Sox, -nu. Ex, -nu. Sx, -nu	O * , feBr.  SX , nu. Br.  SSO × , co. pl.  SO × , copl.  SO × , ebr.  O × , -nubr.  SO , +nupl.  O × , fe.  NE × , +fe.  E × , +fe.  S × , -nu.  S × , co. or. T. pl.  S × , -nu.					

### ACADÉMIE

### RECAPITULATION.

La pesanteur de l'air a beaucoup varié. Elle a été en général assez grande, mais jamais considérable, & quelquesois très-soible.

L'élévation moyenne du mercure dans le

... harometre, pendant le mois,

a été de . . . . 27 p. 5 l. La plus grande de . . 27 6 9 '2°. La moindre de . . 26 11 6

Le balancement de . 71.3 120

Les vents ont presque toujours soufflé du SO dans le premier tiers du mois, & du S dans le second. Le N a dominé sur la fin du mois. Il a été presque toujours vif, souvent très-vif, & quelquesois impétueux.

L'air a été toujours plus ou moins humide. Il y a eu huit fois le matin & quatre fois le soir, des brouillards peu épais, & de la rosée tous les jours où il n'y a eu ni brouillards, ni pluie. Il a plu vingt-une sois, mais souvent très-peu, & il s'est fait quatre orages, dont un très-considérable. La quantité d'eau qui est tombé a été de 2 p. 5 l. 27<sup>36e</sup>. Le ciel a été plus souvent couvert que nuageux ou serein. L'évaporation très-soible. Les rivieres ont été presque toujours pleines, & sont sorties plusieurs sois de leur lit.

La température a excédé de très-peu la moyenne, & s'est trouvée fort au dessous dans la matinée.

L'élévation moyenne du mercure dans le thermometre, a été pendant le cours du



DE DIJ	0	N,	1783	223
mois, de	•	•	•	12 d. 1112e.
La plus grande de La moindre de	•	•	•	17 3
La moindre de	•	•	•	9
La différence, .	•	•	• -	8 d. 3 12e.

La récolte en haricots & en mais a été très-mauvaise.

Les vendanges se sont faites le 22. Elles ont été en général très-peu abondantes, & au dessous de l'année moyenne; les raisins sont bien mûrs. On continue les labours avec beaucoup de facilité.

La constitution bilieuse putride s'est soutenue; l'atrabilaire & la catarrale s'y sont jointes.

La fievre rouge & la tierce ont été les maladies dominantes; celle-ci est fréquemment de l'espèce des pernicieus. Les plus benignes sont très-opiniâtres; la plupart ont dans leur début des accidens très-graves, tels que des vomissemens, des crampes & des céphalalgies cruelles. Elles sont fréquemment suivies de cachexies & de leucophlegmaties.

Il y a eu des fievres malignes continues,

des rémittentes, des vermineuses.

On a observé quelques fausses pleurésies, quelques affections catharrales, mais en petit nombre.

La fievre quarte a commencé à se montrer,

mais a attaqué peu de personnes.

Plusieurs de ceux qui avoient eu la sievre dans les deux mois précédens, ont eu des rechûtes. Le nombre des malades a été trèsconsidérable.

	OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. OCTOBRE.										
T	HE	R M	OM	E	TRE	£.	BAR	OMET	TRE.		
jod	Mati	N.	Mid	1.	Soi	R.	MATIN.	M 1 D 1.	SOIR.		
du	deg. 1	2.	leg. 1	2.	deg. 1	2.	po. l. 12.	po. l. 12.	po. l. 72.		
	10.	او	14.	3	12.	3	27. 6. 6.	27. 6	27. 5. 9		
2	11		14	١	12		5· 3 5· 3	4. 9	4.9		
3 4 5 6 7 8 9	9•	9	13.	3	10.	6	5· 3 5· 3	<b>5.</b> 9	5. 9		
4	9.	3	13	إ	11.	6			5· 3 4· 9		
2	9· 11.		13.	9	12.	ျ	5 4. 6 3. 6 6	4· 9 4· 6 2. 6	4. 9		
7	11.	9	15.	9	11.	3	3. 6	2. 6	4. 3 3. 6 7 7 7 4. 9 4. 3 5. 6 6. 3		
8	7.	3	14.		8	1	6	6. 6	7		
9	4	1	8.	3	4•	9		7 7. 6	7		
	3.	9	8	6	5· 6.	3	7 7. 6 6. 3	7. 6	7		
11	3.	9	7·	9	0.		6. 3 4. 9	<b>5.</b> 3 <b>4.</b> 3	4. 9		
12	4.	9	9.	9	7· 8.	3	4· 9 4· 6		4. 3 5. 6		
13 14	7		11.	긻	11.	3	5.6	4· 9 6· 3	6. 3		
15	9.	6	12.	3	10.	3	5. 6 6. 3 6. 6	6. 3 6. 3	6. 3 6. 6		
16	9. 8.	6	II.	-6	9.	3		7	7		
17 18	9.	9	12.	6	9.		7	7 6. 9 6. 6	7 7 6. 9 6. 6		
	2		10.	6	<b>8.</b>	6	6. 9 6. 3	6. 9 6. 6	6. 9 6. 6		
19	6. 6.	3	10	6	8.	6	6. 9 6. 3	6	7 C. 2		
20 21	1	3	7·	۲	7· 6.	3	4. 6	3. 6	3. 3		
21		9	7.	9	7.	3	3. 3				
23			9.	9	9.	3	3. 5 3. 6	3. 6 3. 9	3. 9		
24	9		10.	9 3 6	9•	3	4	3.3	3.3		
25	6.	9	11.		10	- I	2. 9	1. 9	1. 6		
26			11.	3	9.	9	1. 9	2.6	2. 6		
27	9.	6		اء	11		2. 9		2. 3 4. 9 6. 6		
28			10. 8	3	7 6.	6	1. 9	, , ,	1 6 9		
29		9	_	O	6.	6	5· 3 6 6. 6	<b>5</b> . 9	6.6		
14.	<b>15</b> .	7	7.	9	4.	9	6. 6	5. €	5 1		

# VENTS ET ÉTAT DU CIEL.

jo.	M	M	6
lu	MATIN.	MIDI.	SOIR
n.			
1	N×, fe. Ro.	ENE ×, -nu.	Ex, +fe.
2	SOX, co. bm.	S , nu.	S, fe.
3	OX, fe. Ro.	SE, -nu.	Ox, +fe.
	OX, ie. Ro.	S, fe.	S, ie.
5	SOX, -nu. bm.	S×, -nu.	E, -nu.
6	$S \times$ , nu. bm.	S, no.	Ex, nu.
8	SX, nu. Ro.	SX, +nu. +pl.	Ox, -co.
	ONOX, co. pl.	OX, nu.	NO X, -nu.
9	NNOX, fe. gb.	NNOX, -nu.	NX, +fe.
0	NNOx, fe. gb. gl.	NX, fe.	NX, fe.
1	NNEx, le. gb. gl.	NX, +fe.	N × , +fe.
	NX, fe.	NNE X, -nu.	N, -nu.
3	N, copl.	3EX, 1e.	Ex, +fe.
	OX, nu. Ro.	NEX, -nu.	$N \times$ , +ie.
	ONO X, -nu. Ro.	NX, +nu.	N×, fe.
	N, co. bm.	NNOX, fe.	N, +fe.
7	N, co. bm.	NX, fe.	$N \times$ , +fe.
ŏ	N, co. bm.	EX, co.	E, +fe.
9	OX, fe. Ro.	NE, +fe.	NEX, +fe.
	O, br.	N, co.	N, co.
	$E \times$ , co. bm. E, co. bm.	Ex, co. SSE, co.	Ex, fe.
3		SO ×, co.	SSE, co. SOX, -nu. br.
	Ex, co. br.	S, -nu.	SOX, -nu.
	NNOX, fe. Ro. V.	SSEX, -nu.	S, co. pl.
	S, co. br.	S×, nu.	NE, fe. au.
	ESE × , -nu.	SOX, nu.	SO, co,
8	SO, nu.	OSO, -nu.	SOX, fe.
0	OSO X, -nu.	OSO, fe.	Ox, fe.
0	S, nu. Ro.	O, nu.	OSO, fe.
1	NEX, fe. gb.	ENE, -nu.	E , + ſe.

### 226 ACADÉMIE RÉCAPITULATION.

La pesanteur de l'air a été en général assez considérable, mais sans être portée fort haut. Elle a peu varié, & cependant du 25 au 28, s'est trouvée au degré moyen, & quelquesois un peu au dessous.

L'élévation moyenne du mercure dans le barometre, a été pendant le cours du mois, de

<b>e</b>	•	•	•	•	27 P	. 5 l.	I	٠.
La plus grande	: de				27	7	6	
La moindre .	•	•	•	•	27	1	6	
Le balancement	t de			•		61	•	~

Les vents du S & de l'O ont regné pendant le premier tiers du mois, le N & l'E pendant le second, & le SO le reste du mois. Ils ont été souvent viss, quelquesois forts, rarement violens, jamais impétueux.

Le ciel a été serein pendant plus de deux tiers du mois, quelquesois couvert ou nuageux.

Il y a eu des brouillards mouillans, & quelquefois épais, les 5 & 6, & du 16 au 24. Une pluie forte les 7 & 8, & quelques

Une pluie forte les 7 & 8, & quelques gouttes inappréciables les 13 & 26; l'eau qui est tombée a été d'environ 8 l.

La température a été moyenne dans les premiers jours du mois, fraîche & un peu froide dans tout le reste.

L'élévation moyenne du mercure dans le thermometre, a été pendant le mois de 9 d. 4'26.

La plus grande de							6
La moindre de	•	•	•	•	• •	4	
Différence, .	•	•	•	•		. 11 d	.6 <sup>12</sup> c.

Il y a eu quatre fois de la gelée à blanc le matin, & une à glace, mais légere; les arbres n'ont perdu leurs feuilles que fur la fin du mois, les vignes ont conservé les leurs jusqu'au 17.

Les noix & les châtaignes ont été abondantes : celles-ci ont été mises en vente dès

les premiers jours du mois.

Les semails qui ont commencé aux environs du 7 se sont faites facilement. Les grains ont germé promptement, & leur fanage étoit bien verd & bien toussu sur la fin du mois.

Les corbeaux ont paru dès les premiers

jours du mois.

La constitution maladive continue à être bilieuse putride, compliquée de l'atrabilaire; mais la catarrale lui succede sur la fin du mois.

La fievre tierce regne toujours avec les mêmes caracteres que dans le mois précédent, & a la même issue.

La fievre rouge est encore très-répandue, & se termine souvent par des leucophlegmaties.

Il y a des éruptions dartreuses, & de l'espèce de la ceinture de seu; des catarres, des affections rhumatismales sans sievre.

On observe quelques fausses pleurésies putrides, quelques péripneumonies du même genre, des fluxions érésipellateuses & phlegmoneuses.

La fievre quarte commence à être trèscommune, & participe du caractere putride.

Le nombre des malades est toujours considérable, quoique moindre que dans les deux mois précédens.

	VENTS ET ÉTAT DU CIEL. NOVEMBRE.								
jo. Ju m.	1 34	Midi.	Soir.						
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 22 22 24 22 22 22 23 24 24 24 25 26 27 27 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28	Ox, co. gl. nei. ESEx,+nu. neip. S, +nupl. Sx, copl. Sx, +nu. pln. SEx, co. pln. Sx, nu. S, +nu. Sx, co. pln. ESEx,+nu. Ox,+nu. pln. ONOx, +nu. Nx,-nu.gl. Nx, fe. gl.	Nx, -nu. Nx, fe. N, nu. ONOx, copl. N, nu. NNEx, nu. NNEx, +fe. N, +fe. Nx, fe. gl. SSO, co. gl. S, co. Sx, +nupl. SX, +nupl. SX, +nupl. S, +nupl. S, +nupl. S, +nupl. SEx, co. SSO, +nu. Nx, fe. Nx, +fe. gl. Nx, +fe. gl. Nx, +nu. Nx, fe. Sx, co. br. fr. S, co. bm. S, co. bm.	SSE x, fe.  N x, -nu. halo.  N x, -nu.  E x, nu.  N, fe.  NNE x, nu.  NNO x, +fe.  N x, +fe. +gl.  NNO x, fe. gl.  S x, copl.  O x, nu.  S, +nu. au.  SO, co. bm.  S, co.  SE x, nu. pl.  SE x, nu. pl.  SE x, nu. pl.  SSO x, +nupl.  O, co.  N x, fe.  S x, copl.						

### RÉCAPITULATION.

La pesanteur de l'air a beaucoup varié; elle a été en général au dessus de l'état moyen, quelquesois très-forte, mais souvent trèsfoible.

L'élévation moyenne du mercure dans le barometre, a été pendant le cours du mois, de

Le balancement de . . 10 l.

Le vent du N est celui qui a regné le plus souvent pendant le mois. Il a été le dominant le premier tiers du mois, & la moitié du troisieme tiers. Le S a dominé pendant le second tiers & les trois derniers jours du mois. Ils ont été peu viss, & jamais impétueux.

Le ciel a presque toujours été serein dans le commencement du mois, presque toujours couvert ou nuageux pendant le reste.

Il y a eu trois jours entiers de brouillards,

deux matinées & deux soirées.

Il a plu environ six jours en différentes sois, & il y a eu un orage avec grêle & tonnerre. L'eau de la pluie monte à 1 p.

On a observé une aurore boréale.

La constitution a été seche au commencement, humide, même à l'excès, sur la fin. La température a été très-froide dans tout



### DE DIJON, 1783: 231

le cours du mois, mais beaucoup plus du 7 au 12, & du 23 au 30, que les autres jours, & à la moyenne : : + 41,5 120. : + 10. Il a gelé huit fois à glace, & il y a eu des frimats pendant un jour entier.

L'élévation moyenne du mercure dans le

thermometre, pendant le mois, a été

Les arbres sont totalement dépouillés de feuilles dès le 6, & l'on finit les semailles le 16. Les grains germent bien.

La constitution catharrale est la dominante; la bilieuse & l'atrabilaire se manifestent rarement. La putride regne encore un peu.

On ne voit presque plus de fievres tierces, ni de continues. Les maladies les plus communes sont la fievre quarte & la fievre rouge.

Il y a des cachexies, des leucophlegmaties & des hydropisies, suite des fievres des mois précédens; des affections catharrales & rhumatismales, & quelques apoplexies.

Le nombre des malades a été peu con-

sidérable.

### OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES. DÉCEMBRE. THERMOMETRE. BAROMETRE. MATIN. Midi. SOIR S o 1 r. MIDI. du m deg. ро. 27. 12 12 7. 6. 6 5. 6 5. 6 5. 5. 6 5. 5. 6 7. 6. 4 4. 5. 4 1. 1. 2. 26. 10. 6. 6. 6. 6. 2. 4. 2. 3. 4. 1. 0. 0. 1. 2. 3. 3. 1 3 3 9 339396996 7554355555556776554345213186791 3 4 5 6 7 8 9 9399 999 44.33452 0011.1.2.1. プラ・4·4 45 5·5 5·5 5·6 7·6 5·33·453 1·1·9·5·75 30000 45433453211 9 3 3 3 3 6666 6 66 99 906 996699 366993 6 9 3 6 9 6 3 -0. -1. -1. 0 1. 6 9 3 ۰0. 3 0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 2.0002.201.3.3.2.7. 6 9 6 6 6 3 966 6 9 3 6 9 9 3 6 9 9 -1. -2. -0. 1. 4 2. 1 -3. 3 1. 1 1 3 3 5 1 5 5 93669666 939 966969 9 96 27. 26. 11. 11. 6 3 11.

## VENTS ET ÉTAT DU CIEL. DÉCEMBRE.

du m.	MATIN.	MIDI.	SOIR.
1	E, co. bm. pl.	SSE, nu.	SSE, nu.
	NNEx, co. +plnm.	Nx, nu.	$N \times + ie$ .
3	NX, fe.	NEX, -nu.	NEX, +nu.
	NX, nu. ONO, nu.	N×, nupl. E×, nu.	$N \times$ , $+$ nu. $E \times$ , $+$ nu.
5	E, co.	E, -brpl.	E, bm.
	Ox, co. plnbr.	Ox, nu.	Ox, nu.
78	Nx, co. br.	Nx, +nu.	N×, -na.
9	Nx, fe. gl.	NX, fe. de.	Nx, fe. gl.
10	Nx, fe. gl. gb.	NX, fe.	Nx, fe. gl.
11	Nx, fe. gl. gb.	N, fe. dé.	$N \times$ , +fe. gl.
	$N \times$ , fe. gl.	NX, fe, de.	Nx, +fe. gl.
13	$N \times$ , fe. gl.	N, fe.	NX, +fe. g
	Nx, fe. gl.	NEX, fe. gl.	NX, +fe. gl.
15	Ox, fe. gl. gb.	Ex, br. fr. gl.	SSEX, br. fr. g
0	S, br. fr. gl. S, br. fr. gl. ve.	S, br. fr. gl. S, bm. dé.	S, br. fr. gl. S, brgl.
8	N, -nugl.	Nx, fegl.	N × , +fe
19	N , fe. +gt.	N, $+nu$ . $+gl$ .	N, co. +gl.
20	N , br. +gl.	N×, code.	N X , co. gl.
TI	NX, co. +gl.	NE×, nudé.	NE X, co. gl
12	SX, -br. +gl.	Ox, co. gl. neip.	OX, co. gl. ne
3	NNEx, co. +gl.	Nx, nu. gl.	11 X , CO. +g
4	$N \times$ , nu. +gl.	Sx, co. gl. nei.	5 x, co. +gl.
5		S , co. de. pl.	SX, co. de. p
-	$S \times$ , copl. $S \times$ , co. +plnm.	SX, co. +pl,	$S \times$ , co. $+pl$ . $N \times$ , co. $+pl$ .
8	S×, nupl.	$N \times$ , co. $+pl$ . $S \times$ , $+nu$ .	SW. Inu.
19	ONOx co.glnei.	N×, -nu, -gl.	SX, +nu. NX, co. gl.
	$N \times$ , fe. $+gl$ .	Nx, fe. gl.	NX, +fe. +g

### RÉCAPITULATION.

La plus grande de . . 27 7 6
La moindre de . . 26 5 9

Le balancement de . I p. 1 l. 9<sup>12e</sup>.

L'air a été presque toujours agité, & souvent très-violemment. Le N. a été le vent dominant. L'E a regné quelquesois dans le premier tiers du mois, & le S pendant quatre jours sur la fin.

Il y a eu des pluies fréquentes, quelquesunes de très-considérables, & un peu de neige. L'eau qu'ont donné la neige & la pluie, est montée à 1 p. 11 l. 28<sup>3 ée</sup>, elle a causé une forte inondation.

Le ciel a été plus souvent serein que couvert & nuageux dans les deux premiers tiers du mois, & presque toujours couvert dans le troisieme.

L'humidité a été constante, & souvent extrême. Il y a eu quelques brouillards, trois sois des frimats & du verglas, dix-sept jours de gelée à glace, souvent très-sorte, & au point que dans une nuit la glace eut

1 p. 2 l. d'épaisseur.

La température un peu froide dans le premier tiers du mois, a été très-froide dans le fecond, & extrêmement froide dans le troifieme.

L'élévation moyenne du mercure dans le thermometre, a été pendant le mois, de 1 d. 5 1 d. 5 1 de degré moyen, comme + 1 d. 5 1 de .: + 10.

La moindre de . . . -9<sup>d</sup>.

La plus grande de . . +5 9<sup>120</sup>.

La différence de . . . 14<sup>d</sup>.9<sup>120</sup>.

La grandeur du froid a arrêté la végétation; fa continuité & le verglas ont donné des inquietudes relatives aux bleds & aux vignes, mais la vivacité du vent a modéré les effets de ces météores.

La constitution catharrale a été la dominante. Les fievres quartes & la fievre rouge sont les maladies les plus communes. Lorsque l'éruption de la fievre rouge n'a pas été complette, que la peau ne s'est pas dépouillée par écailles, il y a eu des leucophlegmaties souvent compliquées d'ascite ou d'hydropisse de poitrine.

Il y a eu quelques fievres puerpérales, quelques fausses pleurésies, quelques péripneumonies, de gros rhumes, des affections shumatismales, & des apoplexies foudroyantes. Le nombre des malades n'a cependant

pas été confidérable.

### RÉSUMÉ GÉNÉRAL.

Ce résumé fait sur le même plan que celui de l'année précédente, va présenter celle-ci sous un point de vue non moins intéressant que l'étoit celui de l'histoire de 1782.

Phénomenes extraordinaires, constitution athmosphérique très-différente de celle de 1782, & dont l'influence se maniseste sensiblement par l'époque & la quantité des récoltes, par la constitution maladive, & par le nombre des maladies & des morts; voilà les traits qui vont former ce tableau, & ouvrir un vaste champ aux réslexions des politiques, des Physiciens & des Médecins.

L'hiver très-froid & très-humide dans son commencement, est frais & humide dans son milieu, un peu chaud, ensuite froid & toujours humide sur la fin. Les gelées d'abord fortes, mais de peu de durée, sont ensuite rares & peu considérables, puis assez fortes, & en général l'hiver est plus chaud que froid.

L'air y éprouve des alternatives fréquentes de pesanteur, & excede de très-peu la pesanteur moyenne. Au regne du N succede celui du S & de l'O, & ceux-ci agitent violemment l'athmosphere. Les pluies rares dans le commencement de cette saison, sont fréquentes & abondantes dans le milieu, & les rivieres sont toujours très-pleines.

La végétation se ranime dans son milieu, est subitement arrêtée sur la sin, mais pour peu de temps.

Le Laboureur peut, dès le mois de Janvier, préparer la terre à recevoir les semences

qu'il doit répandre au printemps.

La constitution printanniere commence dès le mois de Janvier. Aux maladies catharrales qui regnent ordinairement en hiver, se joignent plusieurs de celles qui appartiennent au printemps, notamment une fievre éruptive rouge. Le nombre des malades y est cependant peu considérable, ainsi que celui des morts, mais celui-ci excede un peu celui des naissances.

Le printemps a été plus chaud que frais, plus humide que sec, dans son commencement, extrêmement humide sur la fin; & par des chaleurs vives & précoces, s'est rapproché de l'été.

Aussi la végétation a-t-elle fait, dans cette faison, des progrès inouis; la vigne est entrée en fleurs, & les fruits rouges ont paru sur sa fin.

Aussi la constitution bilieuse s'est-elle jointe de bonne heure à la catharrale, est promptement devenue la dominante. Le nombre des malades a été peu confidérable dans son commencement & fur fa fin, grand dans fon milieu; celui des morts a excédé d'i celui des naissances.

L'été très-sec & très-chaud dans son commencement & son milieu, a été un peu humide & un peu moins chaud fur la fin.

L'air ayant toujours une pesanteur au dessus de la moyenne, a été peu agité dans son commencement & son milieu, très-agité sur la fin.

La végétation a continué à être forte, les

R iii

récoltes précoces & affez abondantes en grains semés avant l'hiver, & en fruits de la saison, mais au dessous du médiocre en grains semés au printemps. La sécheresse extrême a fait une impression désavorable aux

vignes, & a retardé les labours.

La constitution maladive, bilieuse dans les deux premiers mois, s'est compliquée de putridité dans le troisseme; & le nombre des malades & des morts, peu considérable dans les premiers, l'est devenu dans le dernier. Celui des morts a été dans ce mois, près du double de celui de chacun des deux précédens, & tandis que dans ceux-ci le nombre des naissances a été à celui des morts :: 3: 4, il s'est trouvé dans celui-ci seulement :: 1: 2.

L'humidité de la fin de l'été s'est foutenue constamment dans le commencement de l'automne, a été moindre dans son milieu; il y a même eu des intervalles de sécheresse, mais elle est devenue extrême sur la fin.

La température a été peu au dessus de la moyenne dans le commencement, fraiche dans

son milieu, & froide dans sa fin.

La pesanteur de l'air a été très-variable; au dessus du terme moyen dans les deux premiers mois, au dessous dans le dernier, & en général très-peu supérieure à ce terme. Les vents du 5 & de l'O ont dominé; & l'air très-agité en Septembre, l'a été très-peu en Octobre & en Novembre, souvent même dans une espèce de stagnation.

L'humidité a soutenu & ranimé la végétation. La récolte en vin & en maïs a été très-mauvaise; mais les labours & les semailles ont eu tout le succès qu'on pouvoit desirer, & donné des espérances pour l'année suivante.

Un coup d'œil jeté sur ce tableau racourci, doit faire saisir les données d'après lesquelles on peut résoudre tous les problèmes qu'offrent les événemens de cette année.

En réfléchissant sur la constitution des différentes saisons, on voit,

Que la douceur de la température de l'hiver a déterminé la précocité & l'abondance des récoltes, tant en fruits qu'en grains semés en automne.

Que celle du printemps a favorisé cette précocité, la germination des mars & leur abondance, ainsi que l'abondance des fourrages.

Mais que la chaleur forte & seche de l'été a fait couler les raisins, a diminué la quantité du vin, & s'est opposée à l'abondance des haricots, des pois, du millet & du mais.

Enfin, que l'humidité de l'automne, en ameublissant la terre, a facilité les labours, & que sa température peu éloignée de la moyenne, a favorisé la germination des grains.

Si l'on veut se rendre raison des deux phénomenes extraordinaires, qui ont rendu cette année à jamais mémorable, du brouillard de Juin & du tremblement de terre de Juillet, on n'a qu'à considérer l'humidité

R iv

extrême du mois de Mai, sa température & la chaleur, ainsi que la sécheresse extrême du mois de Juin.

J'ai déjà fait sentir les rapports de cette humidité, de cette sécheresse & de cette chaleur avec le tremblement de terre. Je ne m'occuperai ici qu'à faire saisir ceux qui se trouvent entre ces états de la terre & de l'athmosphere, & les brouillards de Juin.

A l'époque de leur apparition, la terre intimement pénétrée d'eau, avoit été rapidement desséchée à sa surface. La température chaude des mois précédens, y avoit retenu & concentré beaucoup de matiere ignée, & de la combinaison de cette matiere avec l'eau, s'étoit formé beaucoup de matiere électrique. L'air très-chaud & très-sec, avoit cessé d'être conducteur de cette matiere.

La terre surchargée d'électricité devoit chercher à s'en dépouiller dans l'athmosphere, elle y en élançoit beaucoup; & cette matiere obligée de s'échapper, en sortoit enveloppée en quelque sorte de molécules aqueuses trèsdivisées, qu'elle étoit forcée d'entraîner sous sorme de vésicules, ainsi que l'a pensé M. du Carla. Ces vésicules que la matiere électrique désendoit de l'action dissolvante de ce fluide, devoient rester intactes dans l'athmosphere, & sormer le brouillard; c'est par la même raison qu'elles devoient demeurer en cet état pendant tout le jour, jusqu'à ce que l'air, un peu restoidi par l'absence du soleil.

### DE DIJON; 1783.

fût devenu avide du feu que ces vésicules contenoient, & en les décomposant, en eût

précipité l'eau.

Les faits viennent à l'appui de cette théorie, puisque le brouillard qui duroit tout le jour se dissipoit sur le minuit, & ne se formoit

qu'au lever du soleil.

Plusieurs observateurs ont assuré que ce brouillard étoit fétide, & les uns ont dit qu'il avoit une odeur sulphureuse, les autres, une odeur approchant de l'alkaline. Il est très-possible que la nature du terrein ait communiqué cette qualité à ce brouillard dans quelques pays, mais je peux assurer qu'il étoit inodore dans le nôtre; & ayant laissé en expérience pendant plusieurs jours sous une cloche pneumatique, de la dissolution de nitre d'argent exposé à de l'air chargé de ce brouillard, je me suis convaincu qu'il ne contenoit point de vapeurs phlogistiques.

Quelques personnes ont soupçonné que ce brouillard & le tremblement de terre ont influé sur la qualité des maladies qui ont regné l'été & l'automne, & sur le grand nombre des malades qu'il y a eu dans ces saisons.

Les faits ne me paroissent pas autoriser ce soupçon; je les ai déjà indiqués dans mon Mémoire sur le tremblement de terre, & il me paroît superflu de les rappeller ici, d'autant plus que je suis dans le cas de donner sur la cause de la constitution maladive, des conjectures qui me semblent autorisées

par les observations les plus constantes, &

les principes les moins contestés.

Les différens météores, & sur-tout les différentes constitutions de l'athmosphere, influent semblement sur les maladies, & seurs effets se manifestent souvent simultanément. L'histoire que je donne de cette année, en fournit mille preuves qui seront facilement saises par ceux qui la liront.

Mais pour découvrir la cause des constitutions maladives extraordinaires, il faut souvent remonter beaucoup plus haut que le moment où ces constitutions se rendent sen-

fibles par des événemens frappans.

Si nos corps exposés à l'action des météores en sont réellement modifiés, ils ne sont pas purement passifis; ils réagissent, & par leurs propres forces, énervent sort souvent les agens externes capables d'en altérer les qualités. Ce n'est ensin que par une succession de l'influence des causes externes, qu'ils éprouvent un degré d'altération capable de donner lieu à des maladies très-graves.

Celles qui, dans l'histoire de cette année, méritent plus particulièrement de fixer l'attention, sont la fievre rouge & la fievre intermittente qui a commencé en Mars, & s'est

prolongée jusqu'en Octobre.

On ne doit pas être furpris d'avoir vu regner la fievre rouge, quand on fait que cette maladie, ainsi que la plupart des autres maladies éruptives, paroissent dans les années où le froid de l'hiver a été peu vif, où les autres saisons ont été chaudes, & où il y a eu des alternatives fréquentes de sécheresse d'humidité.

La fievre intermittente dépend également de la constitution printannière; elle auroit pu paroître cette année dès le mois de Février, vu la constitution de l'hiver, & l'on ne doit pas s'étonner de l'avoir vu commencer en Mars. Elle n'a d'ailleurs eu jusqu'à la fin de Juillet, que le caractère des fievres printannières; mais à cette époque elle est devenue très-commune, & de l'espèce des pernicieuses; elle s'est souvent masquée sous le type de continues rémittentes, s'est changée en continues malignes. Cetse circonstance nécessite la recherche de la cause de cette altération.

Tous les symptomes qui l'accompagnoient, sa marche, sa terminaison souvent funeste, ont décelé une putridité, non-seulement bilieuse & stercorale, mais portée jusqu'au degré qui forme la constitution atrabilaire, & cet excès de putridité est ce qui doit plus particuliérement sixer l'attention.

On sait que l'humidité favorise la stagnation de nos humeurs, & les dispose à croupir dans différens organes où elles s'alterent, &

tendent à la putréfaction.

On sait qu'une sécheresse vive & brusque, augmente cette disposition, en nécessitant l'évacuation des parties les plus fluides de nos humeurs, & épaississant celles qui ont trop de masse pour être entrainées.

On sait aussi que nous avons au dedans de nous-mêmes un foyer de chaleur d'où il part une quantité considérable de phlogistique, dont l'évacuation se fait par les organes de la respiration, & par la surface de nos corps; que ce phlogistique doit être absorbé par l'air, & que s'il est retenu dans nos humeurs, & ne s'évacue pas proportionnellement à sa quantité, la putridité de nos humeurs est l'esse de sa rétention, & se porte à un degré qui rend presque toujours inévitable la perte de ceux chez lesquels cette rétention a lieu.

On fait ençore que la disposition à la putridité humorale se fait quelquesois lentement, & que cette putridité met quelquesois plusieurs mois à parvenir au point de se manisester; que tous les étés chauds donnent à nos humeurs une tendance plus ou moins grande à cette altération putride, & que le froid de l'hiver vient changer cette tendance, & ramener nos humeurs en deçà du point de décomposition où elles étoient arrivées.

Mais si à un été chaud succede un hiver qui n'a point le degré de froidure nécessaire, nos humeurs conservent cette tendance. Une augmentation de la cause qui l'avoit produite, quelque légere qu'elle soit, sussit pour accélérer la décomposition putride de nos humeurs, sur tout de la bile; à plus sorte raison, quand un été chaud est suivi d'un tuver dont la température ressemble à celle du printemps; d'un printemps d'une constitu-



DE DIJON, 1783: 245 tion approchant de celle d'un été; & que

l'été est lui-même très-chaud.

Or, c'est ce qui est arrivé en 1783. L'été de 1782 avoit rendu putrides nos humeurs, d'une maniere maniseste, sur un très-grand nombre de personnes. La quantité de malades observée à cette époque & dans l'automne suivante, en est la preuve. La température de cette saison avoit nécessairement commencé à altérer les humeurs. L'hiver qui a été plus chaud que froid, n'a pas pu corriger cette altération; le printemps est venu augmenter la tendance à la putridité; l'humidité de cette saison en a retardé le développement; la sécheresse, la chaleur excessive de l'été. & l'humidité chaude de sa fin, ont déterminé l'explosion: l'une en épuisant la masse humorale de ce qu'elle contenoit de plus fluide, l'autre en forçant le phlogistique à s'y accumuler; l'humidité en accélérant la putréfaction par les stases & le délaiement des matieres putréfiées.

Dès-lors, à ce qu'il me semble, on ne doit plus être étonné de la quantité de malades qu'il y a eu sur la fin de l'été & en automne, du caractere atrabilaire de leurs maladies & du nombre des morts.

Les deux grands tableaux où j'ai inscrit tous les détails des observations metéoronoso-logiques, & le précis que j'y ai joint, en rapprochant davantage les objets, rendront plus sensible le rapport des événemens à la cause principale auxquels je les attribue.



### 246 ACADÍMIE

Je vais, en serminant ce réfané, faire chierver que le nombre des mosts étant cette année de 1033

Et celui de l'année derniere de 846

Il excede celui-ci de 187.

Et que far ce nombre des morts, il y a cu 557 miles.

Et 476 femelles.

Différence, . . . 81.

Qu'ainfi le danger a été plus grand d'é pour les mâles que pour les femelles; ce qui confirme encore ce que j'ai avancé dans mon Mémoire fur la probabilité de la vie, pag. 177 du premier Sémestre de cette année.

Il est ne dans cette année, 389 males.

Et . . 349 femelles.

En tout . 738.

Qu'ainsi il est né moins de semelles que de males, & dans le rapport de 11. 66: 13, rapport moins avantageux que celui que j'ai trouvé par un calcul des naissances sait sur un grand nombre d'années, & qui m'a donné celui de 12:13.

Cette année a été plus féconde que l'année précédente, de 52, & s'est beaucoup rapprochée du nombre ordinaire des naissances, puisqu'il n'y a entre elles que 6 de dissérence.

## ERRATA.


### PREMIER SÉMESTRE.

Pag. 208, lign. 27; 220, lign. 25; 229, lign. 16; Eudiometre; lifez Udiometre. Pag. 209, lign. 12, +4, 6; lifez 11, 6. 212, lign. 3, +2; lifez -2. Id. lign. 4, +6, 6; lifez 10, 6. 217, lign. 16, +9, 6; lifez 11, 6.

### SECOND SÉMESTRE.

Pag. 212 & 216, lig, 5, po. l. 10°. trois fois; lifez po. ]. 12°.





# E L'ANNÉE 1783.

_						
	Nombre des	DES M	BRE ORTS. Femelles.	NOMBRE DES NAISSANCES. Mâles. Femelle.		
e.	Petit.	43	35	40	37	
.e.	Petit.	37	33	30	37	
le.	Médiocre.	39	34	30	29	



# E L'ANNÉE 1783.

	Nombre des	DES M	BRE ORTS.	Nombre Das NAISSANCES.		
_	MALADES	Mâles.	Femelles.	Máles.	Femelles	
e.	Petit.	43	35	40	37	
,è,	Petit.	37	33	30	37	
le.	Médiocre.	39	34	30	29	

### 246 ACADÉMIE

Et celui de l'année derniere de 846

Il excede celui-ci de . . 187.

Et . . 476 femelles.

Différence, . . 81.

Qu'ainsi le danger a été plus grand d'¿ pour les mâles que pour les semelles; ce qui confirme encore ce que j'ai avancé dans mon Mémoire sur la probabilité de la vie, pag. 177 du premier Sémestre de cette année.

Il est né dans cette année, 389 mâles.

Et . . 349 femelles.

En tout . 738.

Qu'ainsi il est né moins de semelles que de mâles, & dans le rapport de 11.66:13, rapport moins avantageux que celui que j'ai trouvé par un calcul des naissances sait sur un grand nombre d'années, & qui m'a donné celui de 12:13.

Cette année a été plus féconde que l'année précédente, de 52, & s'est beaucoup rapprochée du nombre ordinaire des naissances, puisqu'il n'y a entre elles que 6 de disférence.

# MDE 1783.



# E L'ANNÉE 1783.

	Nombre des	NOMBRE DES MORTS. Mâles. Femelles.		NOMBRE DAS NAISSANCES. Mâles. Femelles	
e.	Petit.	43	35	40	37
e.	Petit.	37	33	30	37
le.	Médiocre.	39	34	30	29





# TABLE

DES matieres contenues dans les deux Sémestres de 1783.

Le chiffre romain indique le Sémestre, & le chiffre arabe indique la page.

# A

A cete de bismuth : maniere de l'obtenir, I, 187.

Acides: leur nature en général, II, 15.

Acide acéteux, empêche la décomposition du nitre de bismuth par l'eau, I, 189.

Acide bombycin, ou du ver-à-soie, II, 70; existe tout formé dans la chrysalide, 73; époque de sa formation, 77, 84; son réservoir, 80; ses propriétés, 81; retiré par distillation des chrysalides, 86; est composé en partie d'alkali volatil, 89.

Acide des sauterelles, II, 88.

Acide karabique, II, 1; maniere de l'obtenir, 3; sa nature, 12; ses propriétés, 16; ses affinités, 17.

Affinité des réfines avec l'esprit-de-vin, I, 4 & suiv.

Alkali volatil, entre dans la composition de tous les acides animaux, II, 89.

# TABLE

Alkali volatil, retiré de l'analyse des coralines, II, 188. Autres plantes qui en fournissent, 189.

Ame végétative, II, 207.

Analyse de la coralline du croisic, II, 184, 188.

Artometre: moyen de perfectionner cet instrument, II, 114. Balance pour régler ses divisions, 121, 126; maniere de s'en servir, 122.

Arroux: projet de rendre cette riviere navigable, II, 136.

Astringent: leur maniere d'agir, 1, 118.

# В

Balance à diviser: son usage pour la graduation des aréometres, II, 126; seroit d'une grande utilité dans la physique & les arts, 127.

Basaire, trouvé en Bourgogne, II, 103, 111. Beaune: Histoire Naturelle de ses environs, I, 49, 53.

Bec de lievre: ce que c'est, II, 19; ses différentes espèces, ibid. maniere d'y remédier, 20. Observations à ce sujet, 23.

Beton: (Voy. chaux maigre.)

Blende artificielle, I, 37 & suiv. En crystaux

Brion: (Voy. chaux maigre.)

C

Canal: opérations pour parvenir au projet

# DES MATIERES.

de canal de la Saone à la Loire, II, 128, Auteurs qui s'en font occupés, 129; fon point de partage, 130, 142. Etang de Long-pendu placé sur la ligne de séparation des sources, ibid. eaux que l'on peut y conduire, 131; son utilité pour le commerce, 135. (Voy. rigoles.)

merce, 135. (Voy. rigoles.)

Canal d'Autun à la Saone, II, 137.

Cendrée de Tournay, II, 100.

Chaleur concentrée par la glace, I, 64.

Chalumeau: son usage pour l'essai des minéraux, I, 166. Tableau des résultats des terres avec les dissérens slux, 170.

Champignons: essai sur leur origine, II, 195; sont-ils des plantes, 196. Opinions des Naturalistes, ibid. & suiv. Plusieurs les ont cru animaux-plantes, 198; d'autres les ont revendiqués pour le regne minéral, 201. Ont-ils des semences, 203. Essai sur leur dissémination, 204. Doivent-ils leur naissance à des insectes, 207; leur danger, ibid.; sont le produit d'un suc excrémentitiel composés de substances 200-végétales, 208; membraneux, cellulaires, sistuleux, &c. 210. On pourroit en former une classe sous le nom de pseudo-zoo-lithophyte, 211.

Charbon fossile incombustible, I, 76.

Charbon passé à l'état de plombagine, I, 79, 83, 86.

Chaux maigre: ce qui la distingue de la chaux grasse, II, 90. Caracteres de la pierre qui donne cette chaux, 91. Expériences sur six espèces de pierres réputées pierres à chaux

iii

iv TABLE

maigre, 69. Celle de Brion en Bourgogne est une des meilleures, 99.

Colle tirée d'un champignon, II, 210.

Corallines : à quel regne elles appartiennent, II, 173; font de véritables plantes, 180. Articulée du croisic, 181. Expériences fur cette coralline, 184, 192.

Coraux : doivent-ils être regardés comme des plantes, II, 179.

Crystaux de roche tenant schorl, amiante, &c. 1, 26.

Dheune: nivellement de cette riviere, 11, 138. Diviser: balance appropriée à cet objet, I, 126, 127. Drevin: (Voyez Volcan.)

Eaux: méthode pour jauger celle des ruisseaux, II, 146; pour mesurer leur vîtesse, 147. Défaut de l'instrument de M. Pitot, ibid. · Nouvel instrument pour mesurer cette vîtesse, 148. Quantité qu'on peut amener au point de partage du canal de Long-Pendu, 162, 164.

Eisenman artificiel, I, 80. Enfant: sa situation dans se ventre de la mere, I, 121. Opinions des anciens à ce sujet, 122. Examen de ce point de doctrine, 123 & fuiv.

Enhydres: explication de ce phénomene, I,

### DES MATIERES.

22 & suiv. Description d'une belle enhydre, 30. Il s'en trouve dans les crystaux de nitre, 31; imitées avec le sucre candi, 33.

# F

Fer passé à l'état de plombagine, I, 81.
Fungus: il y en a qui doivent naissance à des végétaux, II, 202. (Voy. champignons, corallines.)

# G

Genét: fontaine singuliere aux environs de Beaune, I, 49. Géodes de Vicence, I, 33. Calcaire de Remusat, 35.

# H

Histoire météoro-noso-logique de 1783, I, 204, II, 211.

### T

Jauge. (Voy. Ruisseaux.)
Insectes: plantes qu'on leur attribue. Voy.
champignons, corallines.

### K

Karabé, est souvent sophistiqué, II, 7; à

# vj T A B L E quel regne il appartient, ibid. 14.

# L

Lave volcanique trouvée dans un ruisseau près de Beaune, I, 51; de Drevin, II, 103, 111. (Voy. volcan.)

Liqueurs. (Voy. aréometre.)

Long-Pendu: étang qui porte ses eaux à l'océan & à la méditerranée, II, 130.

Quantité d'eau de cet étang, 162.

# M

'Maçonnerie: incohérence de celles qui sont récentes, II, 167. Calcul appliqué à cette observation, 169. 'Méphite de potasse, dissout le mercure précipité, I, 21. 'Mercure attaqué par l'acide muriatique en va-

peurs, I, 12.

Mines artificielles: leur utilité, I, 37.

Mont Saint-Gothar: on l'apperçoit de Beaune
lorsqu'il doit pleuvoir; & pourquoi, I,
53.

Mont-Saint-Vincent: sa hauteur, II, 140.

Morts: leur nombre dans un espace de dix ans à Dijon, 1 177.

Mucor, produit par un suc pontri, II, 203.

Muriate mercuriel, fait par affinité simple, I,
10; ce qui le rend corrosif, suivant M.

Bertholet, 19. Celui qui est doux ne con-

DES MATIERES. tient peut-être que du mercure en état de métal, 20.

# N

Nécessaire chymique: sa description, 1, 161 & Nivellement de plusieurs rivieres de Bour-

gogne, II, 139, 140.

Observations météorologiques pour les six premiers mois de 1783, I, 204; pour les six derniers mois, II, 211. Opération du bec de lievre, II, 19.

# P

Pese-liqueur approprié à la cuite des sucres, II, 52. Principe de sa graduation, 55; rendu comparable, 62. De la maniere de s'en servir, 65. (Voy. aréometre.)

Pierre à chaux. (Voy. chaux.)

Pierre d'aigle, I, 36.

Plantes qui donnent de l'alkali volatil, II,

188, 189, 190. (Voy. champignons.)
Plantes astringentes, I, 88 & suiv. Celles qui passent pour telles sans en avoir les propriétés, 95; recommandées comme aftringentes, 112. Astringentes, apéritives, béchiques, &c. 113 & suiv.

Viij

Plombagine: ce que c'est, I, 78. Est-ce l'air vital ou l'acide méphitique qui y est uni au sousre, 83.

Pluie, phénomenes qui l'annoncent, I, 53. Pourquoi plus abondante dans les parties

méridionales, II, 132.

Point de partage: canaux à point de partage, II, 131. Leur comparaison avec celui projeté par l'étang de Long-Pendu, ibid. (Voy. canal, Long-Pendu, rigoles.)

Polype intestinal, I, 65; utérin, 71, 73. Précipitation des teintures résineuses l'une par

l'autre I, 3.

Probabilités de la vie, déterminées pour Dijon, I, 177. Différence des mâles & des femelles, 180; cause de cette différence, 181.

Productions marines: maniere d'en déterminer le véritable caractere, II, 193.

Pseudo-zoo-litophytes, (Voy. champignons.)

# R

Réadifs: état de ceux qui entrent dans le nécessaire chymique, & leurs essets, I, 164. Nécessité de s'en servir dans l'analyse des plantes, I, 118.

Recette contre l'épilepsie, &c. examinée par

M. Dehne, I, 45.

Réchaut à esprit-de-vin; description de cet appareil d'expériences, I, 171. Maniere de s'en servir pour les distillations à la cornue, 173; ses avantages, 176.



# Résine: essai sur leurs dissolutions dans l'espritde-vin, I, I. Table des quantités, 5. Rigoles pour conduire les eaux dans le canal de Long-Pendu, II, 142; de Torcy, 155; de Marigny, 159; de Saint-Julien, 161. Quantité d'eau qu'elles sourniront, 162, 164.

Ruisseaux: maniere de les jauger, II, 146, 153.

S

Scammonée d'Alep & de Smyrne; leur différence, I, 9.

Sommation des sinus & cosinus, &c. I, 191. Soufre dissout le zinc sans intermede, I, 39, 47; retarde la susion de quelques métaux,

Succin: opinions des anciens sur son origine, (II, 2. Voy. Karabé.)

Sucre, utilité du pese-liqueur pour juger sa cuite, II, 52, 67.

### Т

Tremblement de terre arrivé le 6 Juillet en Bourgogne, II, 26; sa description, 28; sa direction, 31. Conjectures sur les causes de ce phénomene, 34 & suiv.

Trombe observée à la Chartreuse de Dijon, I, 152; sa description, 156; est probablement un effet de l'électricité, 158.

Tumeur polypeuse, I, 64. (Voy. polype.)

## 2

# $\mathbf{v}$

Ver-à-soie, sa structure intérieure, II, 73; développement de ses organes, 76. (Voy. acide bombycin.)

Vezout. (Voy. Sucre.)

Vie: (voy. probabilités.) Vie moyenne des mâles, I, 186; des semelles, ibid.

Vin de cannes. (Voy. sucre & pese-liqueur.)

Vitesse, soin rapport avec le choc, II, 149, 150. (Voy. Eaux.)

Volcan éteint, découvert en Bourgogne, II, 101; sa description, ibid. & 106. Formes particulieres, 102, 107. Nature des laves & leur état actuel, 103, 110.

Vollenay: y a-t-il eu un volcan, I, 52.

# Z

Zinc, s'unit au foufre, 1, 39, 47.

Zoophites: à quel regne ils appartiennent,

II, 178. (Voy. champignons.)

Zoo-végétal. (Voy. champignons.)

Fin de la Table des matieres.

